



MIGRACIÓN RURAL Y HUERTOS FAMILIARES EN UNA COMUNIDAD INDÍGENA DEL CENTRO DE MÉXICO

MARGARITA CANO-RAMÍREZ^{1,5}, BEATRIZ DE LA TEJERA², ALEJANDRO CASAS¹, LOURDES SALAZAR³ Y RAÚL GARCÍA-BARRIOS⁴

¹Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México

²Posgrado en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Chapingo

³Instituto Tecnológico Agropecuario de Conkal

⁴Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México

⁵Autora para la correspondencia: jatzimay@gmail.com

Resumen: Los huertos familiares evolucionan debido a la continua adecuación del espacio que ocupan, a cambios en sus componentes, así como en el entorno socio-económico y cultural de las familias que los manejan. En este estudio se tiene como hipótesis que la migración de los productores es un factor de cambio social, económico y cultural y que influirá en la estructura de los huertos, particularmente disminuyendo su riqueza y reorientándolos a una función ornamental. En una muestra de 33 huertos se registraron 287 especies perennes de plantas, principalmente con uso ornamental (58%), medicinal (21%) y alimentario (19%). Mediante curvas de rarefacción y análisis estadísticos multivariados se exploraron diferencias entre huertos asociadas a la migración, pero no se identificaron disimilitudes significativas. La causa de este patrón es multifactorial, y entre los principales factores se identificaron la diversificación de estrategias de vida familiar, el carácter temporal de la migración de la gente, la resiliencia institucional y el fuerte sentido de pertenencia a la comunidad de los migrantes. Sin embargo, las actuales tendencias hacia la migración definitiva a los Estados Unidos de América y el aumento en la dependencia de los programas gubernamentales son factores que podrían alterar la relación migración - huertos familiares de acuerdo con las tendencias que se tienen como hipótesis.

Palabras clave: agroecosistemas, huertos familiares, México, migración, tlahuicas.

Abstract: Home gardens evolve due to continuous changes in their area, space, functions, and components, as well as to the dynamic circumstances of the families that manage them. People migrations induce social, economic, and cultural changes, and in this study we hypothesized that these changes influence the home gardens' composition and structure, simplifying and re-orienting them towards an ornamental function. In order to analyze this hypothesis we studied composition and structure of home gardens managed by households of the Tlahuica village of San Juan Atzingo, in the Mexican state of México. A total of 287 perennial plant species were recorded in a 33 home garden sample. The main plant uses were ornamental (58%), medicinal (21%), and food supply (19%). Rarefaction curves and multivariate statistic analysis did not show significant dissimilarities between home gardens associated and not associated to migration. Causes of this pattern are multifactor, and some of the main factors identified are: family livelihood diversification, temporal migration, institutional resilience, and the migrants' strong sense of belonging to their community, which allows them to maintain communication and participation in their home town. Current trends of permanent migration to the United States of America, and increasing dependence on governmental assistance programs are risks of change in the actual relationship between the present migration patterns and the home garden structure according to the hypothesized trends.

Key words: agroecosystems, home-gardens, human migration, Mexico, Tlahuicas.

Los huertos familiares son agroecosistemas tradicionales milenarios situados alrededor de la vivienda que desempeñan un papel esencial en la vida de las familias que los manejan (Miller *et al.*, 2006; Pulido *et al.*, 2008). En ellos los campesinos han cultivado y domesticado una gran diversidad de especies vegetales y animales para la producción

de alimentos y otros satisfactores. Los huertos generalmente están destinados a una producción moderada y temporal de una gran variedad de productos a lo largo del año (Orellana-Gallego *et al.*, 2006; Boege, 2008). También cumplen una función social y cultural al ser un lugar de encuentro, esparcimiento y bienestar para los miembros de la familia y

sus vecinos, así como un sitio en el que se experimenta con nuevos cultivos y prácticas de manejo de plantas y animales (Kimber, 2004).

Diversos estudios en la región mesoamericana demuestran que los huertos pueden mantener altos niveles de diversidad de especies nativas y exóticas en diferentes grados de domesticación, pudiendo albergar en su interior hasta 400 especies diferentes, así como una alta diversidad intraespecífica (Casas *et al.*, 2007; Blancas *et al.*, 2010; Parra *et al.*, 2010). Tan alta diversidad los convierte en importantes reservorios de recursos genéticos para diversos propósitos, que además contribuyen a mantener la resiliencia de los ecosistemas naturales (Engels, 2002; Casas *et al.*, 2007, Pagaña-Calderón, 2009; Blancas *et al.*, 2010; Moreno-Calles *et al.*, 2010).

Los huertos son sistemas dinámicos que evolucionan debido a la capacidad de adaptación de las familias que los manejan a las circunstancias cambiantes del entorno socioeconómico y cultural (Peyre *et al.*, 2006; Wiersum, 2006; Boege, 2008). Sin embargo, la capacidad adaptativa del sistema puede disminuir cuando los cambios del ambiente exceden la capacidad de las familias para sobreponerse. La comprensión de estos procesos de adaptación resulta de gran interés ante los actuales escenarios de transformación que actualmente ocurren en el ámbito rural mexicano (Moreno-Calles *et al.*, 2010). Los efectos de esta transformación son cada vez más complejos y determinan una transición de sociedades agrarias organizadas en torno a la producción primaria, hacia sociedades rurales diversificadas. En éstas han surgido actividades como la migración y fenómenos como el abandono de prácticas productivo-culturales o el aumento de la producción agrícola con propósitos comerciales.




Figura 1. Mapa de localización de la comunidad de San Juan Atzingo. Fuente: Modificado de INEGI, 2010, 19° 00' 22.17" latitud Norte / 99° 23' 19.78" longitud Oeste.

les, en contextos de alta incertidumbre (Pérez, 2004 en Vargas, 2009). Para algunos autores (véase por ejemplo Nair, 2006; Zárate-Vargas, 2007), tales cambios pueden poner en riesgo los sistemas agrícolas, particularmente a los huertos familiares, comprometiendo su futuro como sistemas tradicionales de conservación de la diversidad biocultural (Boege, 2008). No obstante, la diversificación de las estrategias de vida campesinas también puede contribuir a mejorar sus condiciones de vida y su capacidad adaptativa a condiciones adversas o imprevistas (Ellis y Allison, 2004). Dentro de la diversificación de actividades de las familias campesinas, la migración tiene un papel muy importante ya que en la actualidad cerca del 50% de los ingresos de los hogares rurales de los países en desarrollo proviene de esta actividad, y está ocurriendo un proceso de intensificación (De la Tejera-Hernández y García-Barrios, 2008). Arzate-Salgado y Vizcarra-Bordi (2007) reconocieron que la intensificación de este proceso migratorio en México está teniendo consecuencias en las comunidades de origen y de destino. No obstante, sus consecuencias sobre el manejo de recursos naturales en general, y de los huertos familiares en particular, apenas han comenzado a analizarse (IDRC, 2007; Guerrero-Peña, 2007).

Los patrones migratorios de cada comunidad son variables en cuanto a su destino, temporalidad, número de integrantes por familia que migran, etc. por lo que cada caso es diferente. Sin embargo, los estudios que hay sobre el tema reconocen que la migración en general influye significativamente en la composición y estructura de los huertos familiares (Rebaï, 2009; Pulido *et al.*, 2008). Ya sea por medio de la introducción de especies novedosas, conocimientos, herramientas y prácticas agrícolas en los huertos de las comunidades de destino, así como la adquisición de nuevos conocimientos derivados de la reasignación de roles familiares (Pulido *et al.*, 2008; Aguilar-Støen *et al.*, 2009) o por la pérdida de especies, conocimientos, herramientas y prácticas agrícolas, consecuencia de la reasignación de roles familiares, la interrupción en la cadena de transmisión de conocimientos tradicionales y procesos de aculturación (Agelet *et al.*, 2000; Benjamin *et al.*, 2001; Howard, 2006; Guerrero-Peña, 2007; Aguilar-Støen *et al.*, 2009). Por otra parte, Hernández-Suárez y Vásquez-García (2007) encontraron que cuando los migrantes enviaron a sus familias dinero de manera regular, la importancia del huerto en la subsistencia y bienestar disminuyó, y el huerto se reorientó a un jardín ornamental. Cuando los envíos de dinero se dieron de manera irregular la importancia del huerto aumentó sobre todo por su función en la provisión de alimentos (Guerrero-Peña, 2007).

Debido a la diversidad de efectos encontrados hasta ahora. Por lo que son necesarios aún más estudios que permitan entender los patrones bajo los cuales la migración afecta el manejo de los recursos naturales, de los sistemas agrícolas y de los huertos. Particularmente, se requiere documentar el

efecto de la intensificación que está ocurriendo en los procesos migratorios. Así, nuestro estudio se dirigió a evaluar el impacto de la intensificación del proceso migratorio de la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo sobre la riqueza, composición y estructura de los huertos. Lo anterior, con base en el supuesto de que los huertos manejados por familias con emigrantes serían menos diversos, con una estructura menos compleja y un mayor número de especies e individuos de plantas ornamentales.

Materiales y métodos

Zona de estudio. Este estudio se realizó entre 2008 y 2010 en la comunidad de San Juan Atzingo, Municipio de Ocuilan, Estado de México (Figura 1). Forma parte de una investigación más amplia denominada “Estrategias campesinas e instituciones comunitarias: hacia una propuesta agroecológica y de desarrollo local” (De la Tejera *et al.* datos sin publicar), la cual formó parte del macroproyecto “Manejo de ecosistemas y desarrollo humano en la Cuenca de Apatlaco-Tembembe” durante los años 2006-2008 (García-Barrios y Dávila, datos sin publicar).

La altitud a la que se encuentra su núcleo urbano oscila entre 2,513 m y 2,675 m, con una superficie de 12,450 ha de bosque de pino-encino y bosque de *Abies religiosa* (H.B.K) Schl. en sus partes más altas. El suelo dominante es Andosol, y el clima es semifrío-húmedo, con una temperatura media anual de 15 °C y una precipitación anual de 615 mm (Zarate-Vargas, 2007).

La comunidad está conformada por 2,029 habitantes repartidos en 393 unidades domésticas que están organizadas en cuatro barrios formados por linajes patrilineales (González-Ortiz, 2005; INEGI, 2010). El grado promedio de escolaridad es de 6.8 años y la población analfabeta mayor de 15 años es del 12% (INEGI, 2010).

La tenencia de la tierra es comunal y la principal actividad económica está dada por actividades primarias que incluyen la recolección de hongos, la extracción de madera, la agricultura de autoabasto y la agricultura comercial de *Daucus carota* L., *Opuntia ficus-indica* Mill., *Pisum sativum* L., *Rubus fructicosus* L. y *Vicia faba* L., y, la elaboración de pulque (bebida alcohólica preparada a partir de la fermentación de savia de *Agave salmiana* Otto) y la cría de ganado ovino. Actividades terciarias como la carpintería, el comercio, la prestación de servicio de taxis y por la venta de fuerza de trabajo en la región y en el exterior. La migración laboral tanto nacional como internacional tiene un papel cada vez mayor dentro de las estrategias de vida diversificadas de las familias tlahuicas (De la Tejera *et al.* datos sin publicar).

Los habitantes de San Juan Atzingo pertenecen al grupo tlahuica, también llamado atzinca, que es uno de los grupos indígenas menos conocidos de México, pues se encuentran sólo en tres comunidades del municipio de Ocuilan en el Estado de México (González-Ortiz, 2005). El idioma hablado

por los tlahuicas es el pijekak'joo que pertenece a la rama otopame de la familia otomangue (Álvarez-Fabela, 2004). En el año 2000, sólo 26 personas menores de 20 años fueron registradas como hablantes de esa lengua, por lo que se considera que ésta se encuentra en inminente peligro de extinción (INEGI, 2000; Korsbaek y Álvarez-Fabela, 2002). El 3% de la comunidad maneja además el “tlatol”, que es un término nahua para designar a la lengua ritual que se utiliza en determinadas ceremonias bajo una normativa diferente a la de las lenguas de uso cotidiano (Korsbaek y Álvarez-Fabela, 2002).

La forma de organización de la comunidad conserva raíces prehispánicas y se basa en la representación de ciudadanos de cada barrio en los cargos civiles, así como la participación rotatoria de los ciudadanos en diferentes cargos y actividades civiles, religiosas y culturales. Las instituciones locales que se han construido en la comunidad en relación con los recursos naturales y el huerto familiar son múltiples (De la Tejera, Santos y García-Barrios, datos sin publicar). Por instituciones locales entendemos al “conjunto de reglas y normas que moldean la interacción humana y las actividades repetitivas” (Appendini y Nijjten, 2008). Entre las instituciones más importantes de la comunidad se encuentran las “faenas”, que son jornadas de trabajo colectivo, las mayordomías religiosas, las “brigadas forestales” cuya tarea es reforestar y prevenir incendios forestales en el bosque y la “aparecería-mediería”, que se practica cuando un terreno agrícola es trabajado por su dueño y otras personas que aportan trabajo o insumos y al final se reparten los beneficios proporcionalmente entre los participantes (De la Tejera, Santos y García-Barrios, datos sin publicar). Todas estas instituciones se basan en el principio de la reciprocidad y la confianza mutua, que son principios sobre los cuales también opera el huerto familiar. Junto con la lengua, esta forma de organización conforma uno de los elementos más distintivos de la etnia tlahuica (Álvarez-Fabela, 2004).

Durante las últimas cuatro décadas el proceso migratorio se ha intensificado en la comunidad. Estimaciones de De la Tejera *et al.* (2008) indican que el número de migrantes pasó de cuatro personas en 1960 a 65 en 2008 (Figura 2), por lo que se calcula que en la actualidad cerca del 13.5% de la población total de la comunidad ha migrado y 47% de las unidades domésticas tienen al menos uno de sus miembros fuera de la localidad. De acuerdo con los autores referidos, 71% de los migrantes fueron hombres y tuvieron como destino los Estados Unidos, país al que ingresaron de manera ilegal para trabajar como jardineros y empleados de restaurantes. Sin embargo, este tipo de migración internacional no representa una alternativa común para la mayoría de las comunidades marginadas del país, ya que implica una alta inversión económica que no todas las familias pueden solventar. En promedio, un cruce ilegal por la frontera hasta 2008 costaba a las familias atzincas alrededor de \$3,000 dólares de Estados Unidos (Salazar-Barrientos, 2009). En el ámbi-




Figura 2. Migración absoluta calculada a partir de una muestra equivalente al 54% de la comunidad. Fuente: De la Tejera-Hernández *et al.* (2008).

to nacional los principales destinos de los migrantes fueron las ciudades cercanas de México, Cuernavaca y Toluca, en donde los hombres se emplearon como trabajadores de la construcción y jardineros, y las mujeres como empleadas domésticas. En el 62% de los casos, la migración nacional e internacional fue temporal y los migrantes permanecieron fuera de la comunidad por menos de dos años. Sin embargo, el reforzamiento de las redes familiares y sociales, así como el endurecimiento de las políticas migratorias internacionales están favoreciendo que la migración se realice cada vez más hacia el extranjero de manera permanente (Salazar-Barrientos, 2009).

Colecta de datos. El trabajo de campo se realizó de 2008 a 2010. Se seleccionó una muestra de 33 unidades domésticas (UD) con huerto familiar que representaron el 10% del total de huertos de la comunidad de acuerdo a los datos disponibles en ese momento. La muestra fue dirigida y se seleccionaron aquellas UD participantes en los proyectos “Estrategias campesinas e instituciones comunitarias: hacia una propuesta agroecológica y de desarrollo local” y/o “Reconversión agroecológica e industrialización artesanal de chícharo y nopal” (De la Tejera *et al.* datos sin publicar),

porque se contaba con mayor información socio-económica y una relación de confianza con tales UD.

Se consideró el estatus migratorio de la UD, dividiendo la muestra en aquellos huertos manejados por familias con al menos un integrante migrante y aquellos manejados por familias sin migrantes. Se incluyeron en la muestra huertos de los cuatro diferentes barrios de la comunidad, pues éstos representaron distintas condiciones ambientales y culturales que se consideró podían influir en el manejo del huerto (Cuadro 1). Para diferenciar las UD migrantes de las no migrantes se siguió el criterio utilizado por Salazar-Barrientos (2009), quien consideró como UD migrantes a aquellas con al menos un miembro que hubiera salido de la comunidad por motivos laborales entre 2005 y 2008. En cada huerto visitado se registró el número total de especies de plantas útiles y el número de individuos por especie, su talla y ubicación dentro del huerto. Los análisis de composición y estructura del huerto se basaron en el registro de las especies perennes. Se realizaron recolectas de ejemplares que posteriormente se prepararon como especímenes de herbario para su identificación botánica; los ejemplares colectados fueron identificados por personal del Jardín Botánico del

Cuadro 1. Características de los huertos de acuerdo a su ubicación dentro de los barrios de la comunidad. En donde mixto corresponde a presencia de indígenas y mestizos con predominancia de indígenas, y el entrecerrillado a la forma de nombrarse a si mismos y por el resto de la comunidad.

Barrios	Loma de Teocaltzingo	El Atorón	Centro	Nativitas
Altitud (m)	2,675	2,674	2,560	2,513
Presencia de heladas	sí	sí	no	no
Pendiente de los huertos	regular	pronunciada	baja	baja
Colindancia con el bosque	alta	alta	media	baja
Autoadscripción étnica	“los verdaderos tlahuicas”, “los más indios”	tlahuicas	tlahuicas	tlahuicas
Número de unidades domésticas	120	23	159	91

CIEco-UNAM. Los muestreos se hicieron en compañía de la propietaria, o en su ausencia por algún otro miembro de la Unidad Doméstica, para recuperar los nombres locales de las especies así como sus usos y lugares de procedencia.

Análisis y procesamiento de datos. La diferencia en riqueza de especies se evaluó comparando los promedios esperados de especies perennes en huertos con migrantes y sin migrantes, calculado con base en curvas de rarefacción elaboradas para cada uno de los huertos en el menor número de individuos observado. Se usó el programa Estimates versión 8.0 (Gotelli y Colwell, 2001; Magurran, 2004).

La similitud entre huertos se examinó a partir de una matriz de datos de abundancia por especie por huerto y se efectuaron análisis de conglomerados en el programa Bio-diversity Pro (versión 2.0). La equitatividad entre huertos se comparó a partir de las curvas de rango de abundancia generadas a partir del ordenamiento decreciente de la abundancia relativa de las especies de los huertos con migrantes y los huertos sin migrantes (Magurran, 2004).

Para establecer si había diferencias en el uso de las plantas asociadas a la migración se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para datos no paramétricos. Esta misma prueba fue utilizada para evaluar si existían diferencias entre huertos con migrantes y sin migrantes en la estructura vertical de los huertos, el origen de las plantas y las formas de manejo de éstas. Las formas de manejo de las plantas se establecieron de acuerdo con lo propuesto por Casas *et al.* (1996). Las plantas cultivadas son aquellas que el propietario siembra, propaga vegetativamente o transplanta; las protegidas son aquellas que se establecen naturalmente en el huerto y que el propietario decide proteger y propiciar; finalmente, las plantas toleradas son aquellas que se establecen de manera natural en el huerto y que el dueño no propicia ni protege, pero tampoco remueve.

Resultados

Riqueza y estructura de los huertos familiares. Los huertos de San Juan Atzingo son sistemas heterogéneos y diversos. En conjunto, la muestra albergó un total de 287 especies perennes y 85 familias (Apéndice). La familia Asteraceae fue la más abundante con 32 especies, seguida de Rosaceae (18), Crassulaceae (15), Cactaceae (14) y Lamiaceae (11). A continuación se describen las características del huerto así como el arreglo espacial de las especies vegetales.

El huerto típico de San Juan Atzingo o “lote”, como lo llaman sus pobladores, tiene un tamaño promedio de $964 \pm 882 \text{ m}^2$ en huertos sin migrantes y $819 \pm 663 \text{ m}^2$ en huertos con migrantes. Tradicionalmente se compone de un patio central alrededor del cual se establece la vivienda parental y las viviendas de los hijos varones y sus nuevas familias. En el huerto también se ubican el fogón de leña y la letrina. Por lo regular el patio tiene piso de tierra y una superficie libre que sirve como espacio de reunión y preparación de alimen-

tos para las festividades y celebraciones comunitarias. En las orillas y el frente de la vivienda, el patio tiene las plantas “más vistosas”, frecuentemente especies ornamentales en macetas o jardineras. En la parte posterior de las casas se encuentran el resto de las plantas del huerto, la mayoría de ellas sembradas directamente en el suelo y destinadas a las distintas necesidades de la familia como alimento y medicina, entre otras. Las plantas que requieren de mayores cuidados, como las hierbas empleadas como condimentos o medicinales, están próximas a la casa habitación y cuentan con cercados de diversos materiales para evitar que las aves de corral y el ganado ovino las dañen. Los árboles se localizan en las partes más lejana a la casa, y junto con los magueyes pulqueros (*Agave salmiana*) y la zarza silvestre (*Rubus fruticosus*), pueden servir como cerco vivo o lindero. La mayoría de los huertos colindan con otra unidad productiva o de prestación de servicios de la misma familia, como milpas, nopaleras, huertas de flores o frutas, carpinterías y más recientemente invernaderos de plantas de ornato. Este patrón muestra las estrategias de diversificación productiva, pero es importante precisar que se encontraron casos en los que los invernaderos sustituyeron parcial o totalmente la superficie del huerto.

De la década de los 90 a la fecha, las viviendas tradicionales de madera con dos habitaciones y cocina de leña han comenzado a sustituirse por viviendas con paredes de ladrillo y cemento que incluyen la letrina y la cocina con gas. Sin embargo, el fogón de leña es un elemento que coexiste con la estufa de gas L.P., ya sea por el gusto de los propietarios por cocinar con leña o por el elevado precio del gas.

La estructura horizontal de las especies dentro de los huertos atzincas es variable. Sin embargo, se identificó un patrón general que coincide con lo registrado en otros huertos mesoamericanos en las que existe un área para las plantas de ornato, un área para las plantas medicinales y hierbas aromáticas, otra área para los frutales y cultivos anuales y finalmente un área para los animales domésticos (véase Ruenes-Morales, 1993; Pulido *et al.*, 2008).

En cuanto a su estructura vertical se encontraron cuatro estratos: el estrato herbáceo bajo con plantas menores a 30 cm que incluyó 31% de los individuos vegetales de los huertos. En su mayoría fueron de uso medicinal y ornamental, con especies como *Melissa officinalis* L., *Origanum vulgare* L., *Viola tricolor* L. y algunas cactáceas y crasuláceas. El de las plantas herbáceas intermedias, de 31 cm a 1.5 m que comprendió 53% de los individuos y estuvo conformado por especies como *Lilium candidum* var. *peregrinum* Baker, *Ruta graveolens* L. *Salvia gesneriflora* Lindl y *Zantedeschia aethiopica* L. El de las plantas herbáceas y arbustivas de 1.5 m a 5 m de alto, que incluyó 14% de los individuos, con plantas alimentarias como *Rubus fruticosus*, *Prunus persica* (L.) Batsch y plantas ornamentales como *Datura sanguinea* L. y finalmente, el estrato de árboles mayores de 5 m de altura que sólo abarcó al 1.6% de los individuos con

especies como *Abies religiosa*, *Cupressus lindleyi* Klotzsch ex Endl., *Persea americana* L, y varias especies de *Pinus*. No se encontraron diferencias significativas en la estructura horizontal y vertical entre huertos con migrantes y sin migrantes ($P > 0.05$).

Composición florística y estatus migratorio de la UD. El número total de especies perennes en los huertos sin migrantes fue de 238 mientras que en los huertos con migrantes fue de 217. El número de especies por huerto fue muy variable; en promedio, los huertos sin migrantes tuvieron 38.05 ± 20.17 especies y los huertos con migrantes 42.25 ± 11.9 especies. La riqueza esperada para 16 individuos calculadas a partir de las curvas de rarefacción en los huertos sin migrantes fue de 14.2 ± 1.1 mientras que para los huertos con migrantes fue de 15.9 ± 1.2 . No se encontraron diferencias significativas entre los huertos con migrantes y sin migrantes ($P > 0.05$).

La mayoría de las especies tuvo una frecuencia baja. En los huertos sin migrantes sólo tres de las 238 especies perennes se encontraron en más del 75% de los huertos, mientras que el 45% de las especies estuvo presente en un sólo huerto. En el caso de los no migrantes las proporciones fueron parecidas ya que únicamente cuatro de las 217 especies estuvieron en más del 75% de los huertos y el 44% de las especies tuvieron presencia en un sólo huerto. Las curvas de rango-abundancia (Figura 3) indican que, independientemente del estatus migratorio, los huertos están dominados por unas pocas especies con muchos individuos y una gran mayoría de especies con pocos o incluso una única planta en los huertos. En general, las especies más abundantes fueron plantas ornamentales exóticas. En los huertos sin migrantes *Agapanthus* sp., fue la especie más dominante ($Pi = 0.178$), seguida de *Zantedeschia aethiopica* ($Pi = 0.108$), *Euonymus japonicus* Thunb. ($Pi = 0.061$), *Pelargonium x domesticum* Baile ($Pi = 0.032$) y *Rosa* sp. ($Pi = 0.030$). En los huertos




Figura 4. Análisis de conglomerados de Bray-Curtis de los huertos familiares de SJA. En donde NM = huertos sin migrantes y M = huertos con migrantes.

con migrantes las plantas dominantes fueron *Agapanthus* sp. ($Pi = 0.129$), *Pelargonium x domesticum* ($Pi = 0.049$), *Lilium candidum* var. *peregrinum* ($Pi = 0.048$) y *Rosa* sp. ($Pi = 0.037$).

El análisis de conglomerados mostró que los huertos atzincas tienen composiciones de especies particulares y son sistemas muy heterogéneos y diferentes entre sí. No se encontró ningún patrón de agrupamiento asociado a la migración (Figura 4). Sin embargo, los huertos sin migrantes 13NM, 1NM y 12NM se diferenciaron del resto a un nivel muy bajo de similitud, debido a su escasa diversidad y presencia de especies raras, en su mayoría ornamentales. Por ejemplo el huerto 13NM presentó especies exclusivas como *Aquilegia vulgaris* L., *Hypericum calycinum* L. y *Pyrus malus* L., así como especies raras que compartió únicamente con otro huerto (*Cassia* sp., *Cestrum* sp., *Hamelia* sp., *Heimia salicifolia* Link & Otto, *Kalanchoe tomentosa* Baker, *Piqueria trinervia* Cav. y *Stevia salicifolia* Cav. var. *salicifolia*). El huerto 1NM tuvo tres especies raras compartidas únicamente con otro huerto (*Beaucarnea recurvata* Lam., *Chamaecereus silvestrii* Britton & Rose y *Cuphea hyssopifolia* Kunth). El huerto 1NM fue el segundo menos diverso. El huerto 12NM tuvo como especie exclusiva *Ananas comosus* L. siendo el huerto menos diverso.

Las UD de estos tres huertos fueron atípicas; pues tendieron a la especialización y sus ingresos principales dependieron de actividades que implican una baja dependencia de los recursos naturales nativos locales y del huerto, lo que se reflejó en el poco interés en mantener un huerto diverso y multifuncional.

Propósito del huerto. Sin importar el estatus migratorio de la familia, las principales razones expresadas por las mujeres para tener plantas en sus huertos se concentraron en beneficios intangibles como que las plantas son indispensables para que una casa se vea “bonita”, “adornada” y que “donde no hay plantas no hay mujeres”, por lo que el 58%




Figura 3. Curvas rango-abundancia para huertos con migrantes y sin migrantes; A) el pico de mayor abundancia (> 100 individuos) está dado por cinco especies; B) el pico de mayor abundancia (> 100 individuos) está dado por cuatro especies.

Cuadro 2. Promedio (mínimo-máximo) de plantas que hay en los huertos por categoría de uso y categoría migratoria de sus integrantes. Acrónimos: HF tot. = total de huertos muestreados, HF sin mig. = huertos sin migrantes, HF con mig = huertos con migrantes. n.s. = ($P > 0.05$).

	Medicinal	Alimentario	Ornato	Ritual	Sombra	Cerco vivo	Leña	Forraje
HF tot.	5.6 (0-17)	11.7 (0-20)	23.6 (6-50)	0.6 (0-3)	0.9 (0-4)	0.3 (0-2)	0.3 (0-1)	0.1 (0-1)
HF Sin mig	5.6 (0-17)	11.2 (0-18)	23.1 (6-50)	0.7 (0-3)	0.9 (0-4)	0.2 (0-2)	0.3 (0-1)	0.0 (0-0)
HF Con mig	5.6 (1-13)	12.3 (8-20)	24.3 (12-46)	0.5 (0-2)	1.1 (0-3)	0.3 (0-2)	0.3 (0-1)	0.1 (0-1)
χ^2	0.19 n.s.	0.047 n.s.	0.469 n.s.	0.58 n.s.	0.251 n.s.	0.231 n.s.	0.013 n.s.	1.06 n.s.

de las plantas tuvieron un uso ornamental. Las plantas también se consideraron importantes para alejar las “*envidias*” y hacerlas “*olvidar sus penas*” además de ser un reflejo del cuidado que pone su propietaria a su casa, por lo que entre más plantas se tienen, se interpreta que la mujer cumple mejor con su rol de cuidar el hogar. El tener una gran cantidad de plantas diferentes también fue un motivo de orgullo para las mujeres atzincas.

En segundo término quedaron razones asociadas a beneficios tangibles como “*las plantas del huerto son necesarias e indispensables como alimento y remedio para la familia*”, por lo que las plantas medicinales (21%) y las alimentarias (19%) representaron una proporción más reducida que la de las plantas ornamentales. Las plantas rituales, para sombra, cerco vivo, leña, utensilios y forraje representaron el 5% del total de especies. Estas razones nos indican que en el diseño de los huertos atzincas prevalecen los valores intangibles respecto a los pragmáticos, en donde la diversidad aparece como un valor muy destacado en sí mismo. Cuando hablamos de diversidad nos referimos la diversidad de especies vegetales del huerto, pero también a las múltiples combinaciones que hay entre ellas, a la diversidad de estrategias productivas y de manejo de los recursos vegetales, y a los numerosos arreglos espaciales si bien como ya se describió anteriormente, hay ciertas generalidades en estos arreglos. No se encontraron diferencias significativas en el uso de las plantas asociadas sólo a la migración (Cuadro 2).

Manejo del huerto. El 75% de las especies de plantas fueron cultivadas, el 13% protegidas y el 12% toleradas. No hubo diferencias asociadas al estatus migratorio del huerto. Los resultados reflejan la intencionalidad por mantener las plantas en los huertos, pero es interesante que muchas de ellas no tuvieron una finalidad utilitaria, como en el caso de las toleradas, sino que se les conservó por que hay una visión del uso potencial de sus plantas: aunque no se les usa ahora, se les puede llegar a necesitar. Este patrón es compatible con procesos migratorios estacionales y no lo es con la migración permanente de todos los integrantes de la familia.

El 56% de las especies fueron exóticas, el 27% nativas de los ecosistemas locales y el 17% nativas para la región de

Méjico y Centroamérica.

La forma en que las familias obtuvieron las plantas que componen sus huertos también fue muy diversa. Los ejemplares se adquirieron por medio de la compra en los mercados regionales y los invernaderos de la comunidad, el intercambio y regalo entre vecinos y familiares dentro de la misma comunidad o la recolecta y transplante de ejemplares silvestres procedentes de los alrededores. También se encontraron ejemplares provenientes de otros estados del centro y occidente así como del norte del país. Frecuentemente estas plantas fueron un obsequio o intercambio con personas de la propia unidad doméstica o personas allegadas a ella, que emigró a trabajar a esos sitios.

Discusión

Los huertos de San Juan Atzingo son sistemas activos y dinámicos que cuentan con una gran diversidad de especies (Cuadro 3), numerosos usos de las plantas y una compleja estructura horizontal y vertical.

Su estudio nos permitió observar una identidad renovada en el sentido de que la diversidad que sostienen ya no sólo proviene de un origen étnico único, sino de los constantes procesos de transformación que ha sufrido la comunidad, de los constantes flujos de su población y los permanentes intercambios que sostienen con sus entornos cercanos y lejanos a través de los procesos migratorios. En los que se han intercambiado especies vegetales, conocimientos e ideas, dando lugar a expresiones multiculturales que se reflejan en la actual estructura y composición de los huertos.

Consideramos que la diversificación de actividades, aplicada en todas las esferas de la vida cotidiana de las unidades domésticas de esta comunidad, es uno de los factores que ha contribuido a amortiguar los efectos de la migración sobre la composición y estructura de los huertos familiares.

La diversificación de actividades ha sido posible entre los tlahuicas debido a que las familias tienen un promedio de 6.7 integrantes, y una base de recursos, naturales y económicos, que son aprovechados por los miembros de la UD de muy distintas maneras y sin que la ausencia de algunos

Cuadro 3. Comparación de la riqueza de especies vegetales provenientes de los huertos familiares de diferentes grupos indígenas mexicanos y su aportación a la conservación de la flora local. En donde d.n.d corresponde a datos no disponibles y las plantas nativas pueden hacer referencia a especies nativas para Mesoamérica o para los agroecosistemas locales en donde se ubican los huertos, sin embargo no en todos los casos se especifica el criterio utilizado.

Autor	Clima	grupo étnico	Huertos estudiados	Promedio de spp. por huerto	Total de spp. registradas	% nativas
Cano-Ramírez et al. (este artículo)	Templado	tlahuica	33	40.7	287	27
Del Ángel-Pérez y Mendoza-B, 2004	Templado sub-húmedo	totonaco	40	d.n.d	223	d.n.d
Chi-Quej, 2009	Calido-subhúmedo	chol	26	d.n.d	201	d.n.d
De Clerck y Negreros-Castillo, 2000	Cálido-húmedo	maya	78	d.n.d	80	d.n.d
García De Miguel, 2000	Cálido húmedo	maya	300	21.5	156	74
Caballero, 1992	Cálido-húmedo	maya	60	d.n.d	83	32
Vogl et al., 2002	Templado	tzotzil	30	25-82	241	20.7
Basurto-Peña, 1982	Cálido-húmedo	nahua	6	65.5	295	d.n.d
Manzanares-Medina et al., 2009	Semi-cálido	zapoteco	10	31.2	d.n.d	d.n.d
Allison, 1983	d.n.d	nahua	4	33	82	51
Cano-Ramírez, 2003	Cálido sub-húmedo	mixteco	10	30.3	129	56

de sus miembros dificulte el funcionamiento de la UD. Así los distintos miembros de la unidad doméstica pueden integrarse como trabajadores en la economía local, mientras que otros lo pueden hacer en diferentes lugares del país o incluso fuera de él, y enviar dinero a la unidad doméstica (remesas). Estas remesas significan una aportación importante al ingreso de las UD de San Juan Atzingo, 24% del

ingreso está dado por remesas de EU y 13% por remesas nacionales, pero no son la única fuente de ingresos, ni la más importante, como ocurre en otras comunidades en donde éstas pueden llegar a representar hasta el 80% del ingreso total de las UD (De la Tejera *et al.* datos sin publicar). El que el ingreso no esté focalizado en la migración ha repercutido en que la actividad agrícola, en donde se incluyen los huer-




Figura 5. Diagrama de las estrategias de vida de las familias de San Juan Atzingo. Fuente: modificado de De la Tejera-Hernández *et al.* (2008).

tos familiares, no haya disminuido como en otros sitios del país. La diversificación de actividades también provocó que no se observaran diferencias en la utilización de las plantas del huerto, ya que no hubo necesidad de compensar la incertidumbre de las remesas por medio de la introducción de plantas alimentarias como ocurrió en el caso de los huertos mazahuas de San Felipe del Progreso en el Estado de México (Guerrero-Peñuelas, 2007).

La temporalidad de la migración es otro factor que consideramos determinante en la ausencia de diferencias en la composición y estructura de huertos con migrantes y sin migrantes. El 62.3% de los migrantes fueron migrantes temporales, en su mayoría hombres jóvenes, que se fueron con la idea de juntar dinero para poder iniciar una familia o para mejorar las condiciones de vida de la familia que estaban comenzando. Pero siempre migraron con la idea de regresar y establecerse de manera permanente en la comunidad (Salazar-Barrientos, 2009). Esta motivación les permitió mantener el apego y los vínculos con la comunidad, así como el flujo de conocimientos sobre el huerto y sus prácticas de generación en generación. La elección de ciertas especies vegetales por ejemplo, está asociada a su uso en las celebraciones de la comunidad, a los alimentos que se consumen en la vida diaria y a las especies que de generación en generación se han utilizado para tratar las enfermedades de la familia y que la migración temporal permite reproducir. Los vínculos que los migrantes tienen con su comunidad de origen se ven reflejados en su participación en los distintos cargos religiosos y civiles, que es un factor indispensable para la reproducción de la cultura atzinca, ya que justamente son las fiestas y la forma de organización de la vida comunitaria lo que los distingue del resto de los pueblos vecinos y les ha ayudado a formar una identidad propia (Álvarez-Fabela, 2004), si bien hay que entender esta identidad, como lo hemos indicado, es un producto dinámico y no estático, de los procesos multiculturales, de flujos poblacionales y procesos educativos complejos que ha vivido la población de San Juan Atzingo en las décadas recientes.

Finalmente las fuertes redes sociales que existen al interior de la comunidad, han permitido que los efectos de la migración permeen de uno u otro modo en todos los hogares de la comunidad. Las especies que los migrantes nacionales traen en sus visitas se incorporan tanto en sus UD, como en aquellas de sus vecinos y familiares, y lo mismo ocurre con las ideas y conocimientos sobre el huerto de los migrantes nacionales e internacionales. Lo que demuestra que las redes sociales no sólo se dan hacia el interior de la comunidad, si no también hacia el exterior, al existir un constante intercambio de productos e información, fruto de la migración, pero sobre todo de la ubicación geográfica de la comunidad y la presencia de vías de comunicación adecuadas que permiten el rápido acceso a tres grandes ciudades del país como son el Distrito Federal, Toluca y Cuernavaca, desde tiempos remotos.

Bajo este complejo escenario, las familias atzincas han incorporado a su vida cotidiana una multiplicidad de actividades económicas y un manejo del espacio más allá de lo local, permitiendo que el huerto siga siendo un sistema multipropósito vigente. Sin embargo no hay que perder de vista que las circunstancias son cambiantes y que si bien en la actualidad la migración no ha ocasionado cambios tangibles entre huertos con migrantes y sin migrantes, hay circunstancias que podrían derivar en un escenario totalmente distinto. Hoy en día la migración de carácter temporal, está tendiendo a volverse internacional, definitiva y a incluir cada vez más al sector femenino por el endurecimiento de las políticas internacionales que dificultan el regreso de los migrantes, el fortalecimiento de las redes familiares y sociales en EU que facilita la llegada y establecimiento de los migrantes en dicho país, y la difícil situación económica de la comunidad que se ha recrudecido en los últimos años y que ha impulsado a muchos pobladores a tomar la decisión de migrar (Salazar-Barrientos, 2009). Por otra parte las políticas públicas regionales expresadas en el apoyo a programas productivos, como en el caso de los invernaderos de flor, podrían reorientar la estrategia diversificada de actividades hacia la ocupación mono-específica como una apuesta a una actividad momentáneamente exitosa, sobre todo porque en los últimos años la comunidad ha recibido cuantiosos apoyos gubernamentales por ser los “últimos indígenas tlahuicas”, lo que de no manejarse adecuadamente, podría aumentar la dependencia económica de la comunidad y cambiar la relación huertos-migración.

Por ello para entender mejor esta relación proponemos analizar a mayor detalle las características del proceso migratorio, ya que la sola caracterización de las UD de acuerdo a la presencia o ausencia de migrantes no basta para comprender las consecuencias de este proceso. El número de migrantes por UD, así como el número de migraciones, el género, edad, destino, ocupación, temporalidad de la migración y rol del migrante dentro de la familia son variables a tomar en cuenta para un análisis más detallado de esta relación.

Finalmente consideramos que es indispensable continuar explorando junto a los pobladores estas relaciones complejas a partir de metodologías múltiples que nos permitan tener una perspectiva más amplia y multidimensional para así descubrir las distintas variables y sus matices que están interviniendo en los efectos que está teniendo la migración sobre la unidad doméstica y el huerto familiar, en particular en su estructura, composición y funciones.

Agradecimientos

Agradecemos el apoyo al Consejo Nacional para la Ciencia y la tecnología y al Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para el desarrollo de este trabajo, así como a Heberto Ferrei-

ra y Alberto Valencia, por su apoyo en el procesamiento de la información, a Eduardo García-Frapolli, Andrés Camou y Ernesto Vega por sus valiosas sugerencias, así como a los dos revisores anónimos por colaborar con sus observaciones a la mejora del manuscrito original. A Juan Martínez por el apoyo en la identificación de las especies de plantas. Y en especial a los pobladores de San Juan Atzingo y Lomas de Teocaltzingo, Estado de México.

Literatura citada

- Agelet A., Bonet M.A. y Vallés J. 2000. Homegardens and their role as a main source of medicinal plants in mountain regions of Catalonia (Iberian Peninsula). *Economic Botany* **54**:295-309.
- Aguilar-Støen M., Moe S.R. y Camargo-Ricalde S.L. 2009. Home Gardens sustain crop diversity and improve farm resilience in Candelaria Loxicha, Oaxaca, México. *Human Ecology* **37**:55-77.
- Allison J.L. 1983. An ecological analysis of home Gardens (huertos familiares) in two mexican villages. Tesis de maestría University of California, Santa Cruz. 196 pp.
- Álvarez-Fabela R.L. 2004. Tlahuicas. Serie Pueblos indígenas del México contemporáneo, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Disponible en línea: <www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi d=52&Itemid=200020> (consultado abril 2008).
- Appendini K. y Nuijten M. 2008. El papel de las instituciones en contextos locales: cuestiones metodológicas en investigación de campo. En: García-Barrios R., De la Tejera-Hernández B. y Appendix K. Coords. *Instituciones y Desarrollo, Ensayos sobre la Complejidad del Campo Mexicano*, pp. 251-280, Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Autónoma Chapingo/El Colegio de México, México, D.F.
- Arzate-Salgado J. y Vizcarra-Bordi I. 2007. De la migración masculina transnacional: Violencia estructural y género en comunidades campesinas del Estado de México. *Migración y Desarrollo* **9**:95-112.
- Benjamin T.J., Montañez P.I., Jiménez J.J.M y Gillespie A.R. 2001. Carbon, water and nutrient flux in Maya homegardens in the Yucatán Peninsula of México. *Agroforestry Systems* **53**:103-111
- Blancas J., Casas A., Rangel-Landa S., Moreno-Calles A., Torres I., Pérez-Negrón E., Solís L., Delgado-Lemus A., Parra F., Arellanes Y., Caballero J., Cortés L., Lira R. y Dávila P. 2010. Plant management in the Tehuacán-Cuicatlán Valley, Mexico. *Economic Botany* **64**:287-302.
- Boege E. 2008. *El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México: Hacia la Conservación in situ de la Biodiversidad y Agrodiversidad en los Territorios Indígenas*. Instituto Nacional de Antropología e Historia/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, D.F.
- Basurto-Peña F.A. 1982. Huertos familiares en dos comunidades nahuas de la Sierra Norte de Puebla: Yanquitlalpan y Cuauhtapanaloyan. Tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 140 pp.
- Caballero J. 1992. Maya homegardens: Past, present and future. *Etnoecológica* **1**:35-54.
- Cano-Ramírez M. 2003. Los huertos familiares de Tepango, Guerrero. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 95 pp.
- Casas A., Vázquez M.C., Viveros J.L. y Caballero J. 1996. Plant management among the Nahua and the Mixtec of the Balsas river basin: an ethnobotanical approach to the study of plant domestication. *Human Ecology* **24**:455-478.
- Casas A., Otero-Arnaiz A., Pérez-Negrón E. y Valiente-Banuet A. 2007. In situ management and domestication of plants in Mesoamerica. *Annals of Botany* **100**:1101-1115.
- Chi-Quej J.A. 2009. Caracterización y manejo de los huertos caseros familiares en tres grupos étnicos (Mayas peninsulares, Choles y Mestizos) del Estado de Campeche, México. Tesis de maestría, Escuela de Posgrado, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica. 99 pp.
- De Clerck F.A.J. y Negreros-Castillo, P. 2000. Plant species of traditional mayan homegardens of Mexico as analogs for multistrata agroforests. *Agroforestry Systems* **48**:303-317.
- De la Tejera-Hernández B. y García-Barrios R. 2008, Agricultura y estrategias de formación de ingreso campesinas en comunidades indígenas forestales oaxaqueñas. En: García-Barrios R., De la Tejera-Hernández B. y Appendix K. Coords. *Instituciones y Desarrollo, Ensayos sobre la Complejidad del Campo Mexicano*, pp. 65-103, Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Autónoma Chapingo/El Colegio de México, México, D.F.
- Del Ángel-Pérez A.L. y Mendoza-B.M.A. 2004. Totonac homegardens and natural resources in Veracruz, Mexico. *Agriculture and Human Values* **21**:329-346.
- Ellis F. y Allison E. 2004. Livelihood diversification and natural resource access. LSP working paper 9, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Norwich. Disponible en línea: <www.fao.org/es/esw/lsp/cd/img/docs/LSPWP9.pdf> (consultado enero 2011).
- Engels J. 2002. Home gardens-a genetic resources perspective. En: Watson J.W. y Eyzaguirre P.B. 2002. Proceedings of the Second International Home Gardens Workshop: Contribution of home gardens to in situ conservation of plant genetic resources in farming systems, International Plant Genetic Resources Institute, Rome.
- García de Miguel J. 2000. Etnobotánica maya: origen y evolución de los huertos familiares de la Península de Yucatán, México. Tesis doctoral, Universidad de Córdoba, Córdoba. 242 pp.
- González-Ortiz F. 2005. *Estudio Sociodemográfico de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de México*, Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México/ El Colegio Mexiquense A.C., México.
- Gotelli N.J. y Colwell R.K. 2001. Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness. *Ecology Letters* **4**:379-391.
- Guerrero-Peña A.G. 2007. El impacto de la migración en el manejo de solares campesinos, caso de estudio La Purísima Concepción Mayorazgo, San Felipe del Progreso, Estado de México. *Investigaciones Geográficas* **63**:105-124.
- Hernández-Suárez C. y Vázquez-García V. 2007. La problemática socioambiental de la cuenca del río Texcoco. Una revisión de literatura. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo* **4**:39-52.
- Howard P.L. 2006. Gender and social dynamics in swidden and homegardens in Latin America. En: Kumar B.M. y Nair P.K.R. Eds. *Tropical Homergardens. A Time-Tested Example of Sustainable Agroforestry*, pp. 159-182, Springer, Dordrecht.
- IDRC [International Development Research Centre]. 2007. Annual Report 2006-2007. Disponible en línea: <<http://www.idrc.org>>

- ca/en/ev-100690-201-1-DO_TOPIC.html» (consultado octubre 2009).
- INEGI [Instituto Nacional De Estadística y Geografía]. 2000. XII Censo General de Población y Vivienda. Disponible en línea: <http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/censos/cpv2000/PTL.asp?s=est&c=10261&proy=cpv00_pt> (consultado marzo 2007)
- INEGI. 2010. Censo de Población y vivienda: datos preliminares. Disponible en línea: <http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx?c=27329&s=est> (consultado mayo 2011).
- Kimber C.T. 2004. Gardens and dwelling: people in vernacular gardens. *Geographical Review* **94**:263-283.
- Korsbaek L. y Álvarez-Fabela R.L. 2002. Lengua y etnicidad: dos casos en el Estado de México. *Convergencia* **29**:181-216.
- Miller R.P., Penn J.W. y van Leeuwen J. 2006. Amazonian homegardens: their ethnohistory and potential contribution to agroforestry development. En: Kumar B.M. y Nair P.K.R. Eds. *Tropical Homergardens. A Time-Tested Example of Sustainable Agroforestry*, pp. 43-60, Springer, Dordrecht.
- Moreno-Calles A., Casas A., Blancas J., Torres I., Masera O., Caballero J., García-Barrios L., Pérez-Negrón E. y Rangel-Landa S. 2010. Agroforestry systems and biodiversity conservation in arid zones: the case of the Tehuacan Valley, Central México. *Agroforestry Systems* **80**:315-331.
- Magurran A. 2004. *Measuring Biological Diversity*. Blackwell Publishing, Malden.
- Manzanares-Medina G.I., Flores-Martínez A. y Hunn E.S. 2009. Los huertos familiares zapotecos de San Miguel Talea de Castro, Sierra Norte de Oaxaca, México. *Etnobiología* **7**:9-29.
- Nair P.K.R. 2006. Whither homegardens?. En: Kumar B.M. y Nair P.K.R. Eds. *Tropical Homergardens. A Time-Tested Example of Sustainable Agroforestry*, pp. 355-370, Springer, Dordrecht.
- Orellana-Gallego R., Castañeiras L., Fundadora Z., Shagarodsky T., Fuentes V., Barrios O., Cristóbal R., García M., Hernández F., García M., Giraudy C., Fernández L., Sánchez P., Moreno V. y Valiente A. 2006. Contribución de los huertos caseros rurales cubanos a la sostenibilidad ambiental. Cub@: *Medio ambiente y desarrollo*. Disponible en línea: <http://www.medioambiente.cu/revistama/11_02.asp> (consultado junio 2010).
- Pagaza-Calderón E.M. 2009. Efecto de la urbanización y el cambio cultural en la estructura florística de los huertos familiares y su papel en la conservación de especies silvestres, un estudio de caso en Tlacuilotepec, Puebla. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. 83 pp.
- Parra F., Casas A., Peñaloza-Ramírez J.M., Cortés-Palomé A.C., Rocha-Ramírez V. y González-Rodríguez A. 2010. Evolution under domestication: ongoing artificial selection and divergence of wild and managed *Stenocereus pruinosus* (Cactaceae) populations in the Tehuacán Valley, Mexico. *Annals of Botany* **106**:483-496.
- Peyre A., Guidal A., Wiersum K.F. y Bongeres F. 2006. Dynamics of homegarden structure and function in Kerala, India. *Agroforestry Systems* **66**:101-115.
- Pulido M.T., Pagaza-Calderón E.M., Martínez-Ballesté A., Maldonado-Almanza B., Saynes A. y Pacheco R.M. 2008. Home Gardens as an alternative for sustainability: challenges and perspectives in Latin America. En: Albuquerque U.P y Alves-Ramos M. Eds. *Current Topics in Ethnobotany*, pp.1-25, Research Signpost, Kerala.
- Rebaï N. 2009. Migración, dinámicas territoriales y nueva ruralidad: un punto de vista desde la sierra ecuatoriana. Disponible en línea: <http://legal2009.easyplanners.info/area08/8155_Reba%25ef_Nasser.doc> (consultado junio 2010).
- Ruenes-Morales M.R. 1993. Estudio de los huertos familiares en los ejidos El Ahuacate y Adolfo López Mateos, de la Sierra de San Juan, Nayarit. Tesis de maestría, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 156 pp.
- Salazar-Barrientos L.L. 2009. Migración y economía campesina: miradas para reflexionar en el caso de San Juan Atzingo, Mex. Tesis de maestría, Centro Regional Universitario Centro Occidente, Universidad Autónoma Chapingo, Morelia, Michoacán. 145 pp.
- Vargas S.B. 2009. Ruralidades emergentes y dinámicas territoriales: nuevas percepciones y medios de vida. *Eleuthera* **3**:194-205.
- Vogl C.R., Vogl-Lukasser B.N. y Caballero J. 2002. Homegardens of maya migrants in the district of Palenque, Chiapas, Mexico. Implications for sustainable rural development. En: Stepp J.R., Wyndham F.S y Zarger R.K. Eds. *Ethnobiology and Biocultural Diversity*, pp. 631-647, University of Georgia Press, Georgia.
- Wiersum K.F. 2006. Diversity and change in homegarden cultivation in Indonesia. En: Kumar B.M. y Nair P.K.R. Eds. *Tropical Homergardens. A Time-Tested Example of Sustainable Agroforestry*, pp. 13-24, Springer, Dordrecht.
- Zarate-Vargas G. 2007. Estrategias campesinas de producción y comercialización de nopal y chícharo en la comunidad de San Juan Atzingo, estado de México: hacia una propuesta agroecológica y de desarrollo local. Tesis de maestría. Centro Regional Universitario Centro Occidente, Universidad Autónoma Chapingo, Morelia, Michoacán. 199 pp.

Recibido: 12 de abril de 2011

Aceptado: 10 de noviembre de 2011

Apéndice. Listado de plantas perennes de los huertos de San Juan Atzingo

Familia	Nombre científico	Nombre común
Acanthaceae	<i>Hypoestes sanguinolenta</i> Hook. <i>Jacobinia spicigera</i> L.H.Bailey <i>Pachystachys lutea</i> Ness. <i>Thunbergia alata</i> Bojer ex Sims	*Sp. 2 Muicile *Sp. 1 Ojo de cabra/O. pájaro/ O. canario
Asparagaceae	<i>Agave salmiana</i> Otto. <i>Agave tequilana</i> F.A.C.Weber <i>Asparagus plumosus</i> Baker <i>Asparagus sprengeri</i> Regel <i>Cordyline rubra</i> Heugel ex Kunth	Maguey pulquero Agave mezcalero "Helecho" Esparrago Hoja sombra
Altingiaceae	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidambar
Aizoaceae	<i>Aptenia cordifolia</i> (L.f.) Schwantes	*Sp. 13
Aloeaceae	<i>Aloe arborescens</i> Mill. <i>Aloe aristata</i> Haw. <i>Aloe juvenna</i> Brandham & S.Carter <i>Aloe saponaria</i> Haw. <i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f. <i>Haworthia fasciata</i> Haw.	Sábila hembra Cactus Cactus Sábila pinta Sábila *Sp. 3
Amaranthaceae	<i>Comphrena serrata</i> L.	Bolitas rosas
Amaryllidaceae	<i>Agapanthus africanus</i> Hoffmanns. <i>Hippeastrum</i> sp. <i>Polianthes tuberosa</i> L.	Agapando Azucena roja Nardo
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	Pirul
Apiaceae	<i>Apium graveolens</i> L. <i>Foeniculum vulgare</i> Miller.	Apio Hinojo
Apocynaceae	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don <i>Mandevilla sanderi</i> (Hemsl.) Woodson <i>Mandevilla x amabilis</i> (hort. James Backhouse & Son) Dress <i>Nerium oleander</i> L. <i>Saintpaulia ionantha</i> H.Wendl.	Chino *Sp. 14 Adelfa Violeta africana
Araceae	<i>Anthurium andraeanum</i> Linden <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott <i>Dieffenbachia bowmannii</i> Carrière <i>Monstera obliqua</i> Miq. <i>Philodendron scandens</i> K.Koch & Sello <i>Spathiphyllum wallisii</i> Hort. <i>Zantedeschia aethiopica</i> L. <i>Zantedeschia elliotiana</i> Engl.	Anturio Hoja residencias/ H. elegante Hoja de sombra Calavera/ Esqueleto Teléfono Cuna de Moisés/ Cuna de Noé Alcatraz Alcatraz amarillo
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L. <i>Schefflera elegantissima</i> (Veitch ex Masters) Lowry & Frodin	Hiedra Sombra
Araucariaceae	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb) Franco	Araucaria
Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	Palma
Asclepiadaceae	<i>Ceropegia woodii</i> Schltr.	Dos corazones en un hilo

Apéndice. Continuación

Familia	Nombre científico	Nombre común
Aspleniaceae	<i>Asplenium monanthes</i> L.	Helecho 3
Asteraceae	<i>Argyranthemum frutescens</i> Sch.Bip. <i>Artemisia absinthium</i> L. <i>Artemisia ludoviciana</i> Nutt. <i>Baccharis conferta</i> Kunth <i>Barkleyanthus salicifolius</i> (Kunth) H. Rob. & Bretell <i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sheriff <i>Bidens ballii</i> Sheriff <i>Brickellia scoparia</i> A.Gray <i>Calendula officinalis</i> L. <i>Centaurea cineraria</i> L. <i>Chrysanthemum</i> sp. <i>Chrysanthemum grandiflorum</i> Hook. <i>Chrysanthemum maximum</i> Ramond <i>Cirsium subcoriaceum</i> Sch. Bip <i>Dahlia coccinea</i> Cav. <i>Dahlia excelsa</i> Benth. <i>Dahlia rufa</i> P.D.Sørensen <i>Dimorphotheca ecklonis</i> D.C <i>Euryops pectinatus</i> Cass. <i>Gazania nivea</i> Less. <i>Gerbera anandria</i> Sch.Bip. <i>Heterotheca inuloides</i> Cass. <i>Matricaria chamomilla</i> L. <i>Melampodium</i> sp. <i>Montanoa grandiflora</i> Hemsl. <i>Montanoa tomentosa</i> Cerv. morfoespecie 3 <i>Pinaropappus roseus</i> Less. <i>Piqueria trinervia</i> Cav. <i>Stevia salicifolia</i> Cav. <i>Tanacetum parthenium</i> Sch.Bip. <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber	"como crisantemo" Ajenjo Estafiate de casa y de monte Escoba de popote/ Tepopote Jara de monte Acahuall delgado Acahuall amarillo/ A. grueso Prodigiosa Coronilla Espuma de mar Polar Crisantemo Margaritón Cardo Dalia doble Taxqueña/ Costeña Dalia cimarrona Margarita morada Margarita canario Novia del sol/ Agazania Gerbera Árnica Manzanilla Hierba de la clín Girasol blanco Zohuapacle Ambar Ixchpul Hierba de San Nicolás Hierba del aire Santa maría Diente de león/ Lechuguilla
Balsaminaceae	<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Belén 2
Begoniaceae	<i>Begonia x tuberhybrida</i> <i>Begonia coccinea</i> Hook <i>Begonia gracilis</i> Kunth <i>Impatiens balsamina</i> L.	Tuberosa Ala de ángel Begonia Belén 1
Bignoniaceae	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm. <i>Podranea ricasoliana</i> Sprague <i>Tecomaria stans</i> (L.) Kunth <i>Tournefortia densiflora</i> Mart. et Galeotti	No me olvides Enredadera 2 * Sp. 8 Hierba rasposa
Bromeliaceae	<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) <i>Ananas comosus</i> (L.) Merr. <i>Tillandsia usneoides</i> L.	Planta elegante Piña Heno
Buddlejaceae	<i>Buddleja perfoliata</i> Kunth <i>Buddleja cordata</i> Kunth <i>Buddleja sessiliflora</i> Kunth	Tepozán Tepozán de San Juan 2 Tepozán de San Juan 1
Cactaceae	<i>Aporocactus flagelliformis</i> Lem.	* Sp. 9

Apéndice. Continuación

Familia	Nombre científico	Nombre común
	<i>Austrocylindropuntia subulata</i> (Engelm.) Backeb. <i>Cereus forbesii</i> Hort.Berol. ex Foerst. <i>Chamaecereus silvestrii</i> Britton & Rose <i>Echinopsis eyriesii</i> Pfeiff. & Otto <i>Helicocereus speciosus</i> Britton & Rose <i>Hylocereus undatus</i> Britton & Rose <i>Mammillaria</i> sp. <i>Mammillaria spinosissima</i> Salm-Dyck <i>Marginatocereus marginatus</i> (DC.) Backeb. <i>Opuntia ficus-indica</i> (L) Mill. <i>Opuntia microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff <i>Opuntia</i> sp. <i>Rhipsalidopsis gaertneri</i> (K.Schum.) Linding.	Cactus 2 Cactus Felipa 3 Cacahuate Cactus juliana I Pitahaya 1 *Sp. 4 Piña/ Bisnaga de monte Piñita comprada Órgano Nopal verdura var. Milpa Alta Cactus Genoveva 1 Nopalillo Pitahayita
Campanulaceae	<i>Lobelia laxiflora</i> Kunth	Aretillo cimarrón/ La suegra
Cannaceae	<i>Canna indica</i> L.	Platanillo
Caprifoliaceae	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Madre selva
Caryophyllaceae	<i>Dianthus caryophyllus</i> L. <i>Dianthus deltoides</i> L. <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	Clavel Clavellina Violeta
Celastraceae	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Ebónimo
Clusiaceae	<i>Hypericum calycinum</i> L.	Mariposa
Commelinaceae	<i>Commelina diffusa</i> Burm.f. <i>Gibasis geniculata</i> (Jacq.) Rohweder <i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D.R.Hunt	*Sp. 5 *Sp 5 *Sp 15
Convolvulaceae	<i>Ipomea</i> sp.	Estafiate de monte
Crassulaceae	<i>Aeonium arboreum</i> Webb & Berthel. <i>Echeveria secunda</i> Booth ex Lindl. <i>Echeveria shaviana</i> E.Walther <i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln. <i>Kalanchoe serrata</i> Mannoni & Boiteau <i>Kalanchoe tomentosa</i> Baker <i>Sedum burrito</i> R.Moran <i>Sedum dasypetalum</i> L. <i>Sedum dendroideum</i> DC. <i>Sedum greggii</i> Hemsl. <i>Sedum morganianum</i> E. Walther <i>Sedum oxypetalum</i> Kunth. <i>Sedum pachucense</i> Praeger <i>Sedum pachyphyllum</i> Rose <i>Sedum quevae</i> Raym. Hamet	Conchita grande Magueyito de las peñas Oreja de burro/ Hoja de lechuga clara Coral/ Anchoa Cola de lagartija *Sp. 16 Cola de zorro Piojito Del monte Conchita chica de monte Cola de borrego Oreja de ratón Rocío Deditos de dios/ Manita/ Siempre vive Chisme/ Estrellita
Cruciferae	<i>Matthiola incana</i> (L.) W.T.Aiton	Alelía
Cucurbitaceae	<i>Sechium edule</i> Sw.	Chayote

Apéndice. Continuación

Familia	Nombre científico	Nombre común
Cupresaceae	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl. <i>Cupressus macrocarpa</i> A.Cunn. <i>Cupressus sempervirens</i> L. <i>Juniperus deppeana</i> Steud.	Pino chimancipare Cedrito limón Cipres italiano Cedro
Davalliaceae	<i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott <i>Nephrolepis</i> sp.	Helecho 4 Helecho 5
Dracaenaceae	<i>Dasylirion</i> sp. <i>Dracaena deremensis</i> Engl. <i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl. <i>Dryopteris wallichiana</i> (Spreng.) Hyl. <i>Plecosorus speciosissimus</i> (A.Braun) T.Moore	Maguey cucharilla/ M. de la virgen/M. para portadas *Sp. 6 Hoja rayitas Palmita Helecho 2
Ericaceae	<i>Arctostaphylos pungens</i> Kunth <i>Azalea japonica</i> A.Gray	Pinguica Azalea
Euphorbiaceae	<i>Acalypha hispida</i> Willd. <i>Euphorbia milii</i> Des Moul. <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch <i>Euphorbia trigona</i> Mill. <i>Ricinus communis</i> L.	Gusanito Corona de Cristo Nochebuena Cactus *Sp. 18
Fabaceae	<i>Erythrina americana</i> Mill. <i>Senna multiglandulosa</i> (Jacquin) H.S.Irwin & Barneby <i>Trifolium mexicanum</i> Hemsl.	Colorín/ Zopacle Retama Xocoyol de conejo/ (trébol normal)
Fagaceae	<i>Quercus laurina</i> Humb. & Bonpl. <i>Quercus rugosa</i> Née	Encino delgado Encino grueso
Gentianaceae	<i>Gentiana spathacea</i> Kunth	Mira cielo
Geraniaceae	<i>Geranium seemannii</i> Pehr. <i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hér. <i>Pelargonium x domesticum</i> L.H. Bailey	Pata de león/ Mano de león/ Pata de gallo Geranio Malvón
Hemerocallidaceae	<i>Hemerocallis flava</i> L.	Lirio amarillo
Hydrangeaceae	<i>Hydrangea hortensis</i> Siebold <i>Philadelphus mexicanus</i> Schltld.	Hortensia Jazmín doble
Iridaceae	<i>Crocosmia</i> Planch <i>Gladiolus</i> sp. <i>Iris germanica</i> L.	Agapando naranja/ Leonora Gladiola/ Palmira Lirio 1
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	Nogal
Labiatae	<i>Agastache mexicana</i> (Kunth) Lint & Epling <i>Lepechinia caulescens</i> (Ortega) Epling <i>Melissa officinalis</i> L. <i>Origanum majorana</i> L. <i>Salvia mexicana</i> L. <i>Thymus vulgaris</i> L.	Toronjil de casa Bretónica/ Sonajilla Toronjil Mejorana de monte Chía corriente Tomillo

Apéndice. Continuación

Familia	Nombre científico	Nombre común
Lamiaceae	<i>Coleus blumei</i> Benth. <i>Marrubium vulgare</i> L. <i>Mentha viridis</i> (L.) L. <i>Origanum vulgare</i> L. <i>Plectranthus australis</i> R.Br. <i>Plectranthus cylindraceus</i> Hochst. <i>Rosmarinus officinalis</i> L. <i>Salvia gesneraeflora</i> Lindl. <i>Salvia iodantha</i> Fernald <i>Salvia lavanduloides</i> Kunth. <i>Salvia microphylla</i> Kunth	*Sp. 16 Marrubio Hierbabuena Orégano Moneda Vaporub Romero Mirto rojo grande/ M. cimarrón (silvestre) Mirto rojo chico Chía 2 Mirto rosa de casa
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i> L. <i>Persea americana</i> Mill.	Laurel Aguacate
Leguminosae	<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd. <i>Inga spuria</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	* Sp. 5 Cajinicuil
Liliaceae	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques <i>Hyacinthus orientalis</i> L. <i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken <i>Lilium candidum</i> L. <i>Lilium</i> sp. <i>Lilium speciosum</i> Thunb. <i>Tigridia pavonia</i> (L.f.) DC.	Mala madre Jacinto Mazorquita naranja Azucena rosa Lili Acapulco Lirio 2
Lobeliaceae	<i>Lobelia erinus</i> L.	Mosquito
Lythraceae	<i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth <i>Heimia salicifolia</i> Link & Otto <i>Punica granatum</i> L.	*Sp. 8 Chinicuil Granada roja
Malvaceae	<i>Abutilon hybridum</i> Hort. <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L. <i>Malva</i> aff. <i>sylvestris</i> <i>Sphaeralcea angustifolia</i> G.Don	Linda tarde Tulipán Malva de casa Hierba del negro
Melastromataceae	<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	Martha
Moraceae	<i>Ficus carica</i> L. <i>Ficus microcarpa</i> Hort.Berol. ex Walp.	Higo *Sp. 9
Musaceae	<i>Musa paradisiaca</i> L.	Plátano
Myrtaceae	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Wild. <i>Callistemon citrinus</i> Staph <i>Eucalyptus cinerea</i> F.Muell. ex Benth. <i>Eucalyptus globulus</i> Labill <i>Psidium guajava</i> L.	Bugambilia *Sp. 10 Dólar Eucalipto/ Alcanfor Guayaba
Nictaginaceae	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Maravilla del campo
Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam. <i>Fuchsia microphylla</i> Kunth. <i>Lopezia racemosa</i> Cav.	Aretillo Aretillo miniatura Lujo silvestre

Apéndice. Continuación

Familia	Nombre científico	Nombre común
Orchidaceae	<i>Laelia</i> sp.	Orquídea rosa
Oxalidaceae	<i>Oxalis alpina</i> Rose ex R.Knuth <i>Oxalis latifolia</i> Kunth <i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Xocoyol de casa Xocoyol blanco Xocoyol de milpa
Passifloraceae	<i>Passiflora ligularis</i> L. <i>Passiflora mollissima</i> L.H.Bailey	Granada moco Granada agria
Pinaceae	<i>Abies religiosa</i> (Kunth) Schltl. & Cham. <i>Pinus teocote</i> L.	Oyamel Ocote de monte
Piperaceae	<i>Peperomia caperata</i> Yunck. <i>Pipper auritum</i> Kunth. <i>Plantago australis</i> Lam.	Cascara de nuez/hoja de nuez Hierbasanta Lantén
Poaceae	<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf <i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	Zacate limón Bambú/junco
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L. <i>Rumex mexicanus</i> L.	Lengua de vaca fina Lengua de vaca corriente
Portulacaceae	<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	Árbol abundancia/ A. suerte/ A. fortuna
Primulaceae	<i>Primula vulgaris</i> Huds.	* Sp. 7
Pteridaceae	<i>Cheilanthes bonariensis</i> (Willd.) Proctor	Helecho 1
Ranunculaceae	<i>Aquilegia vulgaris</i> L. <i>Clematis dioica</i> L.	Aquilegia Jazmín sencillo
Rosaceae	<i>Crataegus pubescens</i> Steud. <i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. <i>Esenbeckia</i> sp. <i>Fraxinus excelsior</i> L. <i>Malus domestica</i> Borkh. <i>Prunus armeniaca</i> L. <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. <i>Prunus domestica</i> L. <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch <i>Prunus salicina</i> Lindl. <i>Prunus serotina</i> Ehrh. <i>Pyrus communis</i> L. <i>Pyrus malus</i> L. <i>Rosa centifolia</i> L. <i>Rosa</i> sp. <i>Rubus fruticosus</i> L. <i>Rubus idaeus</i> L.	Tejocote Frecita de monte Níspero Clavo Fresno Manzana Chabacano Ciruelo pasa Ciruelo rojo Durazno Ciruelo amarillo Capulín Pera Perón Rosa castilla Rosa Zarza cultivada y zarza de lindero Frambuesa
Rutaceae	<i>Casimiroa edulis</i> La Llave <i>Citrus sinensis</i> Pers. <i>Citrus limetta</i> Risso <i>Citrus limon</i> L.	Zapote blanco Naranja Lima Limón

Apéndice. Continuación

Familia	Nombre científico	Nombre común
	<i>Citrus nobilis</i> Lour. <i>Ruta graveolens</i> L.	Mandarina agria Ruda
Plantaginaceae	<i>Antirrhinum majus</i> L. <i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertn., B.Mey. & Schreb. <i>Datura sanguinea</i> Ruiz & Pav. <i>Digitalis purpurea</i> L. <i>Lophospermum scandens</i> Sessé & Moc. Ex D. Don <i>Maurandya scandens</i> Pers. <i>Penstemon campanulatus</i> Willd <i>Penstemon roseus</i> G.Don	Perrito de casa Greñas de mi suegra Florifundio Perrito de monte Flor de lujo del cerro Flor Sofía Jarrita del monte Jarrita chiquita
Sapindaceae	<i>Serjania triquetra</i> Radkl.	Tres costillas
Solanaceae	<i>Bouchetia</i> sp. <i>Cestrum anagyris</i> Dunal <i>Cestrum nocturnum</i> L. <i>Jaltomata procumbens</i> L. <i>Lycopersicum esculentum</i> Mill. <i>Petunia × hybrida</i> E.Vilm.	*Sp. 17 Hierba negra Huele de noche Jaltomate morado Jitomate Petunia
Strelitziaceae	<i>Strelitzia reginae</i> Banks	Ave del paraíso
Taxodiaceae	<i>Taxodium mucronatum</i> Ten.	Ahuehuete
Theaceae	<i>Camellia japonica</i> L. <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	*Sp. 11 Té negro
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum majus</i> L.	*Sp. 12
Urticaceae	<i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy <i>Urtica mexicana</i> Blume	Alfombra Chichicaxtle
Verbenaceae	<i>Aloysia citrodora</i> Palau <i>Lantana camara</i> L. <i>Priva mexicana</i> Sieber ex Steud.	Cedrón Mil amores/ La nuera y la suegra Verbena
Violaceae	<i>Viola tricolor</i> L.	Pensamiento
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Uva