

Suplemento 2. Índice de valor de importancia de las especies presentes en el sitio 2 en el ejido de Hobomó, municipio de Campeche.

| Familia        | Especie                                                | DR   | FR   | DR    | VI    |
|----------------|--------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| Fabaceae       | <i>Lysiloma latisiliquum</i> (L.) Benth.               | 3.92 | 3.95 | 16.96 | 24.83 |
| Burseraceae    | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.                     | 2.54 | 3.56 | 14.24 | 20.33 |
| Lamiaceae      | <i>Vitex gaumeni</i> Greenm.                           | 1.50 | 3.16 | 12.90 | 17.56 |
| Fabaceae       | <i>Lonchocarpus xuul</i> Lundell                       | 5.07 | 3.16 | 7.65  | 15.89 |
| Rubiaceae      | <i>Machaonia lindeniana</i> Baill.                     | 9.46 | 3.16 | 2.47  | 15.09 |
| Polygonaceae   | <i>Coccoloba cozumelensis</i> Hemsl.                   | 7.38 | 3.56 | 2.27  | 13.21 |
| Polygonaceae   | <i>Coccoloba barbadensis</i> Jacq.                     | 5.31 | 3.16 | 4.45  | 12.92 |
| Meliaceae      | <i>Trichilia</i> sp.                                   | 3.58 | 3.16 | 4.11  | 10.84 |
| Malpighiaceae  | <i>Malpighia glabra</i> L.                             | 7.27 | 2.77 | 0.73  | 10.76 |
| Polygonaceae   | <i>Coccoloba acapulcensis</i> Standl.                  | 1.85 | 2.77 | 3.31  | 7.93  |
| Annonaceae     | <i>Mosannonna depressa</i> (Baill.) Chatrou            | 3.81 | 3.16 | 0.55  | 7.52  |
| Fabaceae       | <i>Swartzia cubensis</i> (Britton & P. Wilson) Standl. | 2.54 | 1.58 | 3.18  | 7.30  |
| Sapotaceae     | <i>Sideroxylon americanum</i> (Mill.) T.D. Penn.       | 2.42 | 2.37 | 2.15  | 6.94  |
| Polygonaceae   | <i>Gymnopodium floribundum</i> Rolfe                   | 2.08 | 0.79 | 3.48  | 6.35  |
| Euphorbiaceae  | <i>Croton arboreus</i> Millsp.                         | 3.00 | 1.98 | 1.05  | 6.03  |
| Sapindaceae    | <i>Allophylus cominia</i> (L.) SW.                     | 2.08 | 2.37 | 0.96  | 5.40  |
| Menispermaceae | <i>Hyperbaena winzerlingii</i> Standl.                 | 2.31 | 2.37 | 0.69  | 5.37  |
| Ebenaceae      | <i>Diospyros tetrasperma</i> Sw.                       | 1.73 | 2.37 | 1.20  | 5.31  |
| Nyctaginaceae  | <i>Neea psychotrioides</i> Donn. Sm.                   | 2.19 | 2.37 | 0.62  | 5.19  |
| Rubiaceae      | <i>Exostema caribaeum</i> (Jacq.) Roem. & Schult.      | 1.38 | 1.98 | 1.58  | 4.94  |
| Sapotaceae     | <i>Sideroxylon celastrinum</i> (Kunth) T.D. Penn.      | 1.61 | 2.37 | 0.91  | 4.90  |
| Celastraceae   | <i>Semialarium mexicanum</i> (Miers) Mennega           | 1.85 | 2.37 | 0.48  | 4.70  |
| Rubiaceae      | <i>Randia longiloba</i> Hemsl.                         | 1.85 | 2.37 | 0.27  | 4.48  |
| Rubiaceae      | <i>Guettarda combsii</i> Urb.                          | 1.27 | 2.77 | 0.44  | 4.48  |
| Sapindaceae    | <i>Thouinia paucidentata</i> Radlk.                    | 1.04 | 1.19 | 1.82  | 4.04  |
| Rubiaceae      | <i>Randia aculeata</i> L.                              | 1.85 | 1.98 | 0.14  | 3.97  |

|              |                                            |      |      |      |      |
|--------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| Boraginaceae | <i>Cordia gerascanthus</i> L.              | 0.81 | 1.98 | 1.13 | 3.92 |
| Myrtaceae    | <i>Psidium sartorianum</i> (O. Berg) Nied. | 1.38 | 1.58 | 0.55 | 3.51 |

|                 |                                                         |      |      |      |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Malvaceae       | <i>Hampea trilobata</i> Standl.                         | 0.92 | 2.37 | 0.21 | 3.50 |
| Ebenaceae       | <i>Diospyros salicifolia</i> Humb. & Bonpl. Ex Willd.   | 1.27 | 1.98 | 0.19 | 3.43 |
| Ebenaceae       | <i>Diospyros yatesiana</i> Standl.                      | 0.69 | 1.58 | 1.15 | 3.43 |
| Fabaceae        | <i>Platymiscium yucatanum</i> Standl.                   | 0.92 | 1.19 | 1.21 | 3.32 |
| Fabaceae        | <i>Piscidia piscipula</i> (L.) Sarg.                    | 0.46 | 1.19 | 1.53 | 3.18 |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum rotundifolium</i> Lunan                 | 1.04 | 1.98 | 0.10 | 3.11 |
| Euphorbiaceae   | <i>Cnidocolus aconitifolius</i> (Mill.) I.M. Johnst.    | 1.85 | 0.79 | 0.05 | 2.69 |
| Fabaceae        | <i>Vachellia</i> sp.                                    | 1.04 | 1.19 | 0.35 | 2.57 |
| Malpighiaceae   | <i>Bunchosia</i> sp.                                    | 0.81 | 1.19 | 0.50 | 2.50 |
| Anacardiaceae   | <i>Metopium brownei</i> (Jacq.) Urb.                    | 0.46 | 1.58 | 0.34 | 2.38 |
| Fabaceae        | <i>Senegalia gaumeri</i> (S.F. Blake) Britton & Rose    | 0.58 | 1.58 | 0.20 | 2.36 |
| Annonaceae      | <i>Sapranthus campechianus</i> (Kunth) Standl.          | 0.81 | 1.19 | 0.16 | 2.16 |
| Rubiaceae       | <i>Asemnantha pubescens</i> Hook. f.                    | 0.92 | 0.40 | 0.57 | 1.89 |
| Rubiaceae       | <i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.                      | 0.35 | 1.19 | 0.33 | 1.86 |
| Ebenaceae       | <i>Diospyros anisandra</i> S.F. Blake                   | 0.92 | 0.79 | 0.05 | 1.77 |
| Primulaceae     | <i>Ardisia escallonioides</i> Schltdl. & Cham.          | 0.69 | 0.79 | 0.20 | 1.69 |
| Simaroubaceae   | <i>Simarouba amara</i> Aubl.                            | 0.23 | 0.40 | 0.69 | 1.32 |
| Sapindaceae     | <i>Talisia oliviformis</i> (Kunth) Radlk.               | 0.46 | 0.79 | 0.05 | 1.31 |
| Capparaceae     | <i>Quadrella incana</i> (Kunth) H.H. Iltis & X. Cornejo | 0.23 | 0.79 | 0.12 | 1.14 |
| Malvaceae       | <i>Ceiba</i> sp.                                        | 0.12 | 0.40 | 0.55 | 1.06 |
| Rubiaceae       | <i>Psychotria</i> sp.                                   | 0.23 | 0.79 | 0.01 | 1.03 |
| Celastraceae    | <i>Crossopetalum gaumeri</i> (Loes.) Lundell            | 0.23 | 0.79 | 0.01 | 1.03 |
| Fabaceae        | <i>Caesalpinia</i> sp.                                  | 0.12 | 0.40 | 0.34 | 0.85 |

|               |                                               |      |      |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Fabaceae      | <i>Mimosa bahamensis</i> Benth.               | 0.23 | 0.40 | 0.16 | 0.78 |
| Fabaceae      | <i>Leucaena leucocephala</i><br>(Lam.) De Wit | 0.12 | 0.40 | 0.26 | 0.77 |
| Sapotaceae    | <i>Chrysophyllum mexicanum</i><br>Brandege    | 0.23 | 0.40 | 0.10 | 0.72 |
| Picramniaceae | <i>Alvaradoa amorphoides</i><br>Liebm.        | 0.12 | 0.40 | 0.18 | 0.69 |

|               |                                                      |      |      |      |      |
|---------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Fabaceae      | <i>Bauhinia divaricata</i> L.                        | 0.23 | 0.40 | 0.02 | 0.65 |
| Euphorbiaceae | <i>Jatropha gaumeri</i> Greenm.                      | 0.12 | 0.40 | 0.03 | 0.54 |
| Celastraceae  | <i>Elaeodendron xylocarpum</i><br>(Vent.) DC.        | 0.12 | 0.40 | 0.02 | 0.53 |
| Apocynaceae   | <i>Cascabela gaumeri</i> (Hemsl.)<br>Lippold         | 0.12 | 0.40 | 0.00 | 0.51 |
| Fabaceae      | <i>Vachellia cornigera</i> (L.)<br>Seigler & Ebinger | 0.12 | 0.40 | 0.00 | 0.51 |
| Rhamnaceae    | <i>Krugiodendron ferreum</i><br>(Vahl) Urb.          | 0.12 | 0.40 | 0.00 | 0.51 |
| Moraceae      | <i>Brosimum alicastrum</i> Sw.                       | 0.12 | 0.40 | 0.00 | 0.51 |
|               |                                                      | 100  | 100  | 100  | 300  |