





## PÁG.

## CONTENIDO

- 1 Clave para identificar las especies del género *Bursera* Jacq. ex L. (Burseraceae) en el estado de Michoacán, México.  
*Key for the identification of species of the genus Bursera* Jacq. ex L. (Burseraceae) in the state of Michoacán, Mexico.  
 Rzedowski, J. | R. Medina-Lemos
- 11 Diversidad y estructura arbórea de un bosque templado bajo manejo en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, México.  
*Diversity and tree structure of a managed temperate forest in the municipality of Pueblo Nuevo, Durango, Mexico.*  
 Flores-Morales, E.A. | O.A. Aguirre-Calderón | E.J. Treviño-Garza | M.A. González- Tagle | E. Alanís-Rodríguez | G. Angeles-Pérez | F. Huizar-Amezcua.
- 27 Estructura, composición florística, biomasa aérea y contenido de carbono en la selva mediana perennifolia en Tizimín, Yucatán, México.  
*Structure, floristic composition, above-ground biomass and carbon content in tropical evergreen forest in Tizimin, Yucatan, Mexico.*  
 Martínez-Gauna, C.A. | J.I. Yerena-Yamallel | L.G. Cuéllar-Rodríguez | E. Alanís-Rodríguez | E. J. Ortega-Arroyo.
- 51 Comparación de valores estructurales de manglar en diferentes condiciones de degradación ecológica.  
*Comparison of mangrove structural values in different conditions of ecological degradation.*  
 Basáñez-Muñoz, A. de J. | A. Serrano | L. Cuervo-López | C. Naval-Avila | A. Capistran-Barradas | A.G. Jordán-Garza.
- 71 Evaluación de una restauración mediante dron en el matorral espinoso tamaulipeco.  
*Evaluation of a restoration through drone in the tamaulipeco thornscrub.*  
 Gutiérrez-Bárrientos, M. | J.D. Marín-Solís | E. Alanís-Rodríguez | E. Buendía-Rodríguez.
- 87 Efecto de la cobertura y condiciones edáficas en la presencia de *Amoreuxia wrightii* A. Gray, en el noreste de México.  
*Effect of coverage and edaphic conditions on the presence of Amoreuxia wrightii A. Gray, in northeastern Mexico.*  
 Patiño-Flores, A.M. | E. Alanís-Rodríguez | V.M. Molina-Guerra | M.I. Yáñez-Díaz | A. Mora-Olivio | E. Jurado | H. González-Rodríguez
- 101 Componentes del rendimiento de *Crotalaria longirostrata* Hook. & Arn. en Guerrero, México.  
*Yield components of Crotalaria longirostrata Hook. & Arn. in Guerrero, Mexico.*  
 Salinas-Morales, J.L. | C.B. Peña-Valdivia | C. Trejo | M. Vázquez-Sánchez | C. López-Palacios | D. Padilla-Chacón.
- 123 Germinación y multiplicación de plantas *in vitro* de *Heimia salicifolia* (Lythraceae).  
*Germination and micropropagation in vitro of Heimia salicifolia (Lythraceae).*  
 Ordóñez-Posadas, F. | M. de L. Martínez-Cárdenas | J.L. Rodríguez de la O.
- 139 Micropagación de *Agave maximiliana* Baker por proliferación de yemas axilares.  
*Micropagation of Agave maximiliana Baker by axillary shoot proliferation.*  
 Santa Cruz-Ruvalcaba, F. | J.J. Castañeda-Nava | J.P. Villanueva-González | M.L. García-Sahagún | L. Portillo | M.L. Contreras-Pacheco.
- 153 Origen botánico y caracterización fisicoquímica de la miel de meliponinos (Apidae: Meliponini) de Teocelo, Veracruz, México.  
*Botanical origin and physicochemical characterization of meliponini honey (Apidae: Meliponini) from Teocelo, Veracruz, Mexico.*  
 Ortiz-Reyes, L.Y. | D.L. Quiroz- García | M.L. Arreguin-Sánchez | R. Fernández-Nava.
- 171 Comparación anatómica de la lámina foliar de cinco especies leñosas nativas del noreste de México durante la época húmeda y seca.  
*Leaf blade anatomical comparison of five native woody species of northeastern Mexico during the wet and dry season.*  
 Filio-Hernández, E. | H. González-Rodríguez | I. Cantú-Silva | T.G. Domínguez-Gómez | J.G. Marmolejo-Monsivais | M.V. Gómez-Méza.
- 185 Estudio anatómico e histoquímico de los órganos vegetativos de *Piper aduncum* L. (Piperaceae).  
*Anatomical and histochemical study of the vegetative organs of Piper aduncum L. (Piperaceae).*  
 Arroyo, J. | P. Bonilla | M. Marín | G. Tomás | J. Huamán | G. Ronceros | E. Raez | L. Moreno | W. Hamilton.
- 203 Evaluación del efecto hipoglucemante de *Tectaria heracleifolia* (Willd.) Underw. en ratones con diabetes inducida tipo 2.  
*Evaluation of the hypoglycemic effect of Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw. in mice with induced type 2 diabetes.*  
 Luna-Rodríguez, A.K. | M.A. Zenil-Zenil | S. Cristians | A.M. Osuna-Fernández | H.R. Osuna-Fernández.
- 219 Árboles nativos de Sinaloa del sistema agroforestal huerto familiar.  
*Native trees of Sinaloa at the homegarden agroforestry system.*  
 Avendaño-Gómez, A. | B. Salomón-Montijo | G. Márquez-Salazar.
- 241 Atributos tangibles e intangibles y diferenciación sensorial de la vainilla mexicana.  
*Tangible and intangible attributes and sensory differentiation of mexican vanilla.*  
 Barrera-Rodríguez, A.I. | A. Espel | M.G. Pérez | A.G. Ramírez-García.
- 257 Percepción local de los usos y situación ambiental y económica del toronjil (Lamiaceae) en tres comunidades del estado de Guerrero, México.  
*Local perception of the situation, environmental and economic uses of toronjil (Lamiaceae) in three communities of the state of Guerrero, Mexico.*  
 Hernández-Ramírez, U. | M. Trujillo-Nájera | T. Romero-Rosales | A. Huicochea-Moctezuma | T. de J. Adame-Zambrano | M. A. Gruinalt-Santos.
- 271 Importancia relativa de las especies medicinales ofertadas en el mercado de Tepeaca, Puebla, México.  
*Relative importance of medicinal species offered in the Tepeaca market, Puebla, Mexico.*  
 Reyes-Matamoros, J. | D. Martínez-Moreno | J.G. Fuentes-López | F. Basurto-Peña.

# POLIBOTÁNICA

Núm. 55

ISSN electrónico: 2395-9525

Enero 2023

## Portada

*Bidens pilosa* L. Asteraceae. “Acahual”. Aquenios de 5 a 18 mm de largo, los interiores lineares y más largos, los exteriores más o menos comprimidos dorso-ventralmente y más cortos, negruzcos a cafés, vilano con 3-2 aristas amarillas, de 1 a 3 mm de largo. Planta con múltiples propiedades terapéuticas, considerada en medicina popular como diurética y febrífuga, estomacal y antiulcerosa, para curar catarros con fiebre, faringitis y amigdalitis.

*Bidens pilosa* L. Asteraceae. “Acahual”. *Achenes 5 to 18 mm long, inner ones linear and longer; outer ones more or less dorso-ventrally compressed and shorter; blackish to brownish, pappus with 3-2 yellow awns, 1 to 3 mm long. Plant with multiple therapeutic properties, considered in folk medicine as diuretic and febrifuge, stomachic and anti-ulcerous, to cure colds with fever, pharyngitis, and tonsillitis.*

por/by **Rafael Fernández Nava**





## INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Director General: *Dr. Arturo Reyes Sandoval*

Secretario General: *Ing. Arq. Carlos Ruiz Cárdenas*

Secretario Académico: *Mtro. Mauricio Igor Jasso Zaranda*

Secretario de Innovación e Integración Social: *M. en C. Ricardo Monterrubio López*

Secretario de Investigación y Posgrado: *Dra. Laura Arreola Mendoza*

Secretario de Servicios Educativos: *Dra. Ana Lilia Coria Páez*

Secretario de Administración: *M. en C. Javier Tapia Santoyo*

Director de Educación Superior: *Dra. María Guadalupe Ramírez Sotelo*

## ESCUOLA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

Maestra Decana en Funciones de Dirección:

*M. en C. Yadira Fonseca Sabater*

Subdirectora Académica:

*M. en C. Martha Patricia Cervantes Cervantes*

Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación:

*Dr. Gerardo Aparicio Ozores*

Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social:

*Biól. Gonzalo Galindo Becerril*

---

**POLIBOTÁNICA**, Año 28, No. 55, enero-junio 2023, es una publicación semestral editada por el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Unidad Profesional Lázaro Cárdenas, Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, Col. Santo Tomás C.P. 11340 Delegación Miguel Hidalgo México, D.F. Teléfono 57296000 ext. 62331. <http://www.herbario.encb.ipn.mx/>. Editor responsable: Rafael Fernández Nava. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título No. 04-2015-011309001300-203. ISSN impreso: 1405-2768, ISSN digital: 2395-9525, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Unidad de informática de la ENCB del IPN, Rafael Fernández Nava, Unidad Profesional Lázaro Cárdenas, Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, Col. Santo Tomás CP 11340 Delegación Miguel Hidalgo México, D.F.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Politécnico Nacional.

**REVISTA BOTÁNICA INTERNACIONAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

**EDITOR EN JEFE**  
*Rafael Fernández Nava*

**EDITORA ASOCIADA**  
*María de la Luz Arreguin Sánchez*

**COMITÉ EDITORIAL INTERNACIONAL**

*Christiane Anderson* *Edith V. Gómez Sosa*  
University of Michigan  
Instituto de Botánica Darwinion  
Ann Arbor, Michigan, US  
Buenos Aires, Argentina

*Heike Vibrans* *Jorge Llorente Bousquets*  
Colegio de Postgraduados  
Universidad Nacional Autónoma de México  
Estado de México, México  
Ciudad de México, México

*Graciela Calderón de Rzedowski* *Delia Fernández González*  
Instituto de Ecología del Bajío  
Universidad de León  
Pátzcuaro, Mich., México  
León, España

*Theodore S. Cochrane* *Jerzy Rzedowski Rotter*  
University of Wisconsin  
Instituto de Ecología del Bajío  
Madison, Wisconsin, US  
Pátzcuaro, Mich., México

*Hugo Cota Sánchez* *Luis Gerardo Zepeda Vallejo*  
University of Saskatchewan  
Instituto Politécnico Nacional  
Saskatoon, Saskatchewan, Canada  
Ciudad de México, México

*Fernando Chiang Cabrera* *Claude Sastré*  
Universidad Nacional Autónoma de México  
Muséum National d'Histoire Naturelle  
Ciudad de México, México  
París, Francia

*Thomas F. Daniel* *Mauricio Velayos Rodríguez*  
California Academy of Sciences  
Real Jardín Botánico  
San Francisco, California, US  
Madrid, España

*Francisco de Asis Dos Santos* *Noemí Waksman de Torres*  
Universidad Estadual de Feira de Santana  
Universidad Autónoma de Nuevo León  
Feira de Santana, Brasil  
Monterrey, NL, México

*Carlos Fabián Vargas Mendoza* *Julieta Carranza Velázquez*  
Instituto Politécnico Nacional  
Universidad de Costa Rica  
Ciudad de México, México  
San Pedro, Costa Rica

*José Luis Godínez Ortega* *Tom Wendt*  
Universidad Nacional Autónoma de México  
University of Texas  
Ciudad de México, México  
Austin, Texas, US

*José Manuel Rico Ordaz*  
Universidad de Oviedo  
Universidad de Oviedo  
Oviedo, España

**DISEÑO Y FORMACIÓN ELECTRÓNICA**  
*Luz Elena Tejeda Hernández*

**OPEN JOURNAL SYSTEM Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**  
*Pedro Aráoz Palomino*

Toda correspondencia relacionada con la revista deberá ser dirigida a:

**Dr. Rafael Fernández Nava**  
Editor en Jefe de

# POLIBOTÁNICA

Departamento de Botánica  
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional  
Apdo. Postal 17-564, CP 11410, Ciudad de México

Correo electrónico:  
*polibotanica@gmail.com*  
*rfernand@ipn.mx*

Dirección Web  
*http://www.polibotanica.mx*

POLIBOTÁNICA es una revista indexada en:

CONACYT, índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica  
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

SciELO - Scientific Electronic Library Online.

Google Académico - Google Scholar.

DOAJ, Directorio de Revistas de Acceso Público.

Dialnet portal de difusión de la producción científica hispana.

REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.

LATINDEX, Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

PERIODICA, Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias.



**Polibotánica**

ISSN electrónico: 2395-9525

polibotanica@gmail.com

Instituto Politécnico Nacional

México

<http://www.polibotanica.mx>

# *Salvia divinorum* (LAMIACEAE) UN NUEVO REGISTRO PARA VERACRUZ, MÉXICO

# *Salvia divinorum* (LAMIACEAE) A NEW RECORD FOR VERACRUZ, MEXICO

**Castillo-Campos, G.; J.G. García-Franco; M. Luisa Martínez y I. Fragoso-Martínez**  
*Salvia divinorum* (LAMIACEAE) UN NUEVO REGISTRO PARA VERACRUZ, MÉXICO  
*Salvia divinorum* (LAMIACEAE) A NEW RECORD FOR VERACRUZ, MEXICO



*Salvia divinorum* (Lamiaceae) un nuevo registro para Veracruz, México*Salvia divinorum* (Lamiaceae) a new record for Veracruz, Mexico

Castillo-Campos, G.;  
**J.G. García-Franco;**  
**M. Luisa Martínez**  
**y I. Fragoso-Martínez**

*Salvia divinorum*  
 (LAMIACEAE) UN NUEVO  
 REGISTRO PARA  
 VERACRUZ, MÉXICO

*Salvia divinorum*  
 (LAMIACEAE) A NEW  
 RECORD FOR VERACRUZ,  
 MEXICO

POLIBOTÁNICA

Instituto Politécnico Nacional

Núm. 55: 15-23. Enero 2023

DOI:  
 10.18387/polibotanica.55.2

**G. Castillo-Campos**

*Instituto de Ecología, A.C., Red de Biodiversidad y Sistemática,  
 Carretera Antigua a Coatepec 351, El Haya, 91073, Xalapa, Veracruz, México.*

**J.G. García-Franco**

**M. L. Martínez** / [marisa.martinez@inecol.mx](mailto:marisa.martinez@inecol.mx)

*Instituto de Ecología, A.C, Red de Ecología Funcional,  
 Carretera Antigua a Coatepec 351, El Haya, 91073, Xalapa, Veracruz, México.*

**I. Fragoso-Martínez** / [itzi.fragoso@inecol.mx](mailto:itzi.fragoso@inecol.mx)

*Instituto de Ecología, A.C, Secretaría Académica (Flora de Veracruz),  
 Carretera Antigua a Coatepec 351, El Haya, 91073, Xalapa, Veracruz, México.*

**RESUMEN:** En este estudio se describe e ilustra a *Salvia divinorum* como un nuevo registro para la flora del estado de Veracruz. Durante el trabajo dirigido a realizar el inventario de la flora de los márgenes de los ríos que se originan en las faldas orientales del volcán Cofre de Perote, en la región central del estado de Veracruz, se registraron ejemplares del género *Salvia* (Lamiaceae), diferentes a las especies ya conocidas para Veracruz. Al identificar los ejemplares colectados se llegó a la conclusión de que pertenecen a *Salvia divinorum*, una especie previamente conocida como endémica a Oaxaca, donde tiene importancia ceremonial para los mazatecos. La especie está representada por una población, en el sotobosque del bosque mesófilo de montaña, en el margen del río, a una altitud de 1500 m s.n.m., asociada con *Carpinus caroliniana*, *Clethra mexicana*, *Liquidambar styraciflua*, *Meliosma alba* y *Quercus germana*. La población se encuentra aparentemente saludable, y no presenta indicios de uso o manejo; sin embargo, es necesario hacer más investigación a lo largo del río para determinar si existen más localidades donde se encuentre la especie.

**Palabras clave:** *Calosphace*, Flora de Veracruz, Lamiaceae, nuevo registro, Veracruz.

**ABSTRACT:** In this study, *Salvia divinorum* is described and illustrated as a new record for the state of Veracruz. During the work aimed at carrying out the inventory of the flora from the margins of the rivers that originate in the eastern hillsides of the Cofre de Perote, in the central region of the state of Veracruz, specimens of *Salvia* (Lamiaceae) that were different from the known species of the state, were registered. When these collected specimens were identified, it was concluded that they belonged to *Salvia divinorum*, a species previously known as endemic to Oaxaca, where it has ceremonial importance for the Mazatec. The species is represented by a population in the understory of the cloud forest, along the river margins, at 1500 m of elevation, associated with *Carpinus caroliniana*, *Clethra mexicana*, *Liquidambar styraciflua*, *Meliosma alba*, and *Quercus germana*. The population is apparently healthy, and it does not show signs of use or management. However, it is necessary to perform more research along the river margins to determine if there are more localities where this species can be found.

**Key words:** *Calosphace*, Flora of Veracruz, Lamiaceae, new record, Veracruz.

## INTRODUCCIÓN

Lamiaceae Martinov es la octava familia de angiospermas con mayor riqueza de especies en México (Villaseñor, 2016) con 598 especies pertenecientes a 33 géneros (Martínez-Gordillo *et al.*, 2017). Entre ellos, destaca el género *Salvia* L. como el más diverso de plantas mexicanas con flores, con 306 especies (Martínez-Gordillo *et al.*, 2017). Las salviás mexicanas pertenecen a tres clados distintos de *Salvia* s.l., los cuales corresponden a los subgéneros *Audibertia* Benth. y *Calosphace* (Benth.) Epling y, al grupo informal *Heterosphace* (Drew *et al.*, 2017; Kriebel *et al.*, 2019). *Calosphace*, endémico al continente americano, es el subgénero más diverso de *Salvia* con 580 especies (González-Gallegos *et al.*, 2020). De ellas, 295 se distribuyen en México, convirtiéndolo en el principal centro de diversidad del subgénero (González-Gallegos *et al.*, 2020; Jenks *et al.*, 2013). Las especies de *Calosphace* están divididas en 102 secciones (González-Gallegos *et al.*, 2020). Una de estas secciones es *Dusenostachys* Epling, la cual incluye diez especies, ocho de ellas mexicanas. Estos taxones comparten la presencia de pecíolos alargados, cálices con el labio superior 3-9-nervado, corolas con tubos ventricosos, carentes de papillas en su interior y estambres inclusos en la corola, con conectivos enteros o con dientes retrorsos (Epling, 1939; Reisfield, 1987).

Las especies del subgénero *Calosphace* son ricas en terpenoides y al menos 56 de ellas son empleadas en la medicina tradicional mexicana para tratar enfermedades del sistema digestivo (e.g., *S. adenophora* Fernald, *S. amarissima* Ortega, *S. ballotiflora* Benth, etc.), fiebre (e.g., *S. chamaedroydes* Cav., *S. lavanduloides* Kunth, *S. microphylla* Kunth, etc.), durante el parto (*S. cacaliifolia* Benth., *S. candicans* M. Martens and Galeotti, *S. cinnabarina* M. Martens and Galeotti, etc.), y enfermedades culturales como “el aire”, “mal de ojo” y “espanto” (e.g., *S. elegans* Vahl, *S. amarissima* Ortega, *S. mexicana* L., respectivamente), entre otras (Ortiz-Mendoza *et al.*, 2022).

*Salvia divinorum* Epling & Játiva, endémica a Oaxaca, se emplea para tratar enfermedades del aparato digestivo, dolores de cabeza, disminuir las molestias del reumatismo y enfermedades culturales. No obstante, esta especie es mejor conocida por su uso en rituales de adivinación mazatecos dadas sus propiedades psicotrópicas (Valdés *et al.*, 1983; Wasson, 1962).

Veracruz es el tercer estado con mayor diversidad de plantas vasculares en México, albergando ca. 8,497 especies, 29% de ellas endémicas (Villaseñor, 2016). A nivel de familia, el estado ocupa el primer lugar en riqueza, con representantes de 271 familias de plantas vasculares, equivalente al 91.2% de las familias registradas para México (Villaseñor, 2016). Con respecto a *Salvia*, el estado ocupa el quinto lugar en riqueza, con 52 especies registradas (Martínez-Gordillo *et al.*, 2017), una de ellas—*Salvia gomezpompae* J. G. González & Bedolla—recientemente descrita (González-Gallegos *et al.*, 2021). Durante el inventario de las especies que crecen en los márgenes de los ríos originados en las faldas orientales del Cofre de Perote, se recolectaron especímenes del género *Salvia* con características distintas a las especies conocidas para el estado, pero similares a la especie registrada como endémica de Oaxaca, *Salvia divinorum*. Por ello, el objetivo de este trabajo es presentar a dicho taxón como un nuevo registro para Veracruz.

## MATERIALES Y MÉTODOS

El municipio de Tlanelhuayocan, Veracruz se encuentra en las faldas del Cofre de Perote, en la Sierra Madre Oriental. El clima característico de esta zona es de tipo C(fm)w”b(i)g (García, 2004), templado húmedo, con lluvias todo el año, con una temperatura media anual de 18 °C y una precipitación promedio anual de 1490.5 mm. Las lluvias más abundantes se concentran entre los meses de junio a septiembre, disminuyendo un poco en el mes de agosto, que es cuando se presenta la canícula, sequía de medio verano o intraestival (Soto & García, 1989; Zamora & Castillo-Campos, 1997). Al conducir trabajo de campo orientado a muestrear la

vegetación ribereña de esta región, se recolectaron ejemplares del género *Salvia* con estructuras reproductivas. Al observar el material fotográfico y herborizado se detectaron características morfológicas distintas a las especies de *Salvia* que han sido colectadas en la zona de estudio. Para identificar el material colectado se empleó la clave taxonómica para secciones de Epling, (1939), la cual corresponde a la revisión más completa que existe hasta el momento para el subgénero *Calosphace*. Con base en esta clave se determinó que el ejemplar pertenece a la sección *Dusenostachys*; sin embargo, al usar la clave para las especies de la sección, incluida en el mismo trabajo, no se logró identificar el taxón. Por lo anterior, se empleó la clave para *Salvia* de la Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán (Martínez-Gordillo *et al.*, 2019), con la cual se determinó al ejemplar como *Salvia divinorum*. Para verificar la identificación, se revisó el protólogo de dicha especie (Epling & Játiva, 1962: 75-76) y los ejemplares tipo en Jstor Global Plants (<https://plants.jstor.org/>).

Para efectuar comparaciones con otras especies de *Salvia* sección *Dusenostachys* registradas para Veracruz se utilizó el listado de Martínez-Gordillo *et al.* (2017) y, se revisaron los ejemplares de la sección colectados en Veracruz y depositados en los herbarios MEXU y XAL (Thiers, 2016). Finalmente, con el material colectado se realizó una descripción de la especie (*Salvia divinorum*), que no había sido colectada para Veracruz.

## RESULTADOS


### Taxonomía

***Salvia divinorum*** Epling & Játiva, Botanical Museum Leaflets 20: 75-76. 1962 (Fig. 1).

Tipo: México: Oaxaca, San José Tenango, A. Hoffmann & R. G. Watson s.n. (holotipo: LA 00000121!; isotipos: ECON 00031077!, ECON 00038343!, LA 00000120!, LA in UC 1948164!).

**Nombres comunes.** Hierba de la pastora, ska pastora, ska María pastora (Oaxaca).

**Hierba** perenne de 0.5-1.5 m de alto, con **tallos** fistulosos, cuadrangulares, hírtulos, verdes, translúcidos; **hojas** opuestas, elípticas a ovadas, ápice acuminado o caudado, base decurrente, de 10-25(30) cm de largo, 5-10 cm de ancho, adaxialmente y abaxialmente glabras, margen irregularmente cerrado o crenado; **pecíolos** 2-3.5 cm de largo; **inflorescencia** racemiforme, erecta, de 30-40 cm de largo, con 8-12 verticilastros, 3-6(12) flores por verticilastro, entrenudos de 2-4 cm, raquis violeta, pubérulo a glabrado; **brácteas florales** ovadas, sésiles, basalmente redondeadas, ápice acuminado-caudado, de 1-2(3) cm de largo, de 0.6-1 cm de ancho, tardíamente deciduas, generalmente violeta, glabras; **pedicelos** hirsutos, violetas, de 4-9 mm de largo; **cálix** 10-12 mm de largo, 5.5-6 mm de ancho, violeta, glabro a glandularmente puberulento, labios desiguales, labio superior de 5-6 mm de largo, 3-nervado, labio inferior de 4.5-6.5 mm de largo; **corola** blanca, de 28-32 mm de largo, sigmoidal, ventricosa, densamente vilosa, con pelos translúcidos multicelulares, tubo de 19-22 mm de largo, 5.5-7 mm de ancho cerca de la garganta, superficie interna carente de papilas, glabra, labio superior 6-8 mm de largo, labio inferior 4.5-7.5 mm de largo; **estambres** insertos, glabros, blancos, ligeramente arqueados, filamentos 2-5 mm de largo, conectivo de 15-16 mm de largo, entero, anteras de 2 mm de largo; **estilo** de 27-32 mm de largo, blanco, barbado cerca del ápice, ramas estigmáticas exsertas, rama superior más larga que la inferior; **mericarpos** pardos, ovoides, ca. 2 mm de largo, glabros (Fig. 1).




**Fig 1.** Inflorescencia (A) y población (B) de *Salvia divinorum* en su hábitat en Veracruz. Fotos tomadas por Gonzalo Castillo Campos.

**Material estudiado:** MÉXICO. OAXACA: Mpio. Huautla de Jiménez, Huautla de Jiménez, *A. Gómez-Pompa* s.n. (MEXU!), 500-e (MEXU!), *R. Hernández* 23A (MEXU!), *R. Hernández & Ishikawa* 3231 (MEXU!), *A. Ortega* 45 (MEXU!); 1 km SW of market, *S.A. Reisfield & S. Solheim* 1090 (MEXU!). Mpio. San Bartolomé Ayautla, San Bartolomé Ayautla, *J. Díaz & Álvarez* 12 (MEXU!); Cerro Rabón (a mtn. Ridge near Ayautla), *S.A. Reisfield* 1117 (MEXU!). Mpio. San José Tenango, Agua Golondrina, *P. Giovanni* 261b (MEXU!). Mpio. San Pedro Ixcatlán, Cerro Camaron, 1 km E of the Village of Cerro Quemado, *S.A. Reisfield & S. Solheim* 1106 (MEXU!); *S.A. Reisfield* 1242 (MEXU!). Mpio. Santa María Chilchotla, Cuauhtémoc, ca. 4 km NE of Santa María Chilchotla, near Clemencia and Santa Rosa, *S.A. Reisfield & S. Solheim* 1093 (MEXU!); Cerro Quemado, *S.A. Reisfield* 1116 (MEXU!). VERACRUZ: Mpio. Tlanelhuayocan, faldas orientales del Cofre de Perote 1500 m de altitud, 10 de noviembre 2021, *G. Castillo-Campos y J. G. García-Franco* 30068 (MEXU!, XAL!).

**Hábitat:** *Salvia divinorum* es una especie herbácea que se le encuentra en el sotobosque del bosque mesófilo de montaña, en los márgenes de los ríos, en una altitud de 1500 m. Los individuos adultos de este taxón alcanzan hasta 1.5 m de alto, formando poblaciones casi monoespecíficas en la orilla del río que atraviesa los fragmentos del bosque mesófilo de montaña (Fig. 2). Co-habita con especies del estrato arbóreo como *Carpinus caroliniana* Walter (Betulaceae), *Clethra mexicana* DC. (Clethraceae), *Liquidambar styraciflua* L. (Altingiaceae), *Meliosma alba* (Schltdl.) Walp. (Sabiaceae), *Quercus germana* Schltdl. & Cham. y *Quercus grandis* Liebm. (Fagaceae), *Saurauia leucocarpa* Schltdl. (Actinidiaceae); con arbustos de *Eugenia capuli* (Schltdl. & Cham.) Hook. & Arn. (Myrtaceae), *Hoffmannia excelsa* (Kunth) K. Schum., *Psychotria galeottiana* (Martens) C. M. Taylor & Lorence, *Randia aculeata* L. (Rubiaceae), *Xylosma flexuosa* (Kunth) Hemsl. (Salicaceae), y hierbas de *Desmodium scorpiurus* (Sw.) Poir. in F. Cuvier (Fabaceae), *Hildaea tenuis* (J. Presl) C. Silva & R.P. Oliveira y *Panicum nemorosum* Sw. (Poaceae), *Parablechnum schiedeanum* (C. Presl) Gasper & Salino (Blechnaceae) y *Selaginella stellata* Spring (Selaginellaceae).

**Fenología:** *Salvia divinorum* no tiene un periodo de floración determinado, pues a diferencia de otras especies de *Salvia* que florecen cada año, pueden pasar años entre los períodos de floración de *S. divinorum*, que son de octubre a noviembre (Reisfield, 1987). Este es el caso de la población encontrada en el área de estudio, en donde floreció una sola vez durante cuatro años de monitoreo.

**Usos:** especie empleada en rituales de adivinación mazatecas por sus propiedades psicotrópicas (Epling & Játiva, 1962; Jenks *et al.*, 2011; Valdés *et al.*, 1983; Wasson, 1962). Adicionalmente, es de importancia en la medicina tradicional para tratar malestares gastrointestinales, enfermedades infecciosas (Calzada & Bautista, 2020), fiebre, dolor (Romero, 2018) y enfermedades culturales (Valdés *et al.*, 1983). A partir de extractos de esta especie se ha aislado y caracterizado la Salvinorina A (Siebert, 1994). Este neoclerodano ha sido ampliamente estudiado farmacológicamente (Ortiz-Mendoza *et al.*, 2022) y se han detectado que tiene actividad antidepresiva (Calzada *et al.*, 2015), ansiolítica (Herrera-Ruiz *et al.*, 2006), antinociceptiva y antiinflamatoria (Tlacomulco-Flores *et al.*, 2020).



**Fig. 2:** Mapa de distribución de *Salvia divinorum* Epling & Játiva, en Oaxaca y en la nueva localidad de Veracruz.

## DISCUSIÓN

En Veracruz el género *Salvia* estaba representado por 52 especies (González-Gallegos *et al.*, 2021; Martínez-Gordillo *et al.*, 2017); sin embargo, con el nuevo registro de *S. divinorum* se incrementa a 53 taxones para el estado, y su distribución deja de estar restringida al estado de Oaxaca (Jenks *et al.*, 2011; Martínez-Gordillo *et al.*, 2017; Reisfield, 1987). *Salvia divinorum* es una especie muy rara en el medio natural del centro de Veracruz. De acuerdo con la información local, su naturalización se debe a que se escapó de un cultivo de una propiedad rural localizada en el mismo río donde se encontró. Por sus propiedades en la medicina tradicional fue introducida; sin embargo, no se observaron evidencias de uso (v.gr., ramas y hojas cortadas). Por el contrario, la población es pequeña, pero se encuentra en buen estado y con algunas ramas floreciendo.

*Salvia divinorum* es una especie que se reproduce principalmente de manera vegetativa pues se fragmenta fácilmente y los nudos de las ramas generan raíces cuando entran en contacto con el suelo húmedo (Reisfield, 1993). Por otro lado, la reproducción sexual de la especie es poco exitosa, pues estudios realizados en invernaderos por Reisfield (1993), demostraron que la viabilidad de los granos de polen es baja (53-56%) y, solamente 2.5-3% de las polinizaciones manuales resultan en frutos fértiles, lo que sugiere que su éxito reproductivo natural debe de ser igualmente bajo. Tomando en cuenta lo anterior, las poblaciones de *S. divinorum* en Veracruz podrían aumentar en el futuro, si durante la temporada de lluvias el río llega a arrastrar fragmentos de las ramas o los pocos frutos que se desarrolle, ya que, en ese periodo, éste incrementa mucho su cauce por ser un río de respuesta rápida.

Las especies de *Salvia* sección *Dusenostachys* presentan en su mayoría flores con corolas azules, exceptuando a *Salvia madrensis* Seem. y *S. divinorum*, que tienen corolas amarillas y blancas, respectivamente (Epling, 1939; Reisfield, 1993). Sin embargo, el color de las corolas de *S. divinorum* fue objeto de confusión a tal grado que originalmente fueron descritas como azules en el protólogo (Epling & Játiva, 1962: 75-76). Esto fue resultado de varios factores: la confusión de los cálices con corolas por los colectores del tipo—Hoffman & Wasson—, la falta de material con flores en antesis para el especialista y el color café que toman las corolas blancas con el secado, similar a las corolas azules (Reisfield, 1993). Fue hasta 1993 que Reisfield, tras observaciones y colectas en campo, publicó una descripción ampliada y corregida de *Salvia divinorum*, dónde se aclaró dicha confusión. En ella, se describen por primera vez las flores de la especie, formadas por cálices violeta con corolas blancas. En Veracruz, además de *Salvia divinorum*, habitan otras tres especies de *Salvia* sección *Dusenostachys*. Estos taxones presentan corolas azules o violeta, por lo que *S. divinorum* se distingue de ellas principalmente por sus corolas blancas. Sin embargo, los labios de las corolas de *S. divinorum* pueden tornarse violeta con la edad (Reisfield, 1987, 1993), por lo que podrían ser objeto de confusión. Por ello a continuación, se presenta una clave de identificación para las especies de *Salvia* subgénero *Calosphace* sección *Dusenostachys* distribuidas en Veracruz:

1. Base de la lámina atenuada a largamente decurrente; corolas blancas, en ocasiones los labios con tintes violeta, exterior del tubo densamente pubescente..... *Salvia divinorum*
1. Base de la lámina truncada, redondeada o cordada; corolas azules o violeta, exterior del tubo esparcidamente viloso:
  2. Cáliz 9-12 mm de largo; tubo de la corola 20-25 mm de largo, labio inferior 14-18 mm de largo..... *Salvia recurva*
  2. Cáliz 5-7 mm de largo; tubo de la corola 10-16 mm de largo, labio inferior 5.5-10.5 mm de largo.
    3. Envés viloso en las venas; raquis de la inflorescencia densamente viloso; 6-10 flores por verticilastro; labio superior de la corola 6-8 mm de largo..... *Salvia biserrata*
    3. Envés glabro o glabrado; raquis de la inflorescencia puberulo; 3-4 flores por verticilastro; labio superior de la corola 10-12 mm de largo..... *Salvia flaccidifolia*

## CONCLUSIONES

*Salvia divinorum* se reporta por primera vez en el estado de Veracruz. La especie parece haber escapado de cultivo y ahora se encuentra naturalizada formando una población al margen de un río en el bosque mesófilo de montaña. El número de poblaciones podría crecer en el futuro, si fragmentos de las plantas o algunos frutos son transportados por el cauce del río. La especie destaca dentro del resto de los taxones relacionados, pertenecientes a *Salvia* subgénero *Calosphace* sección *Dusenostachys* por el color de sus corolas (blancas vs. azules).

## AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Dra. Viridiana Vega Badillo por la elaboración del mapa, y a María Teresa Jiménez Segura por la edición y formato de las figuras. Finalmente, agradecemos los valiosos comentarios de los revisores anónimos, los cuales enriquecieron el trabajo aquí presentado.

## LITERATURA CITADA

- Calzada, F., & Bautista, E. (2020). Plants used for the treatment of diarrhoea from Mexican flora with amoebicidal and giardicidal activity, and their phytochemical constituents. *Journal of Ethnopharmacology*, 253:112676. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.112676>
- Calzada, F., Bautista, E., Yépez-Mulia, L., García-Hernández, N., & Ortega, A. (2015). Antiamoebic and antigiardial activity of clerodane diterpenes from Mexican *Salvia* species used for the treatment of diarrhea. *Phytotherapy Research*, 29, 1600–1604. <https://doi.org/10.1002/ptr.5421>
- Drew, B. T., González-Gallegos, J. G., Xiang, C., Kriebel, R., Drummond, C. P., Walker, J. B., & Sytsma, K. J. (2017). *Salvia* united: The greatest good for the greatest number. *Taxon*, 66, 133–145. <https://doi.org/10.12705/661.7>
- Epling, C., & Játiva, C. (1962). A new species of *Salvia* from Mexico. *Botanical Museum Leaflets, Harvard University*, 20, 75–84. <https://doi.org/10.5860/choice.48-6651>
- Epling, Carl. (1939). A revision of *Salvia* subgenus *Calosphace*. *Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetalis*, 110, 380.
- García, E. (2004). *Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen* (5th ed.). Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. 90 pp.
- González-Gallegos, J. G., Bedolla-García, B. Y., Cornejo-Tenorio, G., Fernández-Alonso, J. L., Fragoso-Martínez, I., García-Peña, M. R., Harley, R. M., Klitgaard, B., Martínez-Gordillo, M. J., Wood, J. R. I., Zamudio, S., Zona, S., & Xifreda, C. C. (2020). Richness and distribution of *Salvia* subgenus *Calosphace* (Lamiaceae). *International Journal of Plant Sciences*, 181(8), 831–856. <https://doi.org/10.1086/709133>
- González-Gallegos, J. G., Bedolla-García, B. Y., & Uría, R. (2021). *Salvia gomezpompae* (Lamiaceae), a new species from Veracruz, Mexico. *Botanical Sciences*, 1(1), 976–990. <https://doi.org/10.17129/BOTSCI.2889>
- Herrera-Ruiz, M., García-Beltrán, Y., Mora, S., Díaz-Véliz, G., Viana, G. S., Tortoriello, J., & Ramírez, G. (2006). Antidepressant and anxiolytic effects of hydroalcoholic extract from *Salvia elegans*. *Journal of Ethnopharmacology*, 107, 53–58. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2006.02.003>
- Jenks, A.A., Walker, J. B., & Kim, S. C. (2011). Evolution and origins of the Mazatec hallucinogenic sage, *Salvia divinorum* (Lamiaceae): a molecular phylogenetic approach. *Journal of Plant Research*, 124, 593–600. <https://doi.org/10.1007/s10265-010-0394-6>

**Recibido:**  
25/mayo/2022

**Aceptado:**  
12/enero/2023

- Jenks, Aaron A., Walker, J. B., & Kim, S.-C. (2013). Phylogeny of New World *Salvia* subgenus *Calosphace* (Lamiaceae) based on cpDNA (psbA-trnH) and nrDNA (ITS) sequence data. *Journal of Plant Research*, 126(4), 483–496. <https://doi.org/10.1007/s10265-012-0543-1>
- Kriebel, R., Drew, B. T., Drummond, C. P., González-Gallegos, J. G., Celep, F., Mahdjoub, M. M., Rose, J. P., Xiang, C., Hu, G., Walker, J. B., Lemmon, E. M., Lemmon, A. R., & Sytsma, K. J. (2019). Tracking temporal shifts in area, biomes, and pollinators in the radiation of *Salvia* (sages) across continents: leveraging anchored hybrid enrichment and targeted sequence data. *American Journal of Botany*, 106(4), 1–25. <https://doi.org/10.1002/ajb2.1268>
- Martínez-Gordillo, M., Bedolla-García, B., Cornejo-Tenorio, G., Fragoso-Martínez, I., García-Peña, M. R., González-Gallegos, J. G., Lara-Cabrera, S. I., & Zamudio, S. (2017). Lamiaceae de México. *Botanical Sciences*, 95(4), 780–806. <https://doi.org/10.17129/botsci.1871>
- Martínez-Gordillo, M., Martínez-Ambriz, E., García-Peña, M., Cantu-Morón, E., & Fragoso-Martínez, I. (2019). Lamiaceae. In *Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán*, 156 (pp. 1–234). [http://www.ibiologia.unam.mx/barra/publicaciones/floras\\_tehuacan/fas31.pdf](http://www.ibiologia.unam.mx/barra/publicaciones/floras_tehuacan/fas31.pdf)
- Ortiz-Mendoza, N., Aguirre-Hernández, E., Fragoso-Martínez, I., González-Trujano, M. E., Basurto-Peña, F. A., & Martínez-Gordillo, M. J. (2022). A Review on the Ethnopharmacology and Phytochemistry of the Neotropical Sages (*Salvia* Subgenus *Calosphace*; Lamiaceae) Emphasizing Mexican Species. *Frontiers in Pharmacology* 13: 867892. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.867892>
- Reisfield, A. (1987). *Systematic studies in Salvia L. (Lamiaceae) with special emphasis on subgenus Calosphace (Benth.) Benth. section Dusenostachys Epl.* Tesis de Doctorado. University of Wisconsin Madison, Madison. 423 pp.
- Reisfield, A. (1993). The botany of *Salvia divinorum*. *Sida*, 15(3), 349–366. <https://doi.org/10.2307/1223953>
- Romero, T. (2018). *Estudio etnobotánico de las plantas medicinales de San José Vista Hermosa. Oaxaca, y evaluación farmacológica de Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br.* Tesis de Licenciatura. Universidad de la Sierra Juárez. Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México. 102 pp. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29882.13760>
- Siebert, D. J. (1994). *Salvia divinorum* and Salvinorin A: new pharmacologic findings. *Journal of Ethnopharmacology*, 43, 53–56. [https://doi.org/10.1016/0378-8741\(94\)90116-3](https://doi.org/10.1016/0378-8741(94)90116-3)
- Soto, E. M., & García, E. (1989). *Atlas climático del estado de Veracruz*. Instituto de Ecología, A.C. 125 pp.
- Thiers, B. (2016). *Index Herbariorum: A Global Directory of Public Herbaria and Associated Staff.* New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. <http://sweetgum.nybg.org/science/ih/>
- Tlacomulco-Flores, L. L., Déciga-Campos, M., González-Trujano, M. E., Carballo- Villalobos, A. I., & Pellicer, F. (2020). Antinociceptive effects of *Salvia divinorum* and bioactive Salvinorins in experimental pain models in mice. *Journal of Ethnopharmacology*, 248:112276. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112276>
- Valdés, L. J., Díaz, J. L., & Paul, A. G. (1983). Etnopharmacology of Ska María Pastora (*Salvia divinorum* Epling & Játiva). *Journal of Ethnopharmacology*, 7, 287–312. [https://doi.org/10.1016/0378-8741\(83\)90004-1](https://doi.org/10.1016/0378-8741(83)90004-1)
- Villaseñor, J. L. (2016). Checklist of the native vascular plants of Mexico. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 87(3), 559–902. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rmb.2016.06.017>
- Wasson, R. G. (1962). A new Mexican psychotropic drug from the mint family. *Botanical Museum Leaflets Harvard University*, 20, 77–84.
- Zamora, C. P., & Castillo-Campos, G. (1997). *Vegetación y flora del municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz*. Universidad Veracruzana. 88 pp.