

CUADRO 3

PACIENTES PEDIÁTRICOS PORTADORES FARÍNGEOS DE *Streptococcus pneumoniae* SEGÚN ANTECEDENTES PERSONALES Y PSICOBIOLÓGICOS.

CIUDAD BOLÍVAR. ESTADO BOLÍVAR.

ENERO 2009– DICIEMBRE 2010.

Antecedentes Personales y Psicobiológicos	Portadores		No Portadores		χ^2
	Nº (3/80)	%	Nº (77/80)	%	
Asma	1	26,67	7	7,27	$\chi^2= 9,14; p<0,05$
Neumonía	0	0,00	4	4,16	0
Resfriado común a repetición	3	80,00	64	66,49	$\chi^2= 12,47; p<0,05$
Otitis	2	13,20	8	1,18	$\chi^2= 1,52; p>0,05$
Infección Urinaria	1	26,67	4	4,16	$\chi^2= 15,73; p<0,05$
Infección de piel y partes blandas	1	26,67	4	4,16	$\chi^2= 15,73; p<0,05$
Bronquitis a repetición	0	0	3	3,12	0
Atopia	0	0	2	2,08	0
Sinusitis	0	0	2	2,08	0
Amigdalitis a repetición	1	26,67	15	15,84	$\chi^2= 3,84; p>0,05$
Sin antecedentes	0	0	25	24,06	0
Vacunados contra Neumococo	2	13,20	36	37,40	$\chi^2= 0,21; p> 0,05$

CUADRO 4

INDIVIDUOS DE LA TERCERA EDAD INSTITUCIONALIZADOS PORTADORES FARÍNGEOS DE *Streptococcus pneumoniae* SEGÚN ANTECEDENTES PERSONALES Y PSICOBIOLÓGICOS. CIUDAD BOLÍVAR. ESTADO BOLÍVAR. ENERO 2011– DICIEMBRE 2011.

Antecedentes Personales y Psicobiológicos	Portadores		No Portadores		χ^2
	Nº (10/66)	%	Nº (56/66)	%	
Hipertensión arterial	8	52,8	11	12,96	$\chi^2= 0,12$; $p>0,05$
Cardiopatía Hipertensiva	6	39,6	8	9,43	$\chi^2= 3,77$; $p> 0,05$
Diabetes Mellitus Tipo II	4	26,4	15	17,68	$\chi^2= 4,31$; $p< 0,05$
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2	13,2	1	1,18	0
Incontinencia urinaria	3	19,8	1	1,18	0
Enfermedad cerebro-vascular	1	6,6	5	5,89	0
Antecedentes Tabáquicos	7	46,2	14	16,5	$\chi^2= 0,11$; $p>0,05$
Vacunados contra Neumococo	4	26,4	6	7,07	$\chi^2= 13,85$; $p< 0,05$