



Nota Científica
(*Short Communication*)

NUEVAS LOCALIDADES DEL ZORRILLO MANCHADO DEL SUR *SPilogale angustifrons* (CARNIVORA, MEPHITIDAE) EN VERACRUZ, MÉXICO

NEW LOCATIONS OF THE SOUTHERN SPOTTED SKUNK *SPilogale angustifrons* (CARNIVORA, MEPHITIDAE) IN VERACRUZ, MEXICO

Recibido: 29/10/2015; aceptado: 24/06/2016

González Christen A., Guzmán Guzmán S., & Alarcón Villegas L. E. (2016). New locations of the Southern Spotted Skunk *Spilogale angustifrons* (Carnivora, Mephitidae) in Veracruz, Mexico. *Acta Zoológica Mexicana* (n.s.), 32(3), 387-389.

ABSTRACT. We provide five new locations of the Southern Spotted Skunk *Spilogale angustifrons* Howell 1902 in Veracruz, Mexico. These records extend the known geographic distribution of this species in the Veracruz state.

En México se presentan tres géneros de zorritos (Mammalia: Carnivora, Mephitidae): *Mephitis* (con 2 especies), *Conepatus* (con una especie) y *Spilogale* (con cuatro especies); estas últimas son *Spilogale angustifrons*, *S. gracilis*, *S. putorius* y *S. pygmaea* (Ramírez-Pulido *et al.*, 2014). A partir de la revisión taxonómica del género *Spilogale* por Wozencraft (2005), se debe de considerar que en Veracruz este zorrito está representado por la especie *Spilogale angustifrons* Howell 1902, por lo que los reportes previos así deberán ser considerados. El Zorrillo manchado del sur, *Spilogale angustifrons*, presenta una distribución desde el centro de México hasta Costa Rica (Reid *et al.*, 2008). La presencia de la especie en Veracruz por años fue desconocida (Hall & Kelson, 1959; Hall & Dalquest, 1963; Hall, 1981; Flores & Geréz, 1994; González-Romero & Lara-López, 2006). La distribución conocida de esta especie de zorrito se restringía en Veracruz a dos ejemplares: el primer reporte se conoce a partir de un ejemplar depositado en la Colección Mastozoológica del Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera” de la Universidad Nacional Autónoma de México MZFC-M, 3458 ♂ 10 km S, El Carrizal, Municipio de Emiliano Zapata (19°23'24.6" N y 96°38'9" O) (León & Romo, 1991) incorporado como *Spilogale putorius* spp., *interrupta*. El segundo reporte de *Spilogale* proviene de la zona de la

estación de La Mancha (Morales Mável & Guzmán Guzmán, 1994), reportado como *Spilogale putorius*, sin que hasta la fecha se conocieran otras localidades para el Estado de Veracruz.

Los registros aquí presentados se obtuvieron durante diversos proyectos de investigación, monitoreo, rescate y reubicación, logrados a partir de avistamientos, de captura o mediante la recolecta de cadáveres. Los ejemplares muertos se incorporaron a la Colección Mastozoológica del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana (IIBUV) registro SEMARNAT cve: VER-MAM-191-10-06. Para la identificación de la especie, se consideraron las medidas somáticas de la etiqueta así como 20 medidas craneales tomadas *ex profeso*, apoyados en la literatura especializada (Van Gelder, 1959). Además, para el caso de los avistamientos, se comparó el patrón de coloración del pelaje dorsal.

En esta nota se aportan 15 registros de *S. angustifrons* que fueron obtenidos entre 2003 y 2014, provenientes de cinco nuevas localidades en el Estado de Veracruz, México: De Playa Norte (19°13'25.9" N 96°10'41.9" O) se detectaron siete individuos, tres con base en avistamientos, tres capturados y reubicados y el séptimo muerto atropellado se incorporó a la Colección (IIBUV 3388 ♂). De Punta Gorda (19°14'41.5" N 96°11'39.6" O) se reportan cuatro individuos, tres avistamientos y uno atropellado (IIBUV 3615 ♀). En Rancho Gallinero (18°57'45.0" N 96°43'26.4" O) Municipio Paso del Macho se colectó un ejemplar (IIBUV 3862 ♂). De Rinconada (19°20'56.1" N 96°34'19.6" O) se recuperó un zorrillo de un cazarador de (IIBUV 4138 ♂). Finalmente, en Palma Sola (19°47'24.0" N 96°28'59.6" O) se avistaron dos de estos zorritos (Arboleda Sánchez com. pers.).

Con estos hallazgos se amplía el rango de su distribución conocida dentro del estado en 53.3 km en línea recta



CC BY-NC-SA
Reconocimiento-noComercial-CompartirIgual

entre Playa Norte y Villa Emiliano Zapata (Fig. 1), en 48.8 km entre Villa Emiliano Zapata y Paso del Macho y en 21.5 km entre las localidades de Palma Sola y La Mancha. Los registros más cercanos fuera de la entidad para esta especie se localizan en los estados de Puebla y de Campeche, el registro de Puebla se localiza en la localidad de San Juan de los Cues a una distancia de 155 km (Botello *et al.*, 2013), en tanto que el registro más cercano en el Estado de Campeche se localiza a 609 km (Hidalgo-Mihart *et al.*, 2014).

El zorrillo manchado del sur es poco común pero con un área de distribución amplia y con una tendencia poblacional estable (Reid *et al.*, 2008). Aunque el centro de Veracruz es un área relativamente bien estudiada en su mastofauna, no fue hasta 1984 que se consiguieron los primeros registros de la especie para Veracruz. Al menos hay dos posibles explicaciones de esto: (1) dado que es una especie rara en Veracruz, no ha habido suficiente muestreo adecuado para registrar a la especie (trampas tipo Tomahawk, fototrampas, etc.); (2) la presencia del zorrillo manchado del sur en Veracruz es producto de una reciente colonización. Esta última explicación es poco probable pues todo indica que la selva baja caducifolia del centro de Veracruz donde se colectaron los zorrillos, en tiempos históricos formó un continuo de vegetación que se extendía desde el sur de Tamaulipas hasta la península de Yucatán y que conectaba con las selvas bajas de la costa del pacífico (Castillo-Campos com. pers). Consideramos que es necesario realizar estudios sobre la distribución de esta especie en el estado, el tamaño y estatus de riesgo de extinción de sus poblaciones en la entidad, así como las probables interacciones con otras especies.

AGRADECIMIENTOS. Los autores agradecen a la Dra. Livia León Paniagua las facilidades otorgadas para consultar la colección de mamíferos del Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera" de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al Dr. Alberto González Romero por la donación del ejemplar IIBUV 3862. Al Biólogo Mariano Avendaño Díaz por su apoyo en la elaboración del mapa. Asimismo los autores desean agradecer los comentarios de los revisores anónimos que enriquecieron esta nota.

LITERATURA CITADA

- Botello, F., Villaseñor, E., Guevara, L., Méndez, A., Cortés, A., Iglesias, J., Izúcar, M., Luna, M., Martínez, A., & Salazar, J. M.** (2013). Registros notables del zorrillo manchado (*Spilogale angustifrons*) y del jaguarundi (*Puma yagouaroundi*) en la Reserva de la Biosfera de Tehuacán - Cuicatlán, Oaxaca, México. *Revisita Mexicana de Biodiversidad*, 84, 713-717.
- Flores V., O. & Geréz, P.** (1994). *Biodiversidad y conservación en México: Síntesis sobre vertebrados terrestres vegetación uso del suelo*. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, UNAM. 439 pp.
- González-Romero, A., & Lara-López, M. del S.** (2006). Los Anfibios, Reptiles y Mamíferos, pp. 408-422 In: Moreno-Casasola, P. (Eds.). 2006. *Entornos veracruzanos: la costa de La Mancha*. Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Ver. México.
- Hall, E. R.** (1981). *The Mammals of North America*. John Wiley & Sons, Nueva York. 2da. Edición. Vol. I y II. 1: xv + 1-600 + 90 y 2: vi + 601-1181 +90.
- Hall, E. R., & Dalquest, W. W.** (1963). The mammals of Veracruz. *University Kansas Publications, Museum of National History*, 14 (14), 165-362.
- Hall, E. R., & Kelson, K. R.** (1959). *The Mammals of North America*. The Ronald Press Company, New York, vol. 1: XXX + 546 + 79, vol. 2: VIII + 547-1083 + 79.
- Hidalgo-Mihart, M. G., Pérez-Solano, L. A., Contreras-Moreno, F. M., & de la Cruz, A. J.** (2014). Ampliación del área de distribución del zorrillo manchado del sur *Spilogale angustifrons* Howell 1902 en el Estado de Campeche, México. *Acta Zoológica Mexicana* (n.s.), 30(1), 232-236
- León Paniagua, L., & Romo V., E.** (1991). *Catálogo de la colección de mamíferos del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias UNAM. Mamíferos (Vertebrata: Mammalia)*. Catálogo No. 2 Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera". Facultad de Ciencias. Departamento de Biología. Universidad Nacional Autónoma de México. 68 p.
- Morales Mávil, J. E., & Guzmán Guzmán, S.** (1994). Fauna silvestre de la zona de La Mancha, Veracruz, México. *La Ciencia y el Hombre*, 16, 77-103.
- Ramírez-Pulido, J., González-Ruiz, N., Gardner, A. L., & Arroyo-Cabral, J.** (2014). List of Recent Land Mammals of Mexico. *Special Publications of the Museum of Texas Tech University*, Number 63
- Reid, F., Timm, R., & Helgen, K.** (2008). *Spilogale angustifrons*. The IUCN Red List of Threatened Species 2008. e.T136636A4320941. Available at: <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T136636A4320941.en> (Accessed on May 2016).
- Van Gelder, R. G.** (1959). A taxonomic revision of the spotted skunks (genus *Spilogale*). *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 117, 5 New York
- Wozencraft W. C.** (2005). Order Carnivora. Pp. 532-628. In: Wilson, D. E & Reeder, D. M. (Eds). *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference* 3^a Ed. The Johns Hopkins University Press. Baltimore Maryland 2142 p.



**ALVAR GONZÁLEZ-CHRISTEN,^{1,*} SALVADOR
GUZMÁN GUZMÁN² Y LUIS E. ALARCÓN
VILLEGAS¹**

¹ Instituto de Investigaciones Biológicas.
Universidad Veracruzana. Av. Luis Castelazo
s/n Col. Industrial las Animas, CP 91190 Xalapa,

Veracruz, México

² Facultad de Biología, Universidad Veracruzana.
Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán Zona
Universitaria,
C.P. 91020 Xalapa, Veracruz, México
*Autor para Correspondencia: <agonzalez@
uv.mx>, <gonalvar@hotmail.com>
Editor responsable: Vinicio Sosa