

Catálogo de ejemplares tipo del orden Coleoptera (Insecta) en el Museo Nacional de Costa Rica

Catalogue of type specimens of the order Coleoptera (Insecta) in the National Museum of Costa Rica

MARIANELA CAMBRONERO-SÁNCHEZ^{ID}

Departamento de Historia Natural, Museo Nacional de Costa Rica.
Apartado postal 40306, Santa Rosa, Santo Domingo Heredia, Costa Rica.



Editor responsable: Francisco J. Cabrero

Acta Zoológica Mexicana (nueva serie)

*Autor correspondiente:

^{ID} Marianela Cambronero-Sánchez
mcambronero@museocostarica.go.cr

Cómo citar:

Cambronero-Sánchez, M. (2025)
Catálogo de ejemplares tipo del orden
Coleoptera (Insecta) en el Museo
Nacional de Costa Rica. *Acta Zoológica
Mexicana (nueva serie)*, 41, 1–68.

10.21829/azm.2025.4112742
elocation-id: e4112742

Recibido: 09 enero 2025

Aceptado: 23 junio 2025

Publicado: 15 agosto 2025

RESUMEN. Se realizó una investigación para determinar cuáles holotipos de Coleoptera están depositados físicamente en el Museo Nacional de Costa Rica. Para ello, se efectuó una búsqueda y revisión de literatura sobre las publicaciones de cada especie presente en la colección de holotipos de Coleoptera del MNCR. De 471 holotipos presentes hoy día en el MNCR se encontraron las respectivas publicaciones. Se localizaron también 22 especímenes etiquetados como holotipos, de los cuales no se ha encontrado aún una publicación. Se encontraron publicaciones de descripción de 50 holotipos que no fueron depositados en lo que fue la colección de Instituto Nacional de Biodiversidad o actualmente el MNCR, a pesar de ser mencionada alguna de estas instituciones como depositaria. Los 471 holotipos, pertenecen a 27 familias de Coleoptera. Esta investigación pretende dar a conocer las especies de

holotipos que están físicamente en la colección del MNCR y que poseen publicación, así como la contribución para la devolución de holotipos que no se encuentran en la misma y que son importantes para la investigación de biodiversidad en el orden Coleoptera.

Palabras clave: Escarabajos; especímenes; holotipos; colección entomológica

ABSTRACT. A study was conducted to determine which Coleoptera holotypes are primarily deposited at the National Museum of Costa Rica. To this end, a literature search and review were conducted on the publications for each species in the MNCR's Coleoptera holotype collection. Of the 471 holotypes currently present at the MNCR, the respective publications were found. Twenty-two specimens labeled as holotypes were also located, for which no publication has yet been found. Descriptions of 50 holotypes were found that were not deposited in the collection of the National Institute of Biodiversity or currently in the MNCR, despite one of these institutions being mentioned as a depository. The 471 holotypes belong to 27 Coleoptera families. This research aims to publicize the holotype species that are primarily in the MNCR collection and that have been published, as well as contribute to the return of holotypes that are not in the collection and that are important for biodiversity research in the Coleoptera order.

Key words: Beetles; specimens; holotypes; entomological collection

INTRODUCCIÓN

El primer curador de la Colección Entomológica del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR) fue José Fidel Tristán, quien fue nombrado para este trabajo en 1889. Sin embargo, para el año 1887 ya había publicado su primera contribución sobre insectos de Costa Rica. Tristán y Paul Biolley laboraron conjuntamente como curadores incrementando así el trabajo de recolección e identificación taxonómica de los especímenes (Hilje, 2023). La mayoría de los ejemplares se recolectaron entre 1890 y 1929, con un total de 3,744 ejemplares de diferentes órdenes, entre los que se incluyen 38 familias y 815 especies de coleópteros de la colección del Museo Nacional de Costa Rica. En 1989 se creó el Instituto Nacional de Biodiversidad como institución privada sin fines de lucro que se encargó de realizar un inventario de biodiversidad por 26 años a nivel nacional.

Para el 27 de marzo del 2015 la colección de artrópodos del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) fue donada al MNCR, aumentando así la colección en más de 3,000,000 de ejemplares de diferentes grupos de insectos y arácnidos, siendo aproximadamente 1,000,000 de especímenes del orden Coleoptera. Esto significó un gran aporte a las colecciones patrimoniales de historia natural, convirtiéndose el estado costarricense en el propietario de la colección de insectos más importante de Centroamérica, dentro del cual los coleópteros son los más numerosos, tanto en cantidad de especímenes como en número de especies.

El presente trabajo tiene como finalidad determinar cuáles holotipos se encuentran actualmente depositados en la colección del Museo Nacional de Costa Rica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un inventario físico del material tipo de Coleoptera del MNCR (material de lo que fue INBIO y actualmente MNCR). Además se hizo una búsqueda y recopilación de los artículos donde se describió cada especie y de la cual existe un holotipo en la colección. Esta información se incorporó en una de datos digital del museo, donde se proporciona: nombre taxonómico actual, autor, año de descripción, referencia bibliográfica, número de catálogo y el acrónimo de la colección (MNCR-A, categoría del tipo, localidad, nombre del colector, y sexo de espécimen (si se indica en la publicación o en el ejemplar). Cabe señalar que los holotipos (especies) que cuentan con la publicación y que no están físicamente, no se darán a conocer en este catálogo.

RESULTADOS

De la revisión del material de colección tipo del MNCR-A, se obtuvieron 471 holotipos (471 especies), que están físicamente presentes y poseen su respectiva publicación, 22 holotipos (22 especies) en físico donde se encontró publicación, 50 holotipos (50 especies) que poseen publicación, pero que no están físicamente depositados en el museo. Entre los 471 holotipos presentes, hay representantes de 27 familias, 54 subfamilias y 86 tribus. A partir de esta información se presenta el siguiente catálogo en orden alfabético según familia, con su correspondiente subfamilia, tribu y especies.

Catálogo de los holotipos de Coleoptera depositados en el Museo Nacional de Costa Rica

ATTELABIDAE

RHYNCHITINAE

EUGNAMPTINI

***Eugnamptus amistadensis* Hamilton y Novinger, 2012.** *Journal of the Kansas Entomology Society*, 85(4), 318–331.

Holotipo: Hembra, MNCR-A 474202.

Costa rica, Finca Cafrosa, Estación Las Mellizas, Parque Nacional La Amistad, 1300m, Provincia Puntarenas. 8° 54' 15" N, 82° 47' 18" W/Col. M. Ramírez, G. Mora/Oct 1989.

***Eugnamptus balius* Hamilton y Novinger, 2004.** *Zootaxa*, 610, 1–43.

Holotipo: Hembra, MNCR-A 2068506.

Costa rica, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia. 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. INBIO-OET/Setiembre 1993.

***Eugnamptus bellus* Hamilton y Novinger, 2004.** *Zootaxa*, 610, 1–43.

Holotipo: Macho, MNCR-A 3645849.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Puerto Viejo, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespenheide/Julio 1976.

***Eugnamptus blancensis* Hamilton y Novinger, 2012.** *Journal of the Kansas Entomology Society*, 85(4), 318–331.

Holotipo: Hembra, MNCR-A 3222265.

COSTA RICA, Provincia Heredia: 6 km Vara Blanca, 10° 10' 34" N, 84° 6' 41" W/Col. D. Brenes/Marzo 2002.

***Eugnamptus herediensis* Hamilton y Novinger, 2004.** *Zootaxa*, 610, 1–43.

Holotipo: Macho, MNCR-A 2258818.

Costa Rica, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia. 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. indet/Fecha indet.

***Eugnamptus longiusculus* Hamilton y Novinger, 2004.** *Zootaxa*, 610, 1–43.

Holotipo: Macho, MNCR-A 3645845.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. D. Brenes/Septiembre 1993.

***Eugnamptus lycidus* Hamilton y Novinger, 2012.** *Journal of the Kansas Entomology Society*, 85(4), 318–331.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2146784.

COSTA RICA, Sector San Ramón de Dos Ríos, Provincia Alajuela, 10° 52' 59.762" N, 85° 24' 48.757" W/Col. F. Quesada/Mayo 1995.

***Eugnamptus pusillus* Hamilton y Novinger, 2004.** *Zootaxa*, 610, 1–43.

Holotipo: Hembra, MNCR-A 2260813.

Costa Rica, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia. 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. indet/Fecha indet. Col. indet/Fecha indet.

***Eugnamptus rostralis* Hamilton y Novinger, 2004.** *Zootaxa*, 610, 1–43.

Holotipo: Macho, MNCR-A 2732048.

Costa Rica, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia. 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. indet/Fecha indet.

***Eugnamptus sarapiquensis* Hamilton y Novinger, 2004.** *Zootaxa*, 610, 1–43.

Holotipo: Macho, MNCR-A 3645878.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Puerto Viejo, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespenheide/Abril 1985.

***Eugnamptus sulcicollis* Hamilton y Novinger, 2004.** *Zootaxa*, 610, 1–43.

Holotipo: Macho, MNCR-A 3645881

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Puerto Viejo, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. D. Brenes/Noviembre 1994.

**ATTELABIDAE
RHYNCHITINAE
RHYNCHITINI**

***Temnocerus cyaneus* Hamilton, 2010.** *Insecta Mundi*, 128, 1–42.

Holotipo: Macho, MNCR-A 3220553

COSTA RICA, Provincia Heredia, 16 km SSE La Virgen, 10° 16' 9.395" N, 84° 5' 9.408 " W/Col. D. Brenes/Marzo 2001.

***Temnocerus herediensis* Hamilton, 2010.** *Insecta Mundi*, 128, 1–42.

Holotipo: Macho, MNCR-A 1227898.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. D. Brenes/Julio 1993.

***Temnocerus minutus* Hamilton, 2010.** *Insecta Mundi*, 128, 1–42.

Holotipo: Macho, MNCR-A 4247640.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. INBio-OET/Junio 1993.

***Temnocerus niger* Hamilton, 2010.** *Insecta Mundi*, 128, 1–42.

Holotipo: Macho, MNCR-A 4247638.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespenheide/Julio 1996.

***Temnocerus rostralis* Hamilton, 2010.** *Insecta Mundi*, 128, 1–42.

Holotipo: Macho, MNCR-A 5134620.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 25' 49" N, 84° 00' 24" W/Col. R. Hamilton/Diciembre 1999.

***Temnocerus salvensis* Hamilton, 2010.** *Insecta Mundi*, 128, 1–42.

Holotipo: Macho, MNCR-A 1227898.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W Col. Brenes/Julio 1993.

BELIDAE
OXYCORYNINAE
OXYCORYNINI

***Balanophorobius gamezi* Anderson, 2005.** *Systematic Entomology*, 30, 644–652.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3033161.

COSTA RICA, Península de Osa, Parque Nacional Corcovado, Estación Cerro de Oro sendero – Cerro El Guapinol, Provincia Puntarenas, 8° 33' 13.93" N, 83° 30' 6" W/Col. L. Angulo/Marzo 1996.

BRENTIDAE
STERODERMINAE
STEREODERMINI

***Stereodermus explanatus* Mantilleri y Sforzi, 2006.** *Zootaxa*, 1207, 3–64.

Holotipo: Macho, MNCR- A 572725.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000-1400m, Lado SO Volcán Cacao, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. D. García/Agosto 1991.

***Stereodermus denisi* Mantilleri y Sforzi, 2006.** *Zootaxa*, 1207, 3–64.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2196989.

COSTA RICA, Estación Sirena, ACOSA, Provincia Puntarenas, 8° 28' 48.617" N 83° 35' 28.641" W/Col. A. Picado/Abril 1995.

BUPRESTIDAE
AGRILINAE
AGRILINI

***Agrilus alajuelensis* Hespenheide, 2012.** *Zootaxa*, 3181, 1–27, 21–22

Holotipo: Hembra, MNCR- A 3336271.

COSTA RICA, Parque Nacional Volcán Tenorio, Upala, Bijagua, Sendero Laguna Dantas, Provincia Alajuela, 10° 42' 12.636" N, 85° 1' 48.956" W/Col. A. López/Octubre 2000.

***Agrilus barriesi* Curletti, 2010.** *Fragmenta entomologica*, 42 (2), 493–498.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 4440090.

COSTA RICA, Finca Nueva Zelandia, Provincia Guanacaste, 10° 49' 52.000" N, -85° 24' 28.000" W
Col. C. Barries/Mayo 2007.

***Agrilus braconicoloratus* Hespeneheide, 1990.** *Folia Entomológica Mexicana* 77, 141–210.

Holotipo: Macho, MNCR A 5156957.

COSTA RICA, Monteverde, Provincia Puntarenas, 10°17'23"N, 84° 49' 30"W/Col. E. Giesbert/Abril 1989.

***Agrilus dauberi* Curletti, 2010.** *Zootaxa*, 2333, 59–68.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2766703.

COSTA RICA, Parque Nacional de Santa Rosa, Provincia Guanacaste, 10° 50' 11.075" N, 85° 36' 55.768" W/Col. D. Janzen/Junio 1997.

***Agrilus dipteroides* Hespeneheide, 2012.** *Zootaxa* 3181, 1–27, 21–22.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4368100.

COSTA RICA, Parque Nacional Tapantí, Río Orosí, Provincia Cartago, 09° 42' 44.000" N, -83° 46' 00.000" W/Col. C. Barries/Mayo 2005.

***Agrilus exquisitus* Hespeneheide, 2012.** *Zootaxa*, 3181, 1–27, 21–22.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 4440089.

COSTA RICA, Finca Nueva Zelandia, Provincia Guanacaste, 10° 49' 52.000" N, -85° 24' 28.000" W/Col. C. Barries/Mayo 2007.

***Agrilus lucindae* Hespeneheide, 2010.** *Zootaxa* 2545 (2545), 39–46.

Holotipo: Macho, MNCR-A 5156956.

COSTA RICA, Estación Biológica la Selva, Puerto Viejo, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' N, 84° 01' W/Col. H. Hespeneheide/Marzo 1980.

***Agrilus maesi* Curletti, 2010.** *Fragmenta entomologica*, 42 (2), 493–498.

Holotipo: Macho, MNCR-A 3412512.

COSTA RICA, San Luis, Monteverde, Área de Conservación Arenal, Provincia Puntarenas, 10° 16' 36.202" N, 84° 47' 47.831" W/Col. Z. Fuentes/Junio 1993.

***Agrilus percaroides* Hespeneheide, 2012.** *Zootaxa*, 3181, 1–27, 21–22.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1796114

COSTA RICA, San Luis, Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 16' 36.202" N, 84° 47' 47.831" W/Col. Z. Fuentes/Abril 1994.

***Agrilus zumbadoi* Hespeneheide, 2012.** *Zootaxa*, 3181, 1–27, 21–22

Holotipo: Hembra, MNCR- A 575594.

COSTA RICA, Estación Magsasay, Parque Nacional Braulio Carrillo, 200 m Provincia Heredia, 10° 24' 4.519" N, 84° 2' 57.532" W/Col. M. Zumbado/Abril 1991.

***Sambomorpha corona* Bellamy, 2007.** *The Coleopterists Bulletin*, 61(3), 471–475.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 759459.

COSTA RICA, Estación Quebrada Bonita, 50 m, Reserva Biológica Carara, Provincia Puntarenas, 9° 46' 51.80" N, 84° 36' 20.28" W/Col. R. Guzmán/Julio 1992.

***Sambomorpha costarica* Bellamy, 1997.** *Tropical Zoology*, 10, 143–156.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A517509.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocorí, 150 m, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Enero 1992.

***Paragrilus akersorum* Hespenheide, 2002.** *Zootaxa*, 43, 1–28.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3220576.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespenheide/Julio 1992.

***Paragrilus azureus* Hespenheide, 2002.** *Zootaxa*, 43, 1–28

Holotipo: Macho, MNCR- A 1190947

COSTA RICA, Rancho Quemado, Península de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. F. Quesada/Octubre 1991.

***Pilotrulleum caesariae* Bellamy y Westcott, 1995.** *Annals of the Transvaal Museum*, 36 (14), 193–203.

Holotipo: Macho, MNCR- A 34913.

COSTA RICA, Estación Santa Rosa, 300 m, Provincia Guanacaste, 10° 50' 11.075" N, 85° 36' 55.768" W/Col. GNP Biodiv/Mayo 1989.

BUPRESTIDAE
AGRILINAE
TRACHYINI

***Neotrachys andrewsi* Hespenheide, 2006.** *The Pan-Pacific Entomologist*, 82 (2), 223–241.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 3383468.

COSTA RICA, Upala, Bijagua, Estación Heliconias, Sector Alto Los Brenes, Provincia, 10° 43' 33.938" N, -85° 02' 20.732" W/Col. A. López/Setiembre 2001.

***Neotrachys cuprascens* Hespenheide, 2006.** *The Pan-Pacific Entomologist*, Vol. 82 (2), 223–241.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 3716766.

COSTA RICA, San Luis, Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 42' 16.572" N, 84° 59' 32.294" W/Col. J. Azofeifa/Mayo 2003.

***Neotrachys mariae* Hespenheide, 2006.** *The Pan-Pacific Entomologist*, Vol. 82 (2), 223–241.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 4368226.

COSTA RICA, Parque Nacional Braulio Carrillo, 16Km S.S.E. de La Virgen, Provincia Heredia, 10° 16' 9.395" N, 84° 5' 9.408" W/Col. E. Riley/Marzo 2001.

***Neotrachys refulgens* Hespenheide, 2006.** *The Pan-Pacific Entomologist*, Vol. 82 (2), 223–241.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 3222381.

COSTA RICA, 6km de Vara Blanca, Transecto INBio-OET-ALAS, Provincia, 10° 10' 34" N 84° 6' 41" W/Col. D. Brenes/Marzo 2002.

***Neotrachys solisi* Hespenheide, 2006.** *The Pan-Pacific Entomologist*, Vol. 82(2), 223–241.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 4368229.

COSTA RICA, Golfito. 6 km San Vito, Provincia Puntarenas, 08° 42' 00.000" N, -83° 00' 00.000" W/Col. H. Hespenheide/Marzo 1965.

BUPRESTIDAE

***Taphroceroides mimeticus* Hespenheide, 2007.** *Folia Heyrovskyana*, 15 (1), 1–6.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 3681261.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia 10° 25' 55.046" N, 84° 00' 29.472" W/Col. INBio-OET-ALAS/Abril 2004.

BUPRESTIDAE
BUPRESTINAE
CHRYSOBOTHRINI

***Actenodes solisi* Barries, 2007.** *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen*, 59, 33–36.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 3971961.

COSTA RICA, San Luis, Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 50' 11.075" N, 85° 36' 55.768" W/
Col. D. Janzen/Junio 1982.

CARABIDAE
LEBIINAE
LEBIINI

***Agra eponine* Erwin, 2000.** *Smithsonian Contributions to Zoology Number*, 608, 1–33.

Holotipo: Macho, MNCR- A 601649.

COSTA RICA, Quepos, 80m, Parque Nacional Manuel Antonio, Provincia Puntarenas, 9° 23' 15.821" N, 84° 7' 58.102" W/Col. R. Zúñiga/Abril 1991.

***Agra hespenheide* Erwin, 2000.** *Smithsonian Contributions to Zoology Number*, 608, 1–33.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4009921.

COSTA RICA, Sarapiquí, Zona Protectora La Selva, 3 Km S Puerto Viejo, Provincia Heredia, 10° 25' 52" N, 84° 0' 12" W/Col. H. Hespenheide/Marzo 1987.

***Agra paratax* Erwin, 2000.** *Smithsonian Contributions to Zoology Number*, 608, 1–33.

Holotipo: Macho, MNCR- A 223997.

COSTA RICA, Estación Quebrada Bonita, 50 m, Reserva Biológica Carara, Provincia Puntarenas, 9° 46' 02.829" N, 84° 36' 29.227" W/Col. R. Zúñiga/Junio 1990.

CARABIDAE
CICINDELINAE
CINCINDELINI

***Pentacomia wappesi* Moravec y Brzoska, 2013.** *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno)*, 98 (1), 75–84.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5134621.

COSTA RICA, San Luis, Monteverde, Provincia Puntarenas, 8° 47' 03" N, 82° 57' 36" W/Col. D. Brzoska/Junio 1997.

CARABIDAE
PLATYNINAE
PLATYNINI

***Dyscolus amethystinus* Moret, 1998.** *Revue Française d'Entomologie*, 20 (1–2), 61–72.

Holotipo: Macho, MNCR- A 164204.

COSTA RICA, Estación Barva, Parque Nacional Braulio Carrillo, Provincia Heredia, 10° 7' 59.43" N, 84° 7' 16.07" W/Col. G. Rivera/Marzo 1990.

***Dyscolus costaricensis* Moret, 1998.** *Revue Française d'Entomologie*, 20 (1–2), 61–72.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 164546.

COSTA RICA, Estación Barva, Parque Nacional Braulio Carrillo, Provincia Heredia, 10° 7' 59.43" N, 84° 7' 16.07" W/Col. G. Rivera/Marzo 1990.

***Dyscolus jimenezi* Moret, 1998.** *Revue Française d'Entomologie*, 20 (1–2), 61–72.

Holotipo: Macho, MNCR- A 178013.

COSTA RICA, Estación Barva, Parque Nacional Braulio Carrillo, Provincia Heredia, 10° 7' 59.43" N, 84° 7' 16.07" W/Col. A. Fernández/Abril 1990.

**CARABIDAE
PSYDRINAE
TRECHINI**

***Paratrechus alexandri* Trezzi, 1995.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 7 (41), 351–353.

Holotipo: Sexo indet. MNCR- A 177210.

COSTA RICA, Estación Barva, Parque Nacional Braulio Carrillo, Provincia Heredia, 10° 7' 59.43" N, 84° 7' 16.07" W/Col. F. Alvarado/Abril 1990.

**CARABIDAE
RHYSODINAE
CLINIDIINI**

***Clinidium erwini* Bell y Bell, 2009.** *Annals of the Carnegie Museum*, 78 (1), 45–77.

Holotipo: Macho, MNCR- A 210558.

COSTA RICA, Estación El Ceibo, Parque Nacional Braulio Carrillo, Provincia Heredia, 10° 19' 40.96" N, 84° 4' 49.527" W/Col. C. Chávez/Abril 1990.

***Clinidium talamanca* Bell y Bell, 2009.** *Annals of the Carnegie Museum*, 78 (1), 45–77.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2456927.

COSTA RICA, Puesto Tres Colinas, En la Ronda Rompe Fuego, Provincia Puntarenas, 9° 08' 06.924" N-83° 03' 53.409" W/Col. A. Picado/Setiembre 1996.

**CERAMBYCIDAE
CERAMBYCINAE
CALLICHROMATINI**

***Monnechroma hovorei* Giesbert, 1998.** *Occasional Papers of the Consortium Coleopterorum* 2, 60–64.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2198890.

COSTA RICA, La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla, Santa Cecilia, Provincia Guanacaste, 10° 59' 25.285" N, 85° 25' 37.855" W/Col. M. Moraga/Abril 1995.

**CERAMBYCIDAE
CERAMBYCINAE
CLYTINI**

***Neoclytus vitellinus* Martins y Galileo, 2008.** *Revista Brasileira de Entomologia*, 52 (2), 272–276.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2143946.

COSTA RICA, Estación Los Almendros, Provincia Guanacaste, 11° 2' 3.471" N, 85° 31' 39.145" W/Col. E. López/Abril 1995.

**CERAMBYCIDAE
LAMIINAE
ACANTHODERINI**

***Acanthoderes paravetusta* Chemsak y Hovore, 2002.** *Les Cahiers Magellanes*, 16, 1–26.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 1391444.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700m, 9 km S Sta. Cecilia, P. N. Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. C. Moraga/Abril 1993.

***Acanthoderes solisi* Chemsak y Hovore, 2002.** *Les Cahiers Magellanes*, 16, 1–26.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 2544498.

COSTA RICA, Puesto Tres Colinas, En la Ronda Rompe Fuego, Provincia Puntarenas, 5° 32' 45" N, 87° 3' 30" W/Col. J. Quesada/Octubre 1994.

***Tetrasarus lezamai* Chemsak y Hovore, 2002.** *Les Cahiers Magellanes*, 16, 1–26.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2510569.

COSTA RICA, Sacramento, San José de la Montaña, Barva, Provincia Heredia, 10° 6' 37.98" N, 84° 7' 10.96" W/Col. M. Zumbado/Junio 1996.

CERAMBYCIDAE

LAMIINAE

DESMIPHORINI

***Estola nigrodorsalis* Martins y Galileo, 2009.** *Papéis Avulsos de Zoologia*, 49 (10), 109–114.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2726025.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, 3 Km S de Puerto Viejo, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 25' 52" N, 84° 00' 12" W/OET-INBIO/Enero 2000.

***Eupogonius lateralis* Martins y Galileo, 2009.** *Papéis Avulsos de Zoologia*, 49(10),109–114.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2731628.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 25' 52" N, 84° 00' 12" W/Col. OET-INBIO/Mayo 2000.

CERAMBYCIDAE

LAMIINAE

AERENICINI

***Antodice lezamai* McCarty, 2006.** *Les Cahiers Magellanes*, 53, 23.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A4204774.

COSTA RICA, Campo Deportivo de Universidad de Costa Rica, Montes de Oca, Provincia San José, 9° 56' 45.000" N, -84° 02' 15.000" W/Col. H. Lezama/Junio 1995.

CERAMBYCIDAE

LAMIINAE

ESTOLINI

***Pseudestoloides affinis* Martins y Galileo, 2008.** *Papéis Avulsos de Zoologia*, 49(10),109–114.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2479082.

COSTA RICA, Tierras Morenas Zona Protectora Tenorio, Provincia Guanacaste, 10° 36' 50.687" N, - 84° 59' 33.678" W /Col. G. Rodríguez/Setiembre 1996.

***Pseudestoloides rubiginosa* Martins y Galileo, 2008.** *Papéis Avulsos de Zoologia*, 49(10),109–114.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1303137.

COSTA RICA, Finca Naranjo Valenciana, 2 km sur Pueblo Nuevo, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 27' 59.066" N, -84° 06' 59.014" W/Col. M. Ortiz/Enero 1993.

CERAMBYCIDAE
LAMIINAE
HEMILOPHINI

***Adesmus moruna* Martins, 2008.** *Revista Brasileira de Zoologia*, 25 (3), 547–554

Holotipo: Hembra, MNCR- A 177909.

COSTA RICA, Estación Barva, Parque Nacional Braulio Carrillo, Provincia Heredia, 10° 7' 59.43" N, 84° 7' 16.07" W/Col. F. Alvarado/Abril 1990.

***Apebusu rubriventris* Martins y Galileo, 2004.** *Revista Brasileira de Entomología*, 48(4), 467–472.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1042371.

COSTA RICA, Estación Mengo, lado suroeste Volcán Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 43" N, 85° 28' 10" W/Col. GNP Biodiversity/Febrero 1989.

***Cotycuara viridis* Galileo y Martins, 2005.** *Iheringia - Série Zoologia*, 95 (3), 269–279.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3243177.

COSTA RICA, Vara Blanca, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 10' 34" N, 84° 6' 41" W/Col. M. Paniagua/ Febrero 2002.

***Esamirim carinatus* Martins y Galileo, 2004.** *Revista Brasileira de Entomología*, 48 (4), 467–472.

Holotipo: Hembra, MNCR- A. 2400325.

COSTA RICA, Sector San Ramón de Dos Ríos, 1.5 Km NO. Hacienda Nueva Zelandia, Provincia Alajuela, 10° 52' 59.762" N, 85° 24' 48.757" W/Col. F. Quesada/Abril 1996.

***Eranina costaricensis* Galileo y Martins, 2005.** *Iheringia Série Zoologia*, 95(3), 269–279

Holotipo: Macho, MNCR- A 2284326.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' N, 84° 1' W/Col. OET INBio/Enero 1999.

***Eranina cretaria* Galileo y Martins, 2005.** *Iheringia Série Zoologia* 95 (3), 269–279.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 5137136.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespenheide/Abril 1987.

***Eranina esquinas* Galileo y Martins, 2008.** *Revista Brasileira de Entomología*, 52(3), 384–389.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1898586.

COSTA RICA, Bosque Esquinas, Península Osa, Área Conservación Osa, Provincia Puntarenas, 8° 46' 07.870" N, -83° 15' 24.339" W/Col. M. Segura/Junio 1994.

***Eranina moysesii*, Galileo y Martins, 2008.** *Revista Brasileira de Entomología*, 52 (3), 384–389

Holotipo: Macho, MNCR- A 2188006.

COSTA RICA, Estación Sirena (ACOSA), Provincia Puntarenas, 8° 28' 48.617" N, 83° 35' 28.641" W/Col. B. Gamboa/Abril 1995.

***Abanycha pectoralis* Martins y Galileo, 2004.** *Revista Brasileira de Entomología* ,48(4), 467–472.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3656260.

COSTA RICA, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. L. LaPierre/Setiembre 1998.

***Kuatinga bicolor* Martins y Galileo, 2004.** *Revista Brasileira de Entomología*, 48 (4), 467–472.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1796114

COSTA RICA, Estación Cacao, suroeste del Volcán Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N

85° 28' 13.524" W/Col. GNP Biodiv-Survey/Diciembre 1998.

CERAMBYCIDAE
LEPTURINAE
LEPTURINI

***Strangalia hovorei* Giesbert, 1997.** *Occasional Papers of the Consortium Coleopterorum*, 1, 17–42.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1918543.

COSTA RICA, San Luis, Monteverde, Área Conservación Arenal, Provincia Puntarenas, 10° 16' 36.202" N, 84° 47' 47.831" W/Col. Z. Fuentes/Junio 1993.

CHRYSOMELIDAE
CASSIDINAE
IMATIDIINI

***Cephaloleia disjuncta* Staines, 1998.** *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 100 (4), 672–673.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2068725.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 25' 52" N, 84° 00' 12" W/Col. OET INBio/Fecha indet.

***Cephaloleia immaculata* Staines, 1996.** *Revista de Biología Tropical*, 3 (3), 87.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A516949.

COSTA RICA, Estación Boscosa, Península de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 41' 49.783" N, -83° 30' 43.874" W/Col. R. Flowers y R. Aguilar/Setiembre1991.

***Cephaloleia triangularis* Staines, 1996.** *Revista de Biología Tropical*, 3 (3), 87.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 375730.

COSTA RICA, Estación Hitoy Cerere, 100 m, Reserva Biológica Hitoy Cerere, Provincia Limón, 9° 40' 31.360" N, 83° 01' 36.392" W/Col. E. López/Abril 1992.

***Cephaloleia uhmanni* Staines, 1996.** *Revista de Biología Tropical*, 3 (3), 87.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 484001.

COSTA RICA, Parque Nacional Manuel Antonio, Quepos, Provincia Puntarenas, 9° 23' 15.821" N, 84° 7' 58.102" W/Col. G. Varela/Abril 1991.

CHRYSOMELIDAE
CASSIDINAE
SCELOENOPLINI

***Ocnosispa condyla* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 741269.

COSTA RICA, Quebrada Segunda, Refugio Nacional Fauna Silvestre Tapantí, Zona Protectora Tenorio, Área Conservación Arena, Provincia Cartago, 9° 45' 45.289" N, 83° 47' 11.419" W/Col. G. Mora/Marzo 1992.

***Ocnosispa depressa* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1153756.

COSTA RICA, Grano de Oro, Chirripó, Turrialba, Provincia Cartago, 9° 49' 06.085" N, 83° 27' 32.988" W/Col. P. Campos/Julio 1993.

***Ocnosispa humerosa* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2069095.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 25' 52" N, 84° 00' 12" W/Col. OET- INBio/Abril 1987.

***Pseudispa bellula* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 517570.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocorí, Finca de E. Rojas, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Enero 1992.

***Pseudispa sinuata* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3204812.

COSTA RICA, La Virgen, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 16' 9.395" N, 84° 5' 9.408" W /Col. INBio-OET-ALAS/Abril 2001.

***Pseudispa tuberculata* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 475172.

COSTA RICA, Finca Cafrosa, Estación Las Mellizas, Parque Nacional Amistad, Provincia Puntarenas, 8° 54' 15" N, 82° 47' 18" W/Col. M. Ramírez/Abril 1991.

***Sceloenopla apicispina* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 657389.

COSTA RICA, Tierras Morenas, Bajo Los Cartagos, San Lorenzo, 1050m, Zona Protectora Tenorio, Área Conservación Arenal, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. C. Alvarado/Febrero 1991.

***Sceloenopla bicolorata* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3220439.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespenheide/Marzo 1980.

***Sceloenopla bidentata* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2284869.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. OET -INBio/Agosto 1996.

***Sceloenopla expanda* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 2371859.

COSTA RICA, Estación Cuerici, Sendero el Carbón, 5 Km al E. de Villa Mills, Provincia San José, 9° 33' 23.947" N, 83° 39' 58.36" W /Col. B. Gamboa/Marzo 1996.

***Sceloenopla flava* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1043763.

COSTA RICA, Punta Blanco, Provincia Puntarenas, 8° 21' 01" N, 83° 07' 45" W/Col. A. Solís/Agosto 1998.

***Sceloenopla lampyridiformis* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 220438.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000-1400m, Lado suroeste del Volcán Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. GNP Biodiv/Julio 1989.

***Sceloenopla lutena* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2270307.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. Alas Proyecto; OET -INBio/Octubre 1994.

***Sceloenopla minuta* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 107871.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700m, 9km S Santa Cecilia, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W /Col. GNP Biodiv/Mes indet, 1998.

***Sceloenopla nigropicta* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 2232311.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. Alas Proyecto; OET- INBio/Noviembre1994.

***Sceloenopla rubivittata* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 772280.

COSTA RICA, Estación Sirena, 0-100m, Parque Nacional Corcovado, Provincia Puntarenas, 8° 28' 48.617" N, 83° 35' 28.641" W /Col. Z. Mora Fuentes/Abril 1992.

***Sceloenopla sanguinea* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 3202805.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 16' 9.395" N, 84° 5' 9.408" W/Col INBio-OET-ALAS/Marzo 2001.

***Sceloenopla trivittata* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 220438.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, 1050 m, Tierras Morenas, Zona Protectora Tenorio, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. A. Marín/Abril 1992.

***Sceloenopla unicostata* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 772024.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700 m, 9 km sur Santa Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. A. Mora y F. Chavarría/Mayo 1992.

***Sceloenopla univittata* Staines, 2002.** *Zootaxa*, 89, 1–32.

Holotipo: Macho, MNCR- A 598458.

COSTA RICA, Est. Sirena, 0-100m, Parque Nacional Corcovado, Provincia Puntarenas, 8° 28' 48.617" N, 83° 35' 28.641" W/Col. G. Fonseca/Mayo 1991.

CHRYSOMELIDAE

EUMOLPINAE

BROMIINI

***Neofidia costaricensis* Strother y Staines, 2008.** *Zootaxa*, 1798, 1–100.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1004054.

COSTA RICA, San Pedro, Montes de Oca Provincia San José, 9° 56' 13" N, 84° 03' 01" W/Col. A. Solís/Junio 1984.

CHRYSOMELIDAE

EUMOLPINAE

EUMOLPINI

***Beltia herreri* Flowers, 2018.** *Insecta Mundi*, 0672, 1–43.

Holotipo: Macho, MNCR- A 427383.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, 1050m, Tierras Morenas, Zona Protectora Tenorio, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. A. Marín/Marzo 1992.

***Beltia osa* Flowers, 2018.** *Insecta Mundi*, 0672, 1–43.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1676555.

COSTA RICA, Rancho Quemado, Península de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. A. Gutiérrez/Enero 1992.

***Beltia sanchezae* Flowers, 2018.** *Insecta Mundi*, 0672, 1–43.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2375002.

COSTA RICA, Finca Cafrosa, Embalse, 800m NO. de Tigra, Provincia Puntarenas, 8° 54' 24.634" N, 82° 47' 31.164" W/Col. E. Navarro/Mayo 1996.

***Beltia tilarana* Flowers, 2018.** *Insecta Mundi*, 0672, 1–43.

Holotipo: Macho, MNCR- A 415041.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, 1050m, Tierras Morenas, Zona Protectora Tenorio, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. M. Segura/Marzo 1992.

***Beltia tisingalita* Flowers, 2018.** *Insecta Mundi*, 0672, 1–43.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 443070.

COSTA RICA, Estación Hitoy Cerere, 100m, Reserva Biológica Hitoy Cerere, Provincia Limón, 9° 40' 18.354" N, 83° 1' 39.726" W/Col. R. Guzmán/Abril 1992.

***Beltia vacilona* Flowers, 2018.** *Insecta Mundi*, 0672, 1–43.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137136.

COSTA RICA Estación Pitilla, 700m, 9 km sur Santa Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. K. Taylor/Marzo 1992.

***Brachypterodina gonzalezi* Flowers, 2004.** *Zootaxa*, 549, 1–18, 12–13.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 3316203.

COSTA RICA, Parque Internacional La Amistad, Refugio Valle Silencio, Provincia Limón, 9° 07' 14.200" N, -82° 57' 49.933" W/Col. R. González/Abril 2001.

***Brachypterodina morae* Flowers, 2004.** *Zootaxa*, 549, 1–18.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2378489.

COSTA RICA, Estación Cuerici, 4.6 Km al E. de Villa Mills, Provincia San José, 9° 33' 19.065" N, 83° 40' 13.116" W/Col. A. Maroto/Diciembre 1995.

***Cayetunya tifferrae* Flowers, 1997.** *The Coleopterists Bulletin*, 51 (4), 384–399.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1104850.

COSTA RICA, Parque Nacional Santa Rosa, Playa Naranjo, Liberia, Provincia Guanacaste, 10° 46' 32" N, 85° 39' 50" W/Col. W. Flowers y R. Tiffer/Junio 1991.

***Cryocolaspis crinita* Flowers, 2004.** *The Coleopterist Bulletin*, 58 (1), 97–101.

Holotipo: Macho, MNCR- A5137159.

COSTA RICA, Cerro de la Muerte, 19 km Sur y 3 km Oeste del Empalme, Provincia Cartago, 9° 39' 0" N, 83° 52' 0" W/Col. W. Flowers/Julio 1992.

***Prionodera esmeralda* Flowers, 2004.** *Zootaxa*, 6312, 1–54.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1769942.

COSTA RICA, Estación San Ramón Oeste, Provincia Alajuela, 10° 52' 59.762" N, 85° 24' 48.757" W/Col. C. Cano/Abril 1994.

***Thysanomeros ulateae* Flowers, 2003.** *Zootaxa*, 221, 1–11

Holotipo: Macho, MNCR- A 1738811.

COSTA RICA, Sector San Ramón, Provincia Alajuela, 10° 52' 59.762" N, 85° 24' 48.757" W/Col. D. García/Marzo 1994.

CHRYSOMELIDAE
GALERUCINAE
ALTICINI

***Alagoasa aurora* Duckett y Daza, 2004.** *The Coleopterist Bulletin*, 58 (1),–96.

Holotipo: Macho, MNCR- A 145300.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000-1400m, SW Volcán Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. R. Blanco y C. Chávez/Diciembre 1989.

CHRYSOMELIDAE
GALERUCINAE
LUPERINI

***Inbioluperus costipennis* Clark, 1993.** *Insecta Mundi*, 7 (4), 215–218.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137140.

COSTA RICA, Estación Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. GNP Biodiv/Mes indet 1989.

CLERIDAE
CLERINAE

***Aphelocerus argus* Opitz, 2005.** *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 293, 1–128.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1737961.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, Tierras Morenas, Tenorio Área Conservación Arenal, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. G. Rodríguez/Marzo 1994.

***Aphelocerus hespenheidei* Opitz, 2005.** *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 293, 1–128.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2287830

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 01' 0" W /Col. Alas Proyecto; OET -INBio /Octubre 1994.

***Enoclerus laselva* Rifkind, 2002.** *Contributions in Science* (487), 1–16.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2270972

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 01' 0" W/Col. OET INBio/Marzo 1993.

***Perilypus cartagoensis* Opitz, 2013.** *Insecta Mundi*, 0305, 1–28.

Holotipo: Macho, MNCR- A3240224

COSTA RICA, 11km SE de La Virgen Parque Nacional Braulio Carrillo, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 20' 0" N, 84° 4' 0" W/Col. D. Brenes/Abril 2003.

***Perilypus galenae* Opitz, 2013.** *Insecta Mundi*, 0305, 1–28.

Holotipo: Macho, MNCR- A 614798.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000-1400m, Lado SO Vol. Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. C. Chaves/Marzo 1991

***Perilypus iodus* Opitz, 2013.** *Insecta Mundi*, 0305, 1–28.

Holotipo: Macho, MNCR- A2372127

COSTA RICA, Estación Pittier, Sendero a Río Canasta, Provincia Puntarenas, 9° 2' 11.49" N, 82° 58' 5.274" W/Col. M. Moraga/Marzo 1996.

***Perilypus punctus* Opitz, 2013.** *Insecta Mundi*, 0305, 1–28.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 426611.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700 m, 9 km S Sta. Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. P. Ríos/Marzo 1992

CLERIDAE EPIPHLOEINAE

***Amboakis selva* Opitz, 2006.** *Insecta Mundi*, 20 (3-4), 97–163.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137812.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W /Col. OET- INBio/Marzo 1994.

***Epiphlaeus fundurufus* Opitz, 2008.** *Annales zoologici*, 58 (1), 1–34.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 2622913.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 02' 0" W /Col. OET- INBio/Agosto 1999.

***Madoniella cardinalis* Opitz, 2011.** *Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey*, 33, 133–248.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 2271006.

COSTA RICA: Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 01' 0" W/Col. OET- INBio/Fecha indet.

***Madoniella careorita* Opitz, 2011.** *Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey*, 33, 133–248.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2285720.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 01' 0" W/Col. Alas Proyecto/Fecha indet.

***Madoniella emblema* Opitz, 2011.** *Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey*, 33, 133–248.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 3240285.

COSTA RICA, 11km SE de La Virgen Parque Nacional Braulio Carrillo, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 20' 0" N, 84° 4' 0" W/Col. D. Brenes/Abril 2003.

***Madoniella orosiensis* Opitz, 2011.** *Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey*, 33, 133–248.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 686606.

COSTA RICA, Estación Maritza, 600 m, lado O Volcán Orosí, Provincia Guanacaste, 10° 57' 45.150" N, 85° 29' 42.878" W/Col. indet./Mes indet, 1988.

***Madoniella redacta* Opitz, 2011.** *Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey*, 33, 133–248.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5138129.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, 3 km S Puerto Viejo, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespeneide/Fecha indet.

***Madoniella taxis* Opitz, 2011.** *Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey*, 33, 133–248.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 5138128.

COSTA RICA, Turrialba, Prov. Cartago, 9° 54' 16" N, 83° 40' 12" W/Col. E. Ginter /Mes y Año indet.

***Megaphloeus bulatus* Opitz, 2014.** *Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno)*, 99 (2), 5–94.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2458079.

COSTA RICA, Estación Agujas, Provincia Puntarenas, 8° 32' 5.335" N, 83° 25' 36.001" W/Col. A. Azofeifa/Setiembre 1996.

***Plocamocera ambra* Opitz, 2004.** *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 280, 1–82.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2458081.

COSTA RICA, Estación Agujas. 300 m, Provincia Puntarenas, 8° 32' 5.335" N, 83° 25' 36.001" W/Col. A. Azofeifa/Setiembre 1996.

COCCINELLIDAE
SCYMNINAE
BRACHIACANTHINI

***Brachiacantha aurantiapleura* Néstor-Arriola, Toledo-Hernández y Solís, 2021.** *ZooKeys*, 1024, 157–196.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1962799.

COSTA RICA, San Luis, Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 16' 36.202" N, 84° 47' 47.831" W/Col. Z. Fuentes/Febrero 1994.

***Brachiacantha dentata*, Néstor-Arriola, Toledo-Hernández y Solís, 2021.** *ZooKeys*, 1024, 157–196.

Holotipo: Macho, MNCR- A 443660.

COSTA RICA, Tierras Morenas, Bajo Los Cartagos, Río San Lorenzo, Zona Protectora Tenorio, Área Conservación Arenal, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. C. Alvarado/Abril 1991.

***Brachiacantha hexaspina* Néstor-Arriola, Toledo-Hernández & Solís, 2021.** *ZooKeys*, 1024, 157–196.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3772402.

COSTA RICA, Reserva Biológica Hitoy Cerere, Valle La Estrella Sendero Espavel, Provincia Limón, 9° 39' 41.176" N, 83° 1' 50.552" W/Col. E. Rojas/Setiembre 2003.

***Brachiacantha invertita* Néstor-Arriola, Toledo-Hernández y Solís, 2021.** *ZooKeys*, 1024, 157–196.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1894315.

COSTA RICA, Buen Amigo, San Luis Monteverde, Área Conservación Arenal, Provincia Puntarenas, 10° 16' 36.202" N, 84° 47' 47.831" W/Col. Z. Fuentes/Mayo 1994.

***Brachiacantha nubes* Néstor-Arriola, Toledo-Hernández & Solís, 2021.** *ZooKeys*, 1024, 157–196.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2329678.

COSTA RICA, Estación Santa Elena, Viejo, Santa Elena, Las Nubes, Provincia San José, 9° 23' 44.525" N, 83° 35' 44.346" W/Col. E. Alfaro/Octubre 1995.

***Brachiacantha tica* Néstor-Arriola, Toledo-Hernández y Solís, 2021.** *ZooKeys*, 1024, 157–196.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 967046.

COSTA RICA, Rancho Quemado, 200m, Península de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. A. Marín/Setiembre 1992.

CURCULIONIDAE**BARIDINAE****AMBATINI**

***Ambates fasciger*, Prena, 2003.** *Contributions to Entomology* 53 (1), 167–198.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3476599.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 01' 0" W/Col. OET INBio/Abril 1996.

***Ambates neglectus* Prena, 2003.** *Contributions to Entomology*, 53 (1), 167–198.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 2369423.

COSTA RICA, Tajo Albergue Cerro de Oro, Provincia Puntarenas, 8° 33' 46.359" N, 83° 29' 56.662" W/Col. L. Angulo/Enero 1996.

***Embates aequiperabilis* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 775821.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, 1050m, Tierras Morenas, Zona Protectora Tenorio, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. M Segura/Marzo-Abril 1992.

***Embates aliquantulus* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2234505.

COSTA RICA, Cerro de Oro, Río Nino, Provincia Puntarenas, 8° 33' 34.957" N, -83° 29' 38.681" W/Col. A. Azofeifa/Mayo 1995.

***Embates callifer* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 422773

COSTA RICA, Río San Lorenzo, 1050m, Tierras Morenas, Zona Protectora Tenorio, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. M. Segura/Abril 1992.

***Embates cordiger* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 566428.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocori, Finca de E. Rojas, 150 m, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Noviembre 1991.

***Embates chelys*, Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 688348.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocorí, Finca de E. Rojas, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Abril 1991.

***Embates clandestinus* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 3230183.

COSTA RICA, 10 Km SE de La Virgen, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 20' 0" N, 84° 4' 0" W/Col. J. Prena/Abril 2003.

***Embates crinipes* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137789.

COSTA RICA, Zona Protectora Las Tablas, Cerro Chai, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 10° 26' 0" N, 84° 01' 0" W/Col. M. Alfaro/Mayo 2002.

***Embates discordabilis* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3230077.

COSTA RICA, 10km SE La Virgen, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 20' 0" N, 84° 4' 0" W/Col. J. Prena/Abril 2003.

***Embates euchasma* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3053835

COSTA RICA, San Ramón, Estación Reserva Biológica Alberto Brenes, Río San Lorencito, Provincia Alajuela, 10° 13' 42.872" N, 84° 35' 59.471" W/Col. J. Rodríguez/Marzo 1999.

***Embates euscheme* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3476599.

COSTA RICA, Tajo/ Zurquí, entrando por San Luis, Provincia Heredia, 10° 02' 37.175" N -84° 01' 26.414" W/Col. R. González/Abril 2002.

***Embates galbinus* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3230241.

COSTA RICA, 6km de Vara Blanca, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 10' 34" N, 84° 6' 41" W/Col. J. Prena/Febrero 2003.

***Embates gracilis* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137790.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 01' 0" W/Col. J. Prena/Abril 2001.

***Embates leucopleura discolor* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 172975

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700m, 9 km S Santa Cecilia, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. P. Ríos, C. Moraga y R. Blanco/Setiembre 2003.

***Embates maculifer* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 1206066.

COSTA RICA, Quebrada Segunda, Parque Nacional Tapantí, 1250 m, Provincia Cartago, 9° 45' 45.289" N, 83° 47' 11.419" W/Col. G. Mora/Mayo 1993.

***Embates marchionis* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1786208.

COSTA RICA, Sector Cocorí, 30 Km N. de Cariari, Finca E. Rojas, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Abril 1994.

***Embates mendax* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2338075.

COSTA RICA, Estación Pittier, Provincia Puntarenas, 9° 1' 32.390" N, 9° 1' 32.390" N/Col. A. Picado/Junio 1995.

***Embates oculifer* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137791.

COSTA RICA, Cerro Chucuyo, 12 km Noreste de San Isidro, Pere Zeledón, Provincia San José, 9° 26' 15" N, 83° 36' 55" W/Col. J. Prena/Marzo 2000.

***Embates paludícola* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137792.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 01' 0" W/Col. J. Prena/Abril 2001.

***Embates paucilimbatus* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2207591.

COSTA RICA: Sector San Ramón de Dos Ríos, Provincia Alajuela, 10° 52' 59.762" N, 85° 24' 48.757" W/Col. C. Cano/Abril-Mayo 1995.

***Embates pauhans* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3162539.

COSTA RICA, Estación Zurquí, 500 m antes del Túnel, Provincia San José, 10° 3' 27" N, 84° 0' 44" W/Col. G. Maass/Octubre 1990-Abril 1991.

***Embates peperomiae* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137793.

COSTA RICA, 6 km Noreste de Vara Blanca, Provincia Heredia, 10° 11' 0" N, 84° 7' 0" W/Col. OET-INBio/Marzo 2000.

***Embates polymorphus altrimsecus*, Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3209943.

COSTA RICA, Tajo/ Zurquí, entrando por San Luis, Provincia Heredia, 10° 16' 9.395" N, 84° 5' 9.408" W/Col. J. Prena/Octubre 2001.

***Embates polymorphus dotencis*, Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137794.

COSTA RICA, San Gerardo de Dota, Dota, Provincia San José, 9° 32' 13.844" N, - 83° 49' 27.248" W/Col. J. Prena/Marzo 2003.

***Embates polymorphus tabulensis*, Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3484605.

COSTA RICA, Coto Brus, Zona Protectora Las Tablas, Cerro Chai, Provincia Puntarenas, 8° 57' 50.027" N, -82° 49' 44.894" W/Col. M. Alfaro/Mayo 2002.

***Embates polymorphus zeledonensis*, Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100: 1-151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2400691.

COSTA RICA, Finca El Gringo, Estación Las Nubes de Santa Elena, San Pedro, Provincia Puntarenas, 9° 23' 10.340" N, -83° 35' 09.939" W/Col. M. Segura/Marzo 1996.

***Embates pseudobumbraticus* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3229812.

COSTA RICA, 10km SE La Virgen, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 20' 0" N, 84° 4' 0" W/Col. J. Prena/ Febrero 2003.

***Embates pullus* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 114108

COSTA RICA, Sirena, Parque Nacional Corcovado, Provincia Puntarenas, 8° 28' 48.617" N, 83° 35' 28.641" W/Col. G. Fonseca/Noviembre 1989.

***Embates rutilus* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1188027.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 9 km S. Santa Cecilia, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. P. Ríos/Febrero-Marzo 1993.

***Embates sagittifolicus* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2147000.

COSTA RICA, Fila Madre, 3 Km SO de Cerro Rincón, Provincia Puntarenas, 8° 30' 09.863" N, -83° 29' 06.082" W/Col. A. Azofeifa/Mayo 1995.

***Embates scambus* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1964066.

COSTA RICA, Parque Nacional Tapantí, Río Dos Amigos, Área de Conservación La Amistad, Provincia Cartago, 9° 43' 18.81" N, 83° 47' 5.114" W/Col. G. Mora, A. Solís y E. Ulate/Marzo 1994.

***Embates subulirostris*, Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137795.

COSTA RICA, 6 km Noreste de Vara Blanca, Provincia Heredia, 8° 47' 03" N, 82° 57' 36" W/Col. R. González/Marzo 2000.

***Embates terrabanicus* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 822531.

COSTA RICA, Rancho Quemado, 200m, Península de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. F. Quesada/Diciembre 1992.

***Embates todillofasciatus* Prena, 2005.** *Zootaxa*, 1100, 1–151.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3025806.

COSTA RICA, Reserva Biológica Alberto Brenes, Río San Lorencito, San Ramón, Provincia Alajuela, 10° 13' 42.872" N, 84° 35' 59.471" W/Col. R. Zuñiga/Marzo 1999.

CURCULIONIDAE

BARIDINAE

APOSTASIMERINI

***Cylindridia fuscipes* Prena, 2006.** *Beiträge zur entomologie*, 56–1.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2565388.

COSTA RICA, Río Macho, Estación Ojo de Agua, Alrededor de la Estación, Provincia San José, 9° 37' 13.300" N, -83° 49' 30.657" W/Col. R. Gamboa/Abril 1997.

***Cylindridia rubripes* Prena, 2006.** *Beiträge zur entomologie*, 56–1.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3230282.

COSTA RICA, 6km ENE de Vara Blanca, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 10' 34" N, 84° 6' 41" W/Col. R. Vargas/Abril 2004.

CURCULIONIDAE

BARIDINAE

BARIDINI

***Pardisomus albescens* Prena, 2003.** *Beiträge zur entomologie*, 53(1), 199–216.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2496266.

COSTA RICA, Fila Cruces, Estación de los Atunes, Finca Fabio Sandoval, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 8° 48' 02.212" N, -83° 01' 13.422" W/Col. I. Chacón/Mayo 1996.

***Pardisomus amotus* Prena, 2003.** *Beiträge zur entomologie*, 53 (1), 199–216.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1346673.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocori, Finca de E. Rojas, 150m, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Abril 1993

***Pardisomus byrrus* Prena, 2003.** *Beiträge zur entomologie*, 53(1), 199–216.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1044476.

COSTA RICA, Rancho Quemado, Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. A. Solís/Mayo 1988.

***Pardisomus suffuscus* Prena, 2003.** *Beiträge zur entomologie*, 53(1), 199–216.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3209930.

COSTA RICA, Sarapiquí, Parque Nacional Braulio Carrillo, 16Km S.S.E. de La Virgen, Provincia Heredia, 10° 16' 9.395" N, - 84° 5' 9.408" W/Col. J. Prena/Mayo 1996.

***Thanius biennis* Prena y Nishida, 2005.** *Beiträge zur entomologie*, 55 (1), 141–150.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137800.

COSTA RICA, Montes de Oca, San Pedro, Campus Universidad de Costa Rica, Provincia San José, 9° 56' 21.246" N, 84° 3' 15.457" W/Col. K. Nishida/Febrero 2003.

CURCULIONIDAE

BARIDINAE

OPTATINI

***Floromadane atrorubens* Prena, 2009.** *Beiträge zur entomologie*, 59 (1), 239–246.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1694105.

COSTA RICA, Estación La Casona, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 17' 54.343" N, 84° 47' 33.158" W/Col. N. Obando/Junio 1991.

***Floromadane pictulus* Prena, 2009.** *Beiträge zur entomologie*, 59 (1) 239–246.

Holotipo: Hembra, MNCR- A3230207.

COSTA RICA, 11km SE La Virgen, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 20' 0" N, 84° 4' 0" W/Col. J. Prena/Abril 2003.

CURCULIONIDAE

BARIDINAE

PERIDINETINI

***Peridinetus imperialis* Prena, 2010.** *Zootaxa*, 2507, 1–36.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 3230216.

COSTA RICA, 11km SE La Virgen, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 20' 0" N, 84° 4' 0" W/Col. J. Prena/Abril 2003.

***Peridinetus lugubris* Prena, 2010.** *Zootaxa*, 2507, 1–36.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 2228252.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. ALAS-INBio-OET/ Nishida/Enero 2000.

***Peridinetus notabilis* Prena, 2010.** *Zootaxa*, 2507, 1–36.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 1207689.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700 m, 9 km S Santa Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. C. Moraga/Enero 1993.

***Peridinetus pena* Prena, 2010.** *Zootaxa*, 2507, 1–36.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A630350.

COSTA RICA, Estación Cuatro Esquinas, 0m, Parque Nacional Tortuguero, Provincia Limón, 10° 32' 22.377" N, 83° 30' 23.331" W/Col. R. Delgado/Octubre 1991.

***Peridinetus rubens* Prena, 2010.** *Zootaxa*, 2507, 1–36.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 1188028.

COSTA RICA Estación Pitilla, 9 km S. Santa Cecilia, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. P. Ríos/Febrero-Marzo 1993.

***Peridinetus wyandoti* Prena, 2010.** *Zootaxa*, 2507, 1–36.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 3659942.

COSTA RICA, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespenheide/Fecha indet.

**CURCULIONIDAE
CONODERINAE
ZIGOPINI**

***Archocopturus* Hespenheide, 2005.** *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 107, 671–85.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3665799.

COSTA RICA, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespenheide/Abril 1983.

***Archocopturus medeterae* Hespenheide, 2005.** *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 107, 671–85.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3671232.

COSTA RICA, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespenheide/Junio 1996.

***Archocopturus minutus*, Hespenheide, 2005.** *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 107, 671–85.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2267368.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 01' 0" W/Col. INBio-OET-ALAS/Mayo 1993.

***Copturomimus hoguei* Hespenheide, 2009.** *The Coleopterists Bulletin*, 63 (3), 333–339.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 3795972.

COSTA RICA: Bahía Wafer, Isla del Coco, Provincia Puntarenas, 5° 32' 45" N, 87° 3' 30" W/Col. Y. Camacho/Junio 1994.

***Hoplocopturus sherrywernerorum* Hespenheide, 2009.** *The Coleopterists Bulletin*, 63 (3), 333–339.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 3795971.

COSTA RICA, Bahía Wafer, Isla del Coco, Provincia Puntarenas, 5° 32' 45" N, 87° 3' 30" W/Col. Y. Camacho/Junio 1994.

***Lissoderes longinoi*, Hespenheide, 2007.** *The Coleopterists Bulletin*, 61 (4), 604–110.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 3659269.

COSTA RICA, 9 km NE Vara Blanca, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 13' 59.988" N, 84° 4' 59.988" W/Col. INBio-OET-ALAS/Febrero 2005.

**CURCULIONIDAE
CURCULIONINAE
DERELOMINI**

***Systemotelus carludovicae* Anderson y Gómez, 1997.** *Revista Biología Tropical*, 45 (2), 887–904.
Holotipo: Macho, MNCR- A 5137798.
COSTA RICA, Las Cruces, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 8° 47' 3" N, 82° 57' 36" W/Col. L. Gómez/Enero 1994.

***Systemotelus costaricensis* Anderson y Gómez, 1997.** *Revista Biología Tropical*, 45 (2), 887–904.
Holotipo: Macho, MNCR- A 360454.
COSTA RICA, Refugio Nacional Fauna Silvestre Tapantí, 1250m, Provincia Cartago, 9° 45' 45.3" N, 83° 47' 17.981" W/Col. G. Mora/Agosto 1991.

CURCULIONIDAE
BARIDINAE
PANTOTELINI

***Pantoteles absconditus* Prena, 2001.** *Transactions of the American Entomological Society*, 127 (3), 305–358.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1352969.
COSTA RICA, Cerro Tortuguero, 0-120 m, Parque Nacional Tortuguero, Provincia Limón, 10° 35' 5.333" N, 83° 31' 45.139" W/Col. R. Delgado/Marzo 1993.

***Pantoteles grandulus* Prena, 2001.** *Transactions of the American Entomological Society*, 127 (3), 305–358.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2306640.
COSTA RICA, Estación Pittier, Sendero a Río Canasta, 1.4 Km NNO. de la Estación, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 9° 2' 11.49" N, 82° 58' 5.274" W/Col. L. Angulo/Junio 1995.

***Pantoteles sepositus* Prena, 2001.** *Transactions of the American Entomological Society*, 127 (3), 305–358.

Holotipo: Macho, MNCR- A 986949.
COSTA RICA, Estación Quebrada Bonita, 50m, Reserva Biológica Carara, Provincia Puntarenas, 9° 46' 02.829" N, 84° 36' 29.227" W/Col. R. Guzmán/Setiembre 1992.

***Pantoteles trimaculatus* Prena, 2001.** *Transactions of the American Entomological Society*, 127 (3), 305–358.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137797.
COSTA RICA, Parque Nacional Braulio Carrillo, Sarapiquí, Provincia Heredia, Estación Santa Elena, Pérez Zeledón, Provincia San José, 10° 18' 51" N, 84° 4' 30" W/Col. J. Prena/Marzo 2000.

CURCULIONIDAE
BARIDINAE
PERIDINETINI

***Palliolatrix tuberosa* Prena, 2006.** *Zootaxa*, 1319, 15–28.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3165466.
COSTA RICA, Estación Santa Elena, Pérez Zeledón, Provincia San José, 9° 24' 25.216" N, -83° 35' 54.171" W/Col. J. Rodríguez/Agosto- Setiembre 1999.

CURCULIONIDAE
CURCULIONINAE
TYCHINI

***Lignyodes ripleyi* Anderson, 1999.** *The Coleopterists Bulletin*, 53 (2), 183–185.

Holotipo: Macho, MNCR- A 40809.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000-1400m, suroeste del Volcán Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. GNP Biodiv./Mes indet, 1988-1989.

CURCULIONIDAE
CURCULIONIDAE
ENTIMINI

***Coconotus kuscheli* Anderson y Lanteri, 2000.** *American Museum Novitates*, 3299, 1–15, 12.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1851721.

COSTA RICA, Bahía Chatham, Parque Nacional Isla del Coco, Provincia Puntarenas, 5° 32' 40.00" N, -87° 03' 20.00" W/Col. J. Quesada/Febrero 1993.

***Coconotus tuberculatus* Anderson y Lanteri, 2000.** *American Museum Novitates*, 3299, 1–15, 14.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 2544745.

COSTA RICA, Parque Nacional Isla del Coco. Bahía Wafer, Provincia Puntarenas, 5° 32' 45" N, 87° 3' 30" W/Col. J. Quesada/Octubre 1994.

***Coconotus williamsi* Anderson y Lanteri, 2000.** *American Museum Novitates*, 3299, 1–15, 15.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2544747.

COSTA RICA, Parque Nacional Isla del Coco. Bahía Wafer, Provincia Puntarenas, 5° 32' 45" N, 87° 3' 30" W/Col. J. Quesada/Octubre 1994.

CURCULIONIDAE
MOLYTINAE
CLEOGONINI

***Cleogonus eldarayae* Prena y Whitehead, 2012.** *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 59(1), 55–79

Holotipo: Macho, MNCR- A 564837.

COSTA RICA, Finca Jenny, 30 km N de Liberia, Parque Nacional Guanacaste, 10° 51' 55.826" N, 85° 34' 24.74" W/Col. E. Araya/Abril-Mayo 1991.

***Conotrachelus terryerwini* Anderson, 2021.** *Zookeys*, 1044 721–727.

Holotipo: Macho, MNCR- A 504110.

COSTA RICA, Estación Maritza, 600 m, lado O Volcán Orosí Provincia Guanacaste, 10° 57' 45.150" N, 85° 29' 42.878" W/Col. F. Quesada/Febrero- Marzo 1992.

CURCULIONIDAE
CONODERINAE
LECHRIOPINI

***Pseudolechriops alleni* Hespenheide y LaPierre, 2006.** *Zootaxa*, 1384, 1–39.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4368223.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. L. LaPierre/Mayo 2002.

***Pseudolechriops coleyae* Hespenheide y LaPierre, 2006.** *Zootaxa*, 1384, 1–39.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4368217.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespenheide/Abril 1980.

***Pseudolechriops davidsonae* Hespenheide y LaPierre, 2006.** *Zootaxa*, 1384, 1–39.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4368219.

COSTA RICA, Valle San Luis, Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 15' 37.385" N, -84° 50' 17.266" W/ Col. L. La Pierre/Agosto 1996.

***Pseudolechriops howdenorum* Hespenheide y LaPierre, 2006.** *Zootaxa*, 1384, 1–39.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4368216.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W /Col. L. La Pierre/Agosto 1996.

***Pseudolechriops janeae* Hespenheide y LaPierre, 2006.** *Zootaxa*, 1384, 1–39.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4368221.

COSTA RICA, San Luis, Zona Protectora Arenal-Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 15' 00.000" N, -84° 45' 00.000" W/Col. L. LaPierre/Setiembre 1999.

***Pseudolechriops kloferi* Hespenheide y LaPierre, 2006.** *Zootaxa*, 1384, 1–39.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4368213.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Puerto Viejo, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespenheide/Julio 1982.

***Pseudolechriops longinoi* Hespenheide y LaPierre, 2006.** *Zootaxa*, 1384, 1–39.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4368211.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Puerto Viejo, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. H. Hespenheide/Julio 1996.

***Pseudolechriops wrightae* Hespenheide y LaPierre, 2006.** *Zootaxa*, 1384, 1–39.

Holotipo: Hembra MNCR- A 4368224.

COSTA RICA, Boca Tapada, San Carlos, Provincia Alajuela, 10° 38' 00.000" N, -84° 14' 00.000" W/Col. L. LaPierre/Mayo 2000.

CURCULIONIDAE
CRYPTORHYNCHINAE
CRYPTORHYNCHINI

***Ptous liebermanorum* Hespenheide y LaPierre, 2002.** *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 104, 856–862.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3220574.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 1' 0" W/Col. L. La Pierre/Noviembre 1998.

CURCULIONIDAE
DRYOPHTHORINAE
RHYNCHOPHORINI

***Eucalandra alas* Anderson, 2008.** *Zootaxa*, 1791, 57–67.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3201036.

COSTA RICA, 16 km SSE La Virgen 1050-1150m, Provincia Heredia, 10° 16' 9.395" N, 84° 5' 9.408" W/Col. D. Brenes/Marzo 2001.

DISTENIIDAE
DISTENIINAE
DISTENIINI

Cometes morrissi Hovore y Santos-Silva, 2007. *Papéis Avulsos de Zoología*, 47 (5), 75–96.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3861440.

COSTA RICA, Parque Nacional Carara, Laguna Meandrica, Provincia Puntarenas, 9° 47' 50.000" N, -84° 35' 40.000" W/Col. W. Porras/Julio 2004.

Cometes solisi Hovore y Santos-Silva, 2007. *Papéis Avulsos de Zoología*, 47 (5), 75–96.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 1804059.

COSTA RICA, La Purruja, Fila Matajambre Osa, Provincia Puntarenas, 8° 32' 19.939" N, -83° 25' 17.124" W/Col. M. Zumbado/Mayo 1994.

Distenia peninsularis Santos -Silva y Hovore, 2008. *Les Cahiers Magellanes*, 81, 1–16.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3504789.

COSTA RICA, Osa, Sierpe, Bosque Esquinas, Sector Orer, Provincia Puntarenas, 8° 46' 07.870" N, -83° 15' 24.339" W/Col. J. Quesada/Marzo 1996.

DRYOPHTHORIDAE
ORTHOGNATHINAE
ORTHOGNATHINI

Mesocordylus redelmeieri Anderson, 2002. *Zootaxa*, 80, 1–94.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1998040.

COSTA RICA, Estación Pitilla 9 Km S. Santa Cecilia, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. C. Moraga/Octubre 1994.

DRYOPHTHORIDAE
RHYNCHOPHORINAE
SPHENOPHORINI

Cactophagus lineatus Anderson, 2002. *Zootaxa*, 80, 1–94.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2466110.

COSTA RICA, Estación Santa Elena Provincia San José, 9° 23' 36.383" N, -83° 35' 21.405" W/Col. M. Segura/Febrero 1996.

Cactophagus lingorum Anderson, 2002. *Zootaxa*, 80, 1–94.

Holotipo: Macho, MNCR- A 502152.

COSTA RICA, Estación La Casona, 1520 m, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 17' 54.343" N, 84° 47' 33.158" W/Col. N. Obando/Octubre 1991.

Metamasius atwoodi Anderson, 2002. *Zootaxa*, 80, 1–94.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2544733.

COSTA RICA, Parque Nacional Isla del Coco, Bahía Wafer, Provincia Puntarenas, 5° 32' 45" N, 87° 3' 30" W/ Col. J. Quesada/Octubre 1994.

Metamasius burcheri Anderson, 2002. *Zootaxa*, 80, 1–94.

Holotipo: Macho, MNCR- A 803527.

COSTA RICA, Quebrada Segunda, Parque Nacional Tapantí, 1250 m, Provincia Cartago, 9° 45' 45.3" N, 83° 47' 17.981" W /Col. G. Mora/Agosto 1992.

Metamasius hooveri Anderson, 2002. *Zootaxa*, 80, 1–94.

Holotipo: Macho, MNCR- A 867699.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocorí, Finca de E. Rojas, 150 M, Provincia Limón, 0° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. F. Quesada/Marzo 1993.

***Metamasius leopardinus* Anderson, 2002.** *Zootaxa*, 80, 1–94.

Holotipo: Macho, MNCR- A 867699.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, 1050 m, Tierras Morenas, Zona Protegida Tenorio, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. F. Quesada/Abril 1992.

***Metamasius richdeboeri* Anderson, 2002.** *Zootaxa*, 80, 1–94.

Holotipo: Macho, MNCR- A 864097.

COSTA RICA, Rancho Quemado, 200 m, Península de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. F. Quesada/Marzo 1992.

***Metamasius wolfensohni* Anderson, 2002.** *Zootaxa*, 80, 1–94.

Holotipo: Macho, MNCR- A 549111.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700 m, 9 km S Santa Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. C. Moraga/Mayo 1996.

DRYOPHTHORIDAE
RHYNCHOPHORINAE
SPHENOPHORINI

***Rhodobaenus labrecheae* Anderson, 2002.** *Zootaxa*, 80, 1–94.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2447812.

COSTA RICA: Fila Cruces, Laguna Gamboa., Provincia Puntarenas, 8° 47' 03.396" N, -82° 59' 10.821" W/Col. I. Chacón/Abril 1996.

***Rhodobaenus patriciae* Anderson, 2002.** *Zootaxa*, 80, 1–94

Holotipo: Hembra, MNCR- A 113978.

COSTA RICA, Parque Nacional Corcovado, Sirena, Provincia Puntarenas, 8° 28' 48.617" N, 83° 35' 28.641" W/Col. G. Fonseca/Noviembre 1989.

***Rhodobaenus tenorio* Anderson, 2002.** *Zootaxa*, 80, 1–4

Holotipo: Hembra, MNCR- A 3307215.

COSTA RICA, Bratsi, Refugio Valle del Silencio, Provincia Limón, 9° 07' 14.197" N, -82° 57' 49.955" W/Col. T. González/Abril 2001.

DYTISCIDAE
COLYMBETINAE
AGABINI

***Rhantus bohlei* Balke, Roughley, Sondermann y Spangler, 2002.** *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, 37(3), 263–271.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3550715.

COSTA RICA, Ruta 2 Interamericana, camino KM 68, Dota, Provincia San José, 9° 39' 05.000" N, -83° 51' 00.000" W/Col. R. Roughley/Julio 1998.

ELATERIDAE
AGRYPNINAE
PLATYCREPIDIINI

***Platycrepidius alajuelensis* Johnson, 2000.** *The Coleopterists Bulletin*, 54 (3), 284–290.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2146015.

COSTA RICA, Sector San Ramón de Dos Ríos, Provincia Alajuela, 10° 52' 59.762" N, 85° 24' 48.757" W/Col. C. Cano/Abril- Mayo 1995.

***Platycrepidius bosque* Johnson, 2000.** *The Coleopterists Bulletin*, 54 (3), 284–290.

Holotipo: Macho, MNCR- A 159437.

COSTA RICA, Río San Lorencito, 900m Reserva Forestal San Ramón, 5 km N Col. Palmareña, Provincia Alajuela, 10° 13' 36" N, 84° 37' 57" W/Col. Curso Carabidae/Marzo 1990.

***Platycrepidius costaricensis* Johnson, 2000.** *The Coleopterists Bulletin*, 54 (3), 284–290.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2175694.

COSTA RICA, Sector San Ramón de Dos Ríos, Provincia Alajuela, 10° 52' 59.762" N, 85° 24' 48.757" W/Col. C. Cano/Febrero-Marzo 1995.

***Platycrepidius decimnotatus* Johnson, 2000.** *The Coleopterists Bulletin*, 54 (3), 284–290.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1405261.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocori, Finca de E. Rojas, 150m, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Roja/Febrero 1993.

***Platycrepidius duodecimnotatus* Johnson, 2000.** *The Coleopterists Bulletin*, 54 (3), 284–290.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1973218.

COSTA RICA, Sector Cocorí, 30 km al Norte de Cariari, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas y A. Solís/Febrero 1994.

***Platycrepidius monteverde* Johnson, 2000.** *The Coleopterists Bulletin*, 54 (3), 284–290.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 1694153.

COSTA RICA, Estación La Casona, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 17' 54.343" N, 84° 47' 33.158" W/Col. N. Obando/Junio 1991.

***Platycrepidius tico* Johnson, 2000.** *The Coleopterists Bulletin*, 54 (3), 284–290.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1776358.

COSTA RICA, Estación San Ramón Oeste, Provincia Alajuela, 10° 52' 59.762" N, 85° 24' 48.757" W/Col. F. Quesada/Abril 1994.

**ELATERIDAE
LISSOMINAE
SEMIOTINI**

***Semiotus lacrimiformis* Wells, 2007.** *Contributions in Science*, 514, 1–114.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2137716.

COSTA RICA, Buen Amigo, San Luis, Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 16' 36.202" N, 84° 47' 47.831" W/Col. Z. Fuentes/Marzo 1995.

***Semiotus pallicornus* Wells, 2007.** *Contributions in Science*, 514, 1–114.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1202803.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, 1050 m, Tierras Morenas, Zona Protectora Tenorio, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. G. Rodríguez/Abril 1993.

***Semiotus spinosus* Wells, 2007.** *Contributions in Science* 514, 1–114.

Holotipo: Macho, MNCR- A 619463.

COSTA RICA, Estación Biológica Las Alturas 1500 m, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 8° 56' 58" N, 82° 50' 11.176" W/Col. M. Ramírez/Setiembre 1991.

***Semiotus triplehorni* Wells, 2007.** *Contributions in Science*, 514, 1–114.

Holotipo: Macho, MNCR- A 773040.

COSTA RICA, Estación Sirena, 0-100m, Parque Nacional Corcovado, Provincia Puntarenas, 8° 28' 48.617" N, 83° 35' 28.641" W/Col. Z. Fuentes/Marzo-Abril 1992.

***Semiotus woodi* Wells, 2007.** *Contributions to Science*, 514, 1–114.

Holotipo: Macho, MNCR- A1776357.

COSTA RICA, Estación San Ramón Oeste, Provincia Alajuela, 10° 52' 59.762" N, 85° 24' 48.757" W/Col. F. Quesada/Abril 1994.

GEOTRUPIDAE
BOLBOCERATINAE
ATHYREINI

***Athyreus gulesseriani*, Kohlmann y Solís, 2012.** *Zootaxa*, 3193, 28–52.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3147654.

COSTA RICA: Estación Hitoy Cerere, Sendero Espavel, Provincia Limón, 9° 39' 50.918" N, 83° 1' 37.415" W/Col. W. Arana/Junio 2000.

***Neoathyreus tortuguensis* Howden y Solís, 1995.** *The Coleopterists Bulletin*, 49 (3), 261–266.

Holotipo: Macho, MNCR- A 812082.

COSTA RICA, Cerro Tortuguero, Parque Nacional Tortuguero, Provincia Limón, 10° 35' 5.333" N, 83° 31' 45.139" W/Col. R. Delgado/Diciembre 1992.

GEOTRUPIDAE.
BOLBOCERATINAE
BOLBOCERATINI

***Bolbelasmus carinifrons* Hodwen y Solís, 1995.** *The Coleopterists Bulletin*, 49 (3), 261–266.

Holotipo: Macho, MNCR- A 907283.

COSTA RICA, Rancho Quemado, Osa, Sierpe, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. S. Segura/Setiembre 1992.

HISTERIDAE
HETAERIINAE

***Hippeutister solisi*, Caterino y Tishechkin, 2008.** *Zootaxa*, 1895, 39–52.

Holotipo: Macho, MNCR- A 911827.

COSTA RICA, Caño Negro, 20m, Refugio Nacional Vida Silvestre Caño Negro, Provincia Alajuela, 10° 53' 37.722" N, 84° 47' 19.85" W /Col. K. Quesada/Diciembre 1992.

HISTERIDAE
HISTERINAE
HISTERINI

***Hister guanacasteb* Caterino, 2004.** *Zootaxa*, 601, 1–16.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 1213387.

COSTA RICA, Estación Palo Verde, 10 m, Parque Nacional Palo Verde, Provincia Guanacaste, 10° 20' 56.828" N, 85° 21' 8.441" W/Col. U. Chavarría/Mayo 1992.

***Hister janzeni* Caterino, 1999.** *University of California Publication in Entomology*, 119, 1–75.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 707852.

COSTA RICA, Estación Quebrada Bonita, 50 m, Reserva Biológica Carara, Provincia Puntarenas, 9° 46' 02.829" N, 84° 36' 29.227" W/Col. J. Saborío/Junio 1992.

HISTERIDAE
HISTERINAE
EXOSTERNINI

***Baconia applanatis* Caterino y Tishechkin, 2013. *Zookeys*, 343, 1–297.**

Holotipo: Hembra, MNCR- A 427988.

COSTA RICA, Estación Santa Rosa, 300m, Parque Nacional Santa Rosa, Provincia Guanacaste, 10° 50' 11.075" N, 85° 36' 55.768" W/Col. Curso Parataxónomo/Junio 1992.

***Baconia atricolor* Caterino y Tishechkin, 2013. *Zookeys* 343, 1–297.**

Holotipo: Macho, MNCR- A 492752.

COSTA RICA: Estación Santa Rosa, 300m, Parque Nacional Santa Rosa, Provincia Guanacaste, 10° 50' 11.075" N, 85° 36' 55.768" W/Col. Curso Parataxónomo/Junio 1992.

***Baconia opulenta* Caterino y Tishechkin, 2013. *Zookeys*, 343, 1–297.**

Holotipo: Hembra, MNCR- A 2170110.

COSTA RICA: Sardinas, Barra del Colorado, Provincia Limón, 10° 38' 51.526" N, 83° 43' 51.709" W/Col. F. Araya/Abril- Mayo 1995.

***Baconia sapphirina* Caterino y Tishechkin, 2013. *Zookeys*, 343, 1–297.**

Holotipo: Macho, MNCR- A 1189233.

COSTA RICA, Rancho Quemado, 200 m, Península de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. A. Gutiérrez/Mayo 1993.

***Operclipygus arquus* Caterino y Tishechkin, 2012. *Zookeys*, 271, 1–401.**

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137801.

COSTA RICA: Rincón de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 42' 0" N, 83° 29' 10" W/Col. J. Peck/Junio 2001.

***Operclipygus granulipectus* Caterino y Tishechkin, 2012. *Zookeys*, 271, 1–401.**

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137802.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 01' 0" W/Col. W. Bell/Febrero 1992.

***Operclipygus gratus* Caterino y Tishechkin, 2012. *Zookeys*, 271, 1–401.**

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137803.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva, Provincia Heredia, 10° 26' 0" N, 84° 01' 0" W/Col. W. Bell/Mayo 1993.

***Operclipygus limonensis* Caterino y Tishechkin, 2012. *Zookeys*, 271, 1–401.**

Holotipo: Macho, MNCR- A 1349337.

COSTA RICA: Sector Cerro Cocorí, Finca de E. Rojas, 150 m, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Mayo 1993.

***Operclipygus mangiferus*, Caterino y Tishechkin, 2012. *Zookeys*, 271, 1–401.**

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137804.

COSTA RICA, Liberia Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 38' 0" N, 85° 26' 0" W/Col. J. Ashe y A. Ashe/Mayo 1993.

***Operclipygus pacificus* Caterino y Tishechkin, 2012. *Zookeys*, 271, 1–401.**

Holotipo: Macho, MNCR- A 1659037.

COSTA RICA, Estación Quebrada Bonita, Provincia Puntarenas, 9° 46' 02.829" N, 84° 36' 29.227" W/Col. R. Guzmán/Setiembre 1993.

***Operclipygus pauperculus* Caterino y Tishechkin, 2012.** *Zookeys*, 271, 1–401.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2037795.

COSTA RICA, Estación Quebrada Bonita, Reserva Biológica Carara, Provincia Puntarenas, 9° 46' 27.240" N, 84° 36' 29.248" W/Col. R. Guzmán/Agosto 1994.

***Operclipygus punctissipygus* Caterino y Tishechkin, 2012.** *Zookeys*, 271, 1–401.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137805.

COSTA RICA, Estación Biológica La Selva. 3.2 km Sureste de Puerto Viejo, Provincia Heredia, 10° 26' N, 84° 1' W/Col. W. Bell/Febrero 1992.

***Operclipygus pustulifer* Caterino y Tishechkin, 2012.** *Zookeys*, 271, 1–401.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1828878.

COSTA RICA: Estación Pitilla, 9 km sur Santa Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. C. Moraga/Enero 1994.

HYBOSORIDAE CERATOCANTHINAE CERATOCANTHINI

***Astaenomoechus solisi* Howden y Gill, 2003.** *Sociobiology*, 42 (2), 201–242.

Holotipo: Macho, MNCR- A 30920.

COSTA RICA, Cerro Tortuguero, Parque Nacional Tortuguero, Provincia Limón, 10° 35' 5.333" N, 83° 31' 45.139" W/Col. J. Solano/Octubre 1989.

HYDRAENIDAE HYDRAENINAE HYDRAENINI

***Hydraena lascrucensis* Brojer y Jäch, 2011.** *Koleopterologische Rundschau*, 81, 69–92.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137806.

COSTA RICA, Estación Biológica Las Cruces, Provincia Puntarenas, 8° 47.14' N, 82° 57.58' W/Col. J. Ashe, S. Falin, I. Hinojosa/Mayo 2004.

***Hydraena pajarita* Brojer y Jäch, 2011.** *Koleopterologische Rundschau*, 81, 69–92.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5137807.

COSTA RICA, Rincón de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 41.141' N, 83° 31.117' W/Col. S. Peck/Junio 2001.

***Hydraena pilimera* Brojer y Jäch, 2011.** *Koleopterologische Rundschau*, 81, 69–92.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148215.

COSTA RICA, Parque Nacional Tapantí, Provincia Cartago, 9° 45' 0" N, 83° 47' 0" W/Col. A. Short/Enero 2005.

HYDROPHILIDAE HYDROPHILINAE ANACAENINI

***Anacaena hirsuta* Komarek, 2005.** *Koleopterologische Rundschau*, 75, 253–301.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148216.

COSTA RICA, Quebrada Segunda, Parque Nacional Tapantí, Provincia Cartago, 9° 45' 45" N, 83° 47' 18" W/Col. S. William/Junio 2003.

HYDROPHILIDAE
HYDROPHILINAE
HYDROPHILINI

***Chasmogenus barrae* Short, 2005.** *Koleopterologische Rundschau*, 75, 191–226.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1172193.

COSTA RICA, Estación Quebrada Bonita, Provincia Puntarenas, 9° 46' 02.829" N, 84° 36' 29.227" W/Col. R. Guzmán/Junio 1993.

***Chasmogenus lorenzo* Short, 2005.** *Koleopterologische Rundschau*, 75, 191–226.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148921.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, San Ramón, Provincia Alajuela, 10° 13' 39.6" N, 84° 34' 14.6" W/Col. A. Short/Junio 2003.

***Chasmogenus ruidus* Short, 2005.** *Koleopterologische Rundschau*, 75, 191–226.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3325401.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocorí, Finca de Elías Rojas, Área Conservación Tortuguero, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. K. Kjer/Setiembre 1993.

***Chasmogenus schoedli* Short, 2005.** *Koleopterologische Rundschau*, 75, 191–226.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1639090.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 9 km sur, Santa Cecilia, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. C. Moraga/Agosto 1993.

***Enochrus (Methydrus) metacarina* Short, 2005.** *Koleopterologische Rundschau*, 75, 191–226.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148217.

COSTA RICA, Laguna de Cocodrilo, Nandayure, Provincia Guanacaste, 10° 3' 31" N, 85° 14' 25.6" W/Col. A. Short, R. Roughley, W. Porras/Enero 2003.

***Enochrus (Methydrus) rivalis* Short, 2005.** *Koleopterologische Rundschau*, 75, 191–226.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148922.

COSTA RICA: Quebrada La Palma, Parque Nacional Barra Honda, Provincia Guanacaste, 10° 10' 0" N, 85° 22' 0" W/Col. A. Short y D. Lebbin/Enero 2004.

***Enochrus (Methydrus) shepardi* Short, 2005.** *Koleopterologische Rundschau*, 75, 191–226.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148218.

COSTA RICA, Río Cimarrones, Provincia Cartago, 9° 58' 30" N, 83° 27' 0" W/Col. W. Shepard/Noviembre 2002.

***Enochrus (Methydrus) talamanca* Short, 2005** *Zootaxa* 865, 1–7.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148219.

COSTA RICA, Parque Nacional. Tapantí, Provincia Cartago, 9° 45' 41" N, 83° 47' 13" W/Col. A. Short/Noviembre 2003.

***Enochrus (Methydrus) torito* Short, 2005.** *Koleopterologische Rundschau*, 75, 191–226.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148905.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, San Ramón, Provincia Alajuela, 10° 13.729' N, 84° 34.249' W/Col. A. Short y D. Lebbin/Enero 2004.

***Enochrus (Methydrus) toro* Short, 2005.** *Koleopterologische Rundschau*, 75, 191–226.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148220.

COSTA RICA, Catarata del Toro, 7 km N Bajos del Toro, Provincia Alajuela, 10° 15' 10" N, 84° 16' 21" W/ Col. A. Short y D. Lebbin/ Enero 2004.

***Helochares carmona* Short, 2005.** *Koleopterologische Rundschau*, 75, 191–226.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148221.

COSTA RICA, Laguna de Cocodrilo, Carmona, Provincia Guanacaste, 10° 3' 31" N, 85° 14' 25.6" W /Col. A. Short y R. Roughley/Enero 2003.

***Hydrobiomorpha naviga* Short, 2004.** *Koleopterologische Rundschau*, 74, 363–366.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3130092.

COSTA RICA, Estación Barbilla, Parque Nacional Barbilla, Provincia Cartago, 9° 58' 52.852" N, 83° 27' 15.331" W/Col. W. Arana/Febrero 2001.

***Oocylus catarata* Short y Perkins, 2004.** *Zootaxa*, 783, 1–45.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148906.

COSTA RICA, Poasito, Provincia Alajuela, 10° 7.314' N, 84° 9.812' W/Col. A. Short y D. Lebbin/Enero 2004.

***Oocylus funestus* Short y Perkins, 2004.** *Zootaxa*, 783, 1–45.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148222.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, Colonia Los Lagos, Provincia Alajuela, 10° 13' 39.6" N, 84° 34' 14.6" W/Col. A. Short y R. Roughley/Enero 2003.

***Oocylus grandis* Short y Perkins, 2004.** *Zootaxa*, 783, 1–45.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148223.

COSTA RICA, Catarata Río Carmona, Nandayure, Provincia Guanacaste, 10° 0' 42" N, 85° 15' 03" W/Col. A. Short, R. Rough, W Porras/Junio 2003.

***Oocylus muscus* Short y Perkins, 2004.** *Zootaxa*, 783, 1–45.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148907.

COSTA RICA, Parque Nacional Tapantí, Provincia Cartago, 9° 41.459' N, 83° 45.699' W/Col. A. Short y D. Lebbin/Enero 2004.

***Oocylus ornatus* Short y Perkins, 2004.** *Zootaxa*, 783, 1–45.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148916.

COSTA RICA, Parque Nacional Tapantí, Provincia Cartago, 9° 41.459' N, 83° 45.699' W/Col. A. Short y D. Lebbin/Enero 2004.

***Oocylus sharpi* Short y Perkins, 2004.** *Zootaxa*, 783, 1–45.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148224.

COSTA RICA, Cerro Azul, Nandayure, Provincia Guanacaste, 9° 57' 5.472" N, 85° 16' 31.32" W/Col. A. Short, R. Rough, W Porras/Enero 2003.

***Oocylus tapanti* Short y Perkins, 2004.** *Zootaxa*, 783, 1–45.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148917.

COSTA RICA, Parque Nacional Tapantí, Provincia Cartago, 9° 44' 0" N, 83° 47' 0" W/Col. A. Short y D. Lebbin/Enero 2004.

HYDROPHYLIDAE SPHAERIDIINAE

COELOSTOMATINI

***Badioglobus tapanti* Short, 2005.** *The Coleopterists Bulletin*, 58 (4), 534–537.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1206239.

COSTA RICA, Quebrada Segunda, Parque Nacional Tapantí, 1250 m, Provincia Cartago, 9° 45' 45.289" N, 83° 47' 11.419" W/Col. G. Mora/Mayo 1993.

HYDROPHYLIDAE

SHAERIDIINAE

MEGASTERINI

***Oosternum cicatricosum* Fikáček, 2009.** *Koleopterologische Rundschau*, 79, 179–187.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148919.

COSTA RICA, Estación Sirena Parque Nacional Corcovado, Provincia Puntarenas, 8° 28' 0" N, 83° 35' 0" W/Col. Z. Falin/Junio 2000.

***Oosternum intermedium* Fikáček y Hebauer 2009.** *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 49 (1), 103–117.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148923.

COSTA RICA, Estación Cuerici, 4.6 km de la Villa Mills, Provincia San José, 9° 44' 0" N, 83° 47' 0" W/Col. R. Anderson/Junio 1997.

***Oosternum simplex* Fikáček y Hebauer 2009.** *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 49 (1), 103–117.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148910.

COSTA RICA, El Empalme, Provincia Cartago, 9° 42' 30" N, 83° 57' W/Col. R. Anderson/Junio 1997.

***Sacosternum emissarium* Fikáček y Short, 2010.** *Zootaxa*, 2538, 1–37.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3111570.

COSTA RICA, Estación Pittier 1670m, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 9° 1' 4" N, 82° 57' 5" W/Col. R. González/Enero 2000.

LEIODIDAE

CHOLEVINAE

ANEMADINI

***Dissochaetus aequalis* Salgado, 2010.** *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 47 (2010), 149–163.

Holotipo: Macho, MNCR- A 69454.

COSTA RICA, Zarcero, Alfaro Ruiz, Provincia Alajuela, 10° 11' 0.505" N 84° 23' 33.55" W/Col. A. Solís/Abril 1990.

***Dissochaetus costaricensis* Salgado, 2010.** *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 47 (2010), 149–163.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1680757.

COSTA RICA, Estación La Casona, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 17' 54.343" N, 84° 47' 33.158" W/Col. N. Obando, G. Barboza, A. Pound/Marzo 1993.

***Dissochaetus forticornis* Salgado, 2010.** *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 47 (2010), 149–163.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1998946.

COSTA RICA, Estación La Casona, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 17' 54.343" N, 84° 47' 33.158" W/Col. N. Obando, A. Pound, A. Pereira/Febrero 1993.

***Dissochaetus solisi* Salgado 2010.** *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 47 (2010), 149–163.

Holotipo: Macho, MNCR- A 522533.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocorí, Finca de E. Rojas, Provincia Guanacaste, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Setiembre 1991.

***Dissochaetus unidentatus* Salgado, 2011.** *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 35 (3–4), 421–442.

Holotipo: Macho, MNCR- A 574227.

COSTA RICA, Refugio Nacional Fauna Silvestre Tapantí, 1150m, Provincia Cartago, 9° 45' 45.3" N, 83° 47' 17.981" W/Col. G. Mora y F. Quesada/Enero 1992.

**LEIODIDAE
CHOLEVINAE
ESTADIINI**

***Dietta puntarenas* Peck y Cook, 2003.** *The Canadian Entomologist*, 135, 775–810.

Holotipo: Macho, MNCR- A 870889.

COSTA RICA, Estación Biológica Las Alturas 1500m, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 8° 56' 58" N, 82° 50' 11.176" W/Col. E. Sancho/Setiembre 1992.

**LEIODIDAE
CHOLEVINAE
EUCATOPINI**

***Eucatops (Eucatops) andersoni* Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303.

Holotipo: Macho, MNCR- A 870889.

COSTA RICA, Estación Biológica Las Alturas 1500m, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 8° 56' 58" N, 82° 50' 11.176" W/Col. E. Sancho/Setiembre 1992.

***Eucatops (Eucatops) antennatus* Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148912.

COSTA RICA, Reserva San Ramón, 850 m, bosque premontano, Provincia Alajuela, 10° 13' 4" N, 84° 35' 46" W/Col. S. B. Peck y S.J. Peck/Junio 1997.

***Eucatops (Eucatops) apterus* Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148225.

COSTA RICA, Parque Nacional Braulio Carrillo, Volcán Barva, Provincia Heredia, 10° 7' 30" N, 84° 7' 30" W/Col. R. Anderson/Junio 1997.

***Eucatops (Eucatops) dentatus* Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148226.

COSTA RICA, Escazú, Provincia San José, 9° 53' 30" N, 84° 9' 0" W/Col. S.J. Peck/Junio 1997.

***Eucatops (Eucatops) femoratus* Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148227.

COSTA RICA, Reserva San Ramón, 850 m, bosque premontano, Provincia Alajuela, 10° 13' 4" N, 84° 35' 46" W/Col. S.J. Peck/Junio 1997.

***Eucatops (Eucatops) globosus* Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303. Holotipo: Macho, MNCR- A 5148228.

COSTA RICA, Reserva San Ramón, 850 m, bosque premontano, Provincia Alajuela, 10° 13' 4" N, 84° 35' 46" W/Col. S.J. Peck/Junio 1997.

***Eucatops (Eucatops) magnus* Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303. Holotipo: Macho, MNCR- A 5148914.

COSTA RICA: Estación Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 20' 0" N, 84° 50' 0" W/Col S.J. Peck/Junio 2001.

***Eucatops (Eucatops) minutus* Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303. Holotipo: Macho, MNCR- A 5148913.

COSTA RICA, Rincón de Osa, Osa, Provincia Puntarenas, 8° 41.141' N, 83° 31.117' W/Col S. B, Peck y S.J. Peck/Junio 2001.

***Eucatops (Eucatops) montanus* Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303. Holotipo: Macho, MNCR- A 5148229.

COSTA RICA, San Isidro, Provincia San José, 9° 28' 0" N, 83° 42' 2" W/Col. R. Anderson/Abril 1997.

***Eucatops (Eucatops) osa* Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303. Holotipo: Macho, MNCR- A 514891.

COSTA RICA, Rincón de Osa, Osa, Provincia Puntarenas, 8° 41.141' N, 83° 31.117' W/Col. Col S. B, Peck y S.J. Peck/Junio 2001.

***Eucatops (Eucatops) paramontanus* Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303. Holotipo: Hembra, MNCR- A 5148891.

COSTA RICA, Estación Biológica Las Alturas 1500m, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 8° 56' 56" N, 82° 50' 1" W/Col. R. Anderson/Junio 1998.

***Eucatops (Eucatops) solisi* Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137(3), 283–303. Holotipo: Hembra, MNCR- A 715941.

COSTA RICA: Estación Biológica Las Alturas 1500m, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 8° 56' 58" N, 82° 50' 11.176" W/Col. M. Zumbado/Octubre 1991.

***Eucatops (Eucatops) tenuisaccus*, Peck y Cook, 2005.** *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303. Holotipo: Hembra, MNCR- A 5148892.

COSTA RICA: Zurquí, Vázquez de Coronado, Provincia San José, 10° 4' 4" N, 84° 0' 9" W/Col. O. Brien/Noviembre 1998.

LEIODIDAE
CHOLEVINAE
PTOMAPHAGINI

***Adelopsis curvata* Salgado, 2011.** *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 35 (3–4), 421–442.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1818478.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 9 km S. Santa Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. P. Ríos/Enero 1994.

***Adelopsis mixta* Salgado, 2011.** *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 35 (3–4), 421–442.

Holotipo: Macho, MNCR- A 562952.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocorí, Finca de E. Rojas, 150m, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Mayo 1991.

***Ptomaphagus (Adelops) acuminatus* Salgado, 2011.** *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 35 (3–4), 421–442.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2213927.

COSTA RICA, El Llano de Savegre, Pérez Zeledón, Provincia Puntarenas, 9° 27' 07.652" N, -83° 55' 50.656" W/Col. J. Quesada/Diciembre 1992.

LUCANIDAE

AESALINAE

AESALINI

***Trogellus (Trogellus) hermanni* Paulsen, 2013.** *Insecta Mundi*, 0325, 1–25.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2238296.

COSTA RICA, Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo, Provincia Puntarenas, 9° 1' 32.390" N, 82° 57' 45.703" W/Col. M. Moraga/Junio 1995.

LYCIDAE

LYCINAE

PLATERODINI

***Plateros calanticatoides* Kazantsev, 2005.** *Russian Entomological Journal*, 14 (3), 203–208.

Holotipo: Macho, MNCR- A 772826.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, 1050 m, Tierras Morenas, Zona Protectora Tenorio, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. J. Quesada/Abril 1992.

***Plateros discolor* Kazantsev, 2005.** *Russian Entomological Journal*, 14 (3), 203–208.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1208713.

COSTA RICA, Cementerio de la Máquina, 2100–2500 m, Parque Nacional Chirripó, Provincia San José, 9° 27' 30.714" N, -83° 33' 10.227" W/Col. F. Quesada/Marzo 1993.

PASSALIDAE

PASSALINAE

PROCULINI

***Veturius solisi* Boucher, 2006.** *Annales de la Société Entomologique de France*, 41, 239–603.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1027873.

COSTA RICA, Valle del Silencio, 2200m, Provincia Limón, 9° 08' 22.439" N, -82° 56' 49.230" W/Col. N. Obando/Setiembre 1984.

***Veturius ultimus* Boucher, 2006.** *Annales de la Société Entomologique de France*, 41, 239–603.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1163217.

COSTA RICA, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 17' 54.343" N, 84° 47' 33.158" W/Col. N. Obando/Octubre 1993.

PASSANDRIDAE
PASSANDRINAE
PASSANDRINI

***Catogenus inbio* Ivie y Ślipínski, 2005.** *The Coleopterists Bulletin*, 59, 459–63.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1764423.

COSTA RICA, Estación Murciélago, 8 km S.O. de Cuajiniquil, Santa Cruz, Provincia Guanacaste, 10° 54' 6.930" N, -85° 43' 51.655" W/Col. C. Cano/Abril 1994.

PSEPHENIDAE
EUBRINAE

***Neoeubria inbionis* Shepard y Barr, 2014.** *Zootaxa*, 3811 (4), 553–568.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4441614.

COSTA RICA, Parque Nacional Rincón de la Vieja. Las Pailas, Liberia, Provincia Guanacaste, 10° 46' 30.000" N, -85° 20' 50.400" W/Col. W. Shepard/Junio 2001.

SCARABAEIDAE
APHODIINAE
EUPARIINI

***Lomanoxia canthonopsis* Skelley, 2003.** *Insecta Mundi*, 17 (3–4), 185–190.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2153329.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700m, Área de Conservación Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 25.285" N, 85° 25' 37.855" W/Col. P. Ríos/Enero 1998.

***Odontolytes viejoae* Stebnicka y Skelley, 2005.** *Acta Zoologica Cracoviensia* 48B (1-2), 23–42.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148924.

COSTA RICA, 1 km al Sur de Puerto Viejo, Provincia Heredia, 10° 26' 10" N, 84° 0' 52" W/Col. E. Riley y D. Ledoux/Junio 1984.

SCARABAEIDAE
DYNASTINAE
DYNASTINI

***Amblyoproctus centroamericanus* Ratcliffe, 2003.** *Bulletin of the University of Nebraska State Museum*, 16, 1–506.

Holotipo: Macho, MNCR- A 125077.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700m, 9 km S Santa Cecilia, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. P. Ríos/Febrero 1990.

***Cyclocephala alazona* Ratcliffe, 2003.** *Bulletin of the University of Nebraska State Museum*, 16, 1–506.

Holotipo: Macho, MNCR- A 550138.

COSTA RICA, Estación Eladios, 820m, Refugio Peñas Blancas, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Alajuela, 10° 18' 43.514" N, 84° 43' 11.934" W/Col. N. Obando/Julio 1991.

***Cyclocephala enigma* Ratcliffe, 2003.** *Bulletin of the University of Nebraska State Museum*, 16, 1–506.

Holotipo: Macho, MNCR- A 414123.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000-1400m, Lado SO Volcán Cacao, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. F. Araya/Mayo 1992.

***Cyclocephala marylizeae* Ratcliffe, 2003.** *Bulletin of the University of Nebraska State Museum*, 16, 1–506.

Holotipo: Macho, MNCR- A 410455.

COSTA RICA, Estación Sirena, Parque Nacional Corcovado, 0-100m, Provincia Puntarenas, 8° 28' 48.617" N, 83° 35' 28.641" W/Col. J. Saborío/octubre 1990.

***Cyclocephala unamas* Ratcliffe, 2003.** *Bulletin of the University of Nebraska State Museum*, 16, 1–506.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1114210.

COSTA RICA, Parque Nacional Braulio Carrillo, Estación Zurquí, Provincia San José, 10° 04' 04" N, 84° 00' 09" W/Col. M. Chavarría/Julio 1996.

***Golofa hirsuta* Ratcliffe, 2003.** *Bulletin of the University of Nebraska State Museum*, 16, 1–506.

Holotipo: Macho, MNCR- A 856727.

COSTA RICA, San Luis, 1040m, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 16' 36.202" N, 84° 47' 47.831" W/Col. Z. Fuentes/Octubre 1992.

***Golofa solisi marylizeae* Ratcliffe, 2003.** *Bulletin of the University of Nebraska State Museum*, 16, 1–506.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 98021.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000 - 1400 m suroeste Volcán Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. R. Blanco y C. Chávez/Octubre 1989.

***Neoeubria inbionis* Shepard y Barr, 2014.** *Zootaxa*, 3811 (4), 553–568.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4441614.

COSTA RICA, Parque Nacional Rincón de la Vieja. Las Pailas, Liberia, Provincia Guanacaste, 10° 46' 30.000" N, -85° 20' 50.400" W/Col. W. Shepard/Junio 2001.

SCARABAEIDAE
DYNASTINAE
PHILEURINI

***Hemiphileurus dyscritus* Ratcliffe, 2003.** *Bulletin of the University of Nebraska State Museum*, 16, 1–506.

Holotipo: Macho, MNCR- A 270287.

COSTA RICA, Estación Maritza, 600 m, lado O Volcán Orosi, Provincia Guanacaste, 10° 57' 45.150" N, 85° 29' 42.878" W/Col. indet/Mes indet 1989.

SCARABAEIDAE
DYNASTINAE
PEDODONTINI

***Orizabus australis* Ratcliffe y Solís, 2013.** *The Coleopterists Bulletin*, 67 (1), 1–6.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4331562.

COSTA RICA, Buenos Aires. Parque Nacional La Amistad. Cerro Frantzius, camino a Valle del Silencio, 2100m, Provincia Puntarenas, 9° 03' 28.993" N, -82° 59' 11.971" W/Col. A. Solís/Junio 2012.

SCARABAEIDAE
MELOLONTHINAE
MACRODACTYLINI

***Macroductylus dejeani* Arce-Pérez y Morón. 2018.** *Zootaxa*, 4462 (3), 379–403.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2382682.

COSTA RICA, Zona Protectora Las Tablas, 1 Km NE de Sitio Portones, Provincia Puntarenas, 8° 55' 39.458" N, -82° 47' 11.344" W/Col. M. Segura/Mayo 1995.

***Macroductylus latreillei* Arce-Pérez y Morón. 2018.** *Zootaxa*, 4462 (3), 379–403.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1848993.

COSTA RICA, Grano de Oro, Chirripó, Turrialba, Área Conservación Amistad, Provincia Cartago, 9° 49' 06.085" N, 83° 27' 32.988" W/Col. P. Campos/Junio 1993.

***Macroductylus pseudothoracicus* Arce-Pérez y Morón. 2018.** *Zootaxa*, 4462 (3), 379–403.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2423655.

COSTA RICA, Tres Colinas, Potrero Grande, Buenos Aires, Provincia Puntarenas, 9° 06' 52.041" N, -83° 03' 45.345" W/Col. M. Zumbado/Enero 1992.

***Macroductylus solisi* Arce-Pérez y Morón. 2018.** *Zootaxa*, 4462 (3), 379–403.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2349303.

COSTA RICA, Cuesta entre Tablón y Azahar, 800 metros al O. de Tablón, Provincia Cartago, 9° 50' 03.547" N, -84° 00' 57.962" W/Col. A. Solís, y M. Chavarría/Mayo 1995.

SCARABAEIDAE
MELOLONTHINAE
RIZOTROGINI

***Phyllophaga (Chirodines) nahui* Morón y Solís, 1994.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 7, 181–185.

Holotipo: Macho, MNCR- A 442091.

COSTA RICA, Finca Jenny, 30 km N de Liberia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 51' 55.826" N, 85° 34' 24.74" W/Col. E. Araya/Julio 1992.

***Phyllophaga (Phyllophaga) changuena* Morón, 2003.** *The Canadian Entomologist*, 135 (2), 213–302.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3888027.

COSTA RICA, San Ramón, Río San Lorencito 800mts, Provincia Alajuela, 10° 13' 36" N, 84° 37' 57" W/Col. A. Solís/Julio 1986.

***Phyllophaga (Phyllophaga) copalensis* García y Morón, 2009.** *Zootaxa*, 2062, 37–45.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148897.

COSTA RICA, Reserva biológica El Copal, 1000 m, Jiménez, Provincia Cartago, 9° 47' 10" N, 83° 45' 6" W/Col. A. García/Junio 2007.

***Phyllophaga (Phyllophaga) guapiloides* Morón y Solís, 2001.** *The Coleoptera Bulletin*, 55 (1), 11–29.

Holotipo: Macho, MNCR- A 909226.

COSTA RICA, Estación Biológica Las Alturas 1500 m, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 8° 56' 58" N, 82° 50' 11.176" W/Col. F. Araya/Marzo-Mayo 1992.

***Phyllophaga (Phyllophaga) larai* García-López y Morón, 2009.** *Zootaxa*, 2062, 37–45.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5147478.

COSTA RICA, Parque Nacional Hitoy Cerere, Cerro Bitárkara, 1000 m, Provincia Limón, 9° 38' 25" N, 83° 8' 15" W/Col. W. Arana/Julio 2007.

***Phyllophaga (Phyllophaga) lorencita* Morón y Solís, 2001.** *The Coleoptera Bulletin*, 55 (1), 11–29.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2515478.

COSTA RICA, San Ramón, Río San Lorencito, Provincia Alajuela, 10° 13' 36" N, 84° 37' 57" W/Col. A. Solís/Mayo 1987.

***Phyllophaga (Phyllophaga) naranjina* Morón y Solís, 2001.** *The Coleoptera Bulletin*, 55 (1), 11–29.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148898.

COSTA RICA, El Rosario de Naranjo, Estación de Peaje, Provincia Alajuela, 10° 03' 17.06" N, -84° 21' 39.77" W/Col. A. Solís/Abril 1998.

***Phyllophaga (Phyllophaga) puntarenosa* Morón y Solís, 2001.** *The Coleoptera Bulletin*, 55 (1), 11–29.

Holotipo: Macho, MNCR- A 346072.

COSTA RICA, Rancho Quemado, Península de Osa, 200m, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. F. Quesada/Diciembre 1991.

***Phyllophaga (Phyllophaga) schizorhinoides* Morón, 2003.** *The Canadian Entomologist*, 135 (2), 213–302.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3888007.

COSTA RICA, Cartago, Parque Nacional Fauna Silvestre Tapantí, 1480 m, Provincia Cartago, 10° 11' 39.111" N, -84° 02' 38.497" W/Col. G. Mora/Noviembre 1992.

***Phyllophaga (Phyllophaga) solisiana* Morón, 2003** *The Canadian Entomologist*, 135 (2), 213–302.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3888023.

COSTA RICA, Derrumbe, Estación Mengo 1400 m, W side Volcán Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 56' 1.436" N, 85° 27' 40.639" W/Col. D. Janzen y H. Hallwachs/Junio 1988.

***Phyllophaga (Phyllophaga) talamancana* Morón y Solís, 2001.** *The Coleoptera Bulletin*, 55 (1), 11–29.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2553045.

COSTA RICA, Sendero a Cerro Pittier, 600m NO. de la Estación. 1750m Provincia Puntarenas, 9° 1' 43.798" N, 82° 57' 53.867" W/Col. M. Moraga/Julio 1996.

***Phyllophaga (Phyllophaga) tapantina* Morón y Solís, 2001.** *The Coleoptera Bulletin*, 55 (1), 11–29.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1033746.

COSTA RICA, Reserva. Tapantí Quebrada dos, Provincia Cartago, 9° 41' 21.453" N, -83° 45' 21.665" W/Col. J. Sánchez/Abril 1987.

***Phyllophaga (Phyllophaga) tilarana* Morón y Solís, 2001.** *The Coleoptera Bulletin*, 55 (1), 11–29.

Holotipo: Macho, MNCR- A 453077.

COSTA RICA, Estación La Casona, Reserva Biológica Monteverde, 1520m, Provincia Puntarenas, 10° 17' 54.343" N, 84° 47' 33.158" W/Col. M. Ramírez/Noviembre 1990.

***Trichesthes cartaginesa* Morón, 2001.** *Annals of the Entomological Society of America*. Columbus 94 (6), 771–808

Holotipo: Macho, MNCR- A 1964069.

COSTA RICA, Parque Nacional Tapantí, Río Dos Amigos., Área de Conservación Amistad, Provincia Cartago, 9° 43' 18.81" N, 83° 47' 5.114" W/Col. G. Mora, A. Solís y E. Ulate/Marzo 1994.

***Trichesthes monteversosa* Morón, 2001.** *Annals of the Entomological Society of America*. Columbus 94 (6), 771–808.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1780663.

COSTA RICA, Estación La Casona, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 18' 15.481" N, 84° 47' 46.335" W/Col. N. Obando/Marzo 1994.

SCARABAEIDAE

RUTELINAE

ANOMALINI

***Anomala aglaos* Filippini, Galante y Micó, 2015.** *Zootaxa*, 3948 (1), 24–40.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148893.

COSTA RICA, La Montura, Provincia San José, 10° 3' 15" N, 84° 1' 0" W/Col. M. Moraga/Noviembre 2007.

***Anomala arthuri* Filippini, Galante y Micó, 2014.** *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 2 (6), 107–122.

Holotipo: Macho, MNCR- A 264744.

COSTA RICA, Estación Maritza, 600m, lado O Volcán Orosí, Provincia Guanacaste, 10° 57' 45.150" N, 85° 29' 42.878" W/Col. R. Blanco/Mayo 1990.

COSTA RICA, Estación Barva, Parque Nacional Braulio Carrillo, 2500 m., Provincia Heredia, 10° 7' 59.43" N, 84° 7' 16.07" W/Col. A. Fernández/Abril 1990.

***Anomala coffea* Filippini, Galante y Micó, 2015.** *The Coleopterists Bulletin*, 69 (3), 463–476.

Holotipo: Macho, MNCR- A 409517.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700 m, 9 km S Santa Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. C. Moraga/Agosto 1991.

***Anomala cupreovariolosa* Filippini, Galante y Micó, 2014.** *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 2 (6), 107–122.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2517681.

COSTA RICA, Las Cruces, San Vito, Provincia Puntarenas, 8° 47' 07" N, 82° 57' 34" W/Col. A. Solís/Noviembre 1998.

***Anomala cyclops* Filippini, Galante y Micó, 2015.** *The Coleopterists Bulletin*, 69 (3), 463–476.

Holotipo: Macho, MNCR- A 755645.

COSTA RICA, Cerro El Hacha, 300m, 12 km SE de La Cruz, Provincia Guanacaste, 10° 58' 59.396" N, -85° 20' 50.400" W/Col. III Curso Parataxónomos/Junio 1992.

***Anomala divisa* Filippini, Galante y Micó, 2015.** *The Coleopterists Bulletin*, 69 (3), 463–476.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2517128.

COSTA RICA, Cinco Esquinas de Carrizal, 1800m, Provincia Alajuela 10° 06' 33.434" N, -84° 09' 12.933" W/Col. G. Barrantes/Abril 1998.

***Anomala estrella* Filippini, Galante y Micó, 2015.** *Zootaxa*, 3948(1), 24–40.

Holotipo: Macho, MNCR- A 898153.

COSTA RICA, Estación La Casona, 1520m, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 17' 54.343" N, - 84° 47' 33.158" W/Col. N. Obando/Marzo 1992.

***Anomala ferrea* Filippini, Micó y Galante, 2014.** *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 2 (6), 107–122.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2517845.

COSTA RICA, Las Cruces, San Vito, Provincia Puntarenas, 10° 46' 30.000" N, -85° 20' 50.400" W/Col. A. Solís/Noviembre 1988.

***Anomala hiata* Filippini, Micó y Galante, 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France* (N.S.), 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- 2238414.

COSTA RICA, Estación Pittier, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 9° 1' 32.390" N, 82° 57' 45.703" W/Col. E. Nuñez/Febrero 1995.

***Anomala limon* Filippini, Galante, Micó, 2015.** *Zootaxa*, 3948 (1), 24–40.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2415599.

COSTA RICA, Estación Hitoy Cerere, 100m, Provincia Limón, 9° 40' 31.360" N, 83° 01' 36.392" W/Col. E. Rojas/Marzo-Abril 1998.

***Anomala megaparamera* Filippini, Micó y Galante. 2013.** *Zootaxa*, 3670 (2), 255–273.

Holotipo: Macho, MNCR- A 285104.

COSTA RICA, Estación Cuatro Esquinas, Parque Nacional Tortuguero, 0 m, Provincia Limón, 10° 32' 22.377" N, 83° 30' 23.331" W/Col. R. Delgado/Octubre 1990.

***Anomala mersa* Filippini, Galante y Micó. 2015.** *The Coleopterists Bulletin*, 69 (3), 463–476.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3151362.

COSTA RICA, Parque Nacional Palo Verde, Sector Palo Verde. 0-50m, Provincia Guanacaste, 10° 22' 0.004" N, 85° 22' 59.759" W/Col. W. Porras/Noviembre-Diciembre 1999.

***Anomala mesosticta* Filippini, Galante y Micó. 2015.** *The Coleopterists Bulletin*, 69 (3), 463–476.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1677111.

COSTA RICA, Los Arbolitos. 30m, Provincia Heredia, 10° 38' 36.685" N, -84° 00' 12.227" W/Col. F. Araya/Marzo 1993.

***Anomala nigroflava* Filippini, Galante y Micó. 2014.** *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 2 (6), 107–122.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2169259.

COSTA RICA, Río Rincón, Osa, Provincia Puntarenas, 8° 34' 12.415" N, 83° 30' 27.716" W/Col. M. Moraga/Mayo 1995.

***Anomala pseudoeucoma* Filippini, Micó y Galante. 2013.** *Zootaxa*, 3670 (2), 255–273.

Holotipo: Macho, MNCR- A 393407.

COSTA RICA, Estación Hitoy Cerere, 100m, Reserva Biológica Hitoy Cerere, Provincia Limón, 9° 40' 31.360" N, 83° 01' 36.392" W/Col. R. Guzmán/Abril 1992.

***Anomala solisi* Filippini, Galante y Micó. 2014.** *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 2 (6), 107–122.

Holotipo: Macho, MNCR- A 751373.

COSTA RICA, Amubri, 70m, Talamanca, Provincia Limón, 9° 31' 09.658" N 82° 57' 22.590" W/Col. G. Gallardo/Julio 1992.

***Anomala strigodermoides* Filippini, Galante, y Micó. 2015.** *The Coleopterists Bulletin*, 69 (3), 463–476.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4012910.

COSTA RICA, Bijagua. Albergue Heliconias. 800-900m, Provincia Alajuela, 10° 43' 7.971" N, 85° 1' 47.763" W/Col. B. Gamboa/Marzo 2006.

***Anomala unilineata* Filippini, Galante y Micó. 2015.** *The Coleopterists Bulletin*, 69 (3), 463–476.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1117054.

COSTA RICA, Refugio Golfo Dulce. Cerro Brujo. 612m, Osa Provincia Puntarenas, 10° 50' 11.075" N, 85° 36' 55.768" W/Col. D. Janzen y W. Hallwachs/Mayo 1980.

***Anomala volsellata* Filippini, Galante y Micó. 2014.** *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 2 (6), 107–122.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4191779.

COSTA RICA, Refugio Golfo Dulce. Cerro Brujo. 612m, Osa Provincia Puntarenas, 8° 39' 46.156" N, -83° 35' 02.334" W/Col. A. Azofeifa/Enero 2009.

***Anomala zumbadoi* Filippini, Galante y Micó. 2014.** *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 2(6): 107-122.

Holotipo: Macho, MNCR- A 483151.

COSTA RICA, Rancho Quemado, Península de Osa, 200m., Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. F. Quesada/Diciembre 1991.

***Anomalorhina osaensis* Jameson, Paucar-Cabrera y Solís. 2003.** *Annals of the Entomological Society of America*, 96 (4), 415–432.

Holotipo: Macho, MNCR- A 577351.

COSTA RICA, Rancho Quemado, Península Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. F. Quesada/Marzo 1991.

***Callistethus carbo* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Arthropod Systematics and Phylogeny*, 73 (2), 199–238.

Holotipo: Macho, MNCR- A 930505.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, 1050 m, Tierras Morenas, Zona Protectora Tenorio, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. F. Quesada/Abril 1992.

***Callistethus flavodorsalis* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Arthropod Systematics and Phylogeny*, 73 (2), 199–238.

Holotipo: Macho, MNCR- A 6 478886.

COSTA RICA, Finca. Cafrosa, Estación Las Mellizas, Parque Nacional Amistad, 1300m, Provincia Puntarenas, 8° 54' 15" N, 82° 47' 18" W/Col. M. Ramírez y G. Mora/Octubre 1989.

***Callistethus fuscrobens* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Arthropod Systematics and Phylogeny*, 73 (2), 199–238.

Holotipo: Macho, MNCR- A 10139.

COSTA RICA, La Escuadra, Parque Nacional Amistad, Provincia Puntarenas, 8° 59' 15.426" N, 82° 55' 41.558" W/Col. M. Ramírez y G. Mora /Abril 1989.

***Callistethus lativittis* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Arthropod Systematics and Phylogeny*, 73 (2), 199–238.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1873737.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, Zona Protectora Tenorio Área Conservación Arenal Tilarán, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. G. Rodríguez/Mayo 1994.

***Callistethus levigatus* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Arthropod Systematics and Phylogeny*, 73 (2), 199–238.

Holotipo: Macho, MNCR- A 712086.

COSTA RICA, Quebrada Segunda, Parque Nacional Tapantí, 1250m, Provincia Cartago, 9° 45' 45.289" N, 83° 47' 11.419" W/Col. G. Mora/Julio 1992.

***Callistethus macroxantholeus* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Arthropod Systematics and Phylogeny*, 73 (2), 199–238.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1315235.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700m, 9 km S Santa Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. C. Moraga/Mayo-Junio 1993.

***Callistethus microxantholeus* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Arthropod Systematics and Phylogeny*, 73 (2), 199–238.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2517193.

COSTA RICA, Rancho Quemado, Península de Osa, 200m., Provincia Puntarenas, 10° 25' 52" N, 84° 00' 12" W/Col. M. Chavarría/Setiembre 1986.

***Callistethus parapulcher* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Arthropod Systematics and Phylogeny*, 73 (2), 199–238.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2381386.

COSTA RICA, Estación Altamira, 1 Km. S del Cerro Biolley, Sendero Gigantes del Bosque, Provincia Puntarenas, 9° 1' 58.752" N, 83° 0' 39.193" W/Col. M. Moraga/Noviembre 1995.

***Callistethus pseudocollaris* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Arthropod Systematics and Phylogeny*, 73 (2), 199–238.

Holotipo: Macho, MNCR- A 691543.

COSTA RICA, Estación La Casona, 1520m, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 17' 54.343" N, 84° 47' 33.158" W/Col. N. Obando/Julio 1992.

***Callistethus ruteloides* Filippini, Galante y Micó. 2015.** *Zootaxa*, 3948 (1), 24–40.

Holotipo: Macho, MNCR- A 959028.

COSTA RICA, Quebrada Segunda, Parque Nacional Tapantí, 1250 m, Provincia Cartago, 9° 45' 45.289" N, 83° 47' 11.419" W/Col. G. Mora/Mayo 1992.

***Callistethus stannibractea* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Arthropod Systematics and Phylogeny*, 73 (2), 199–238.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2517469.

COSTA RICA, Rancho Quemado, Península de Osa, 200m, Provincia Puntarenas, 10° 7' 59.43" N, 84° 7' 16.07" W/Col. M. Zumbado y A. Fernández/Abril 1989.

***Callistethus yalizo* Filippini, Galante y Micó. 2015.** *Zootaxa* 3948 (1), 24–40.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1964129.

COSTA RICA, Parque Nacional Tapantí, La Represa, Área Conservación Amistad, Provincia Cartago, 9° 41' 21.453" N, -83° 45' 21.665" W/Col. G. Mora/Marzo 1994.

***Paranomala (Paranomala) aereiiventri* Filippini, Micó y Galante, 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4098939.

COSTA RICA, Parque Nacional Tapantí. 1250-1400m, Provincia Cartago, 9° 44' 0" N, 83° 47' 0" W/Col. C. Barries/Junio 2007.

***Paranomala (Paranomala) aspersa* Filippini, Micó y Galante, 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1147712.

COSTA RICA, Paraíso, Reserva Forestal Río Macho. Villa Mills. 3000m, Prov. Cartago, 9° 33' 38.585" N, 83° 42' 43.955" W/Col. A. Solís/Diciembre 1995.

***Paranomala (Paranomala) atrivillosa* Filippini, Micó y Galante, 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 178001.

***Paranomala (Paranomala) eusticta* Filippini, Micó y Galante, 2015.** *Annales De La Société Entomologique De France (N.S.)* 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2453183.

COSTA RICA, Estación La Casona, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 18' 15.481" N, 84° 47' 46.335" W/Col. A. Azofeifa/Abril 1995.

***Paranomala (Paranomala) globulata* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3500676.

COSTA RICA, Parque Nacional Tapantí, Macizo de La Muerte, Sendero Quebrada las Piedras, 2650m, Provincia Cartago, 9° 41' 28.645" N, 83° 52' 36.595" W/Col. R. González/Junio 2002.

***Paranomala (Paranomala) latifalculata* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Annales De La Société Entomologique De France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4158455.

COSTA RICA, La Unión. Zona Protectora Carpintera, Campo Escuela Istarú, 1750m, Provincia Cartago, 9° 53' 25.972" N, 83° 58' 15.27" W/Col. J. Azofeifa/Julio 2008.

***Paranomala (Paranomala) leopardina* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2470471.

COSTA RICA, Finca Cafrosa, 1 Km NE. de la Escuela Progreso. 1180m, Provincia Puntarenas, 8° 54' 47.475" N, -82° 47' 54.022" W/Col. M. Chinchilla/Noviembre 1995.

***Paranomala (Paranomala) m-fuscum* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 51(2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2467325.

COSTA RICA, Río Grande de Orosi, desde puente Río Dos Amigos hasta la represa, Provincia Cartago, 9° 41' 44.316" N, 83° 46' 6.235" W/Col. R. Delgado/Agosto-Setiembre 1995.

***Paranomala (Paranomala) moroni* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Dugesiana*, 22 (1), 215–220.

Holotipo: Macho, MNCR- A 652257.

COSTA RICA, Estación Palo Verde, 10m, Refugio Nacional Fauna Silvestre Rodríguez, Provincia Guanacaste, 10° 20' 56.828" N, 85° 21' 8.441" W/Col. D. Acevedo/Junio 1991.

***Paranomala (Paranomala) parvaeucoma* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Dugesiana*, 22 (1), 215–220.

Holotipo: Macho, MNCR- A 644521.

COSTA RICA, Estación Sirena, Parque Nacional Corcovado, 0 - 100m, Refugio Nacional Fauna Silvestre R. L. Rodríguez, Provincia Puntarenas, 8° 28' 48.617" N, 83° 35' 28.641" W/Col. N. Obando/Junio 1990.

***Paranomala (Paranomala) piccolina* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 874987.

COSTA RICA, Estación Biológica Las Alturas 1500m, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 8° 56' 58" N, 82° 50' 11.176" W/Col. E. Sancho/Agosto 1992.

***Paranomala (Paranomala) pincelada* Filippini, Galante y Micó. 2015.** *Zootaxa*, 3948 (1), 24–40.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1167801.

COSTA RICA, Finca Jenny, 30 km N de Liberia, Parque Nacional Guanacaste, Refugio Nacional Fauna Silvestre R. L. Rodríguez Guanacaste, 10° 51' 55.826" N, 85° 34' 24.74" W/Col. E. Araya/Mayo 1995.

***Paranomala (Paranomala) robiginosa* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *The Coleopterists Bulletin*, 69 (3), 463–476.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2517719.

COSTA RICA, Zarcero 1700m, Provincia Alajuela, 10° 11' 0.505" N, 84° 23' 33.55" W/Col. A. Solís/Mayo 1987.

***Paranomala (Paranomala) stillaticia* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2037919.

COSTA RICA, Río Grande de Orosi, desde Sendero La Pava Hasta La Catarata, Provincia Cartago , 9° 44' 23.895" N, -83° 46' 58.439" W/Col. G. Mora/Agosto 1994.

***Paranomala (Paranomala) subusta* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 531839.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000-1400m, Lado SO Volcán Cacao, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. indet/Mayo 1991.

***Paranomala (Paranomala) subrodens* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3546311.

COSTA RICA, Río Macho, Calle hasta Límite con Pina, 2700m, Provincia Cartago, 9° 41' 15.611" N, 83° 52' 26.774" W/Col. R. González/Octubre 2002.

***Paranomala (Paranomala) tenoriensis* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4219250.

COSTA RICA, Guatuso, Parque Nacional Volcán Tenorio. Punto 1: Catarata Río Buenavista. 800m, Provincia Alajuela, 10° 42' 22.043" N, 84° 59' 34.399" W /Col. J. Azofeifa/Mayo 2009.

***Paranomala (Paranomala) valisneria* Filippini, Micó y Galante. 2015.** *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1780597.

COSTA RICA, Estación La Casona, Reserva Biológica Monteverde, Provincia Puntarenas, 10° 18' 15.481" N, 84° 47' 46.335" W/Col. N. Obando/Marzo 1994.

**SCARABAEIDAE
RUTELINAE
ANOPLOGNATINI**

***Phalangogonia hawksii* Smith, 2003.** *Zootaxa*, 316, 1–4.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4182326.

COSTA RICA, Rancho Quemado 300 m, Península Osa, Provincia, Puntarenas, 8° 40' N, 83° 34' W/Col. M. Posla/Mayo 2001.

SCARABAEIDAE

RUTELINAE

RUTELINI

***Chrysina bruyei* Hawks, 1999.** *Occasional Papers of the Consortium Coleopterorum*, 3, 21–29.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1037208.

COSTA RICA, Parque Nacional Guanacaste Estación Maritza 22 mayo 1988 C. De La Rosa, Provincia Guanacaste, 10° 57' 32.083" N, 85° 29' 56.004" W/Col. C. De La Rosa/Mayo 1988.

***Chrysina oreicola* Morón, 1992.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 6 (30), 59–78.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2249507.

PANAMÁ, Cerro Fábrega, 9° 06' 27.977" N, -82° 52' 30.729" W/Col. I. Chacón/Marzo 1984.

***Chrysina sirenicola* Solís y Morón, 1994.** *Folia Entomológica Mexicana*, 92, 31–41.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1111426.

COSTA RICA, Rancho Quemado 300 m, Península Osa, Provincia Puntarenas 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. J. Saborío/Marzo 1991.

***Chrysina tapantina* Morón, 1992.** *Giornale Italiano di Entomologica*, 6 (30), 59–78.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 2249506.

COSTA RICA, Reserva Tapantí, 1500m, Río Grande de Orosí, Provincia Cartago, 9° 45' 45.3" N, 83° 47' 17.981" W/Col. A. Chacón/Junio 1988.

***Dorysthetus solisi* Soula, 2002.** *Les Coléoptères Du Monde*, 26 (2), 117–296.

Holotipo: Macho, MNCR- A 568179.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocorí, Finca de E. Rojas, 150 m, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Junio 1991.

***Hypaspidius belti* Arrow, 1899.** *The Annals and Magazine of Natural History, Including Zoology, Botany and Geology*. London, 4 (7), 363–370.

Holotipo: Sexo indet, MNCR- A 79882.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000-1400m, SW side Volcán Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. GNP Biodiv/Mayo 2001.

***Macraspis solisi* Soula, 1998.** *Les Coléoptères Du Monde*, 26 (1), 1–116.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1955828.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 9 km S. Santa Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. Indet/Julio 1993.

***Minidorysthetus solisi* Soula, 1998.** *Les Coléoptères Du Monde*, 26 (1), 1–116.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1769714.

COSTA RICA, Estación San Ramón Oeste, Provincia Alajuela, 10° 52' 59.762" N, 85° 24' 48.757" W/Col. C. Cano/Abril 1994.

***Pelidnota labyrinthophallica* Solís y Morón, 1994.** *Folia Entomológica Mexicana*, 92, 31–41.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1111321.

COSTA RICA, Rancho Quemado, 200m, Península de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. D. Brenes/Abril 1992.

***Phalangogonia hawksii* Smith, 2003.** *Zootaxa* 316, 1–4.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4182326.

COSTA RICA Rancho Quemado 300 m, Península Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' N, 83° 34' W/Col. M. Posla/Mayo 2001.

***Platyrutela arenícola* Solís y Morón, 1998.** *Annals of the Entomological Society of America*, 91 (3), 269–278.

Holotipo: Macho, MNCR- A 339775.

COSTA RICA, Estación Cuatro Esquinas, 0m, Parque Nacional Tortuguero, Provincia Limón, 10° 32' 22.377" N, 83° 30' 23.331" W/Col. R. Delgado/Agosto 1991.

SCARABAEIDAE

SCARABAEINAE

ATEUCHINI

***Ateuchus alutacius* Kohlmann y Solís, 2012.** *Zootaxa*, 3193, 28–52.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 4182326.

COSTA RICA Golfito. Camino a Cerro Paraguas, Finca de Pito. 1100–1200m, Provincia Puntarenas, 8° 45' 09.794" N, - 83° 02' 22.416" W/Col. B. Hernández y Moraga, M./Agosto 2008.

***Ateuchus earthorum* kohlmann y Solís, 2009.** *Zootaxa*, 2219, 31–37.

Holotipo: Macho, MNCR- A2328564.

COSTA RICA, Estación Cacao, 2 Km SW del Cerro Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 41.802" N, 85° 28' 10.207" W/Col. Curso Scarabaeidae/Setiembre 1995.

***Ateuchus ginae* Kohlmann, 1996.** *Revista Biología Tropical*, 44 (3) /45 (1), 177–192.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1000327.

COSTA RICA, El Rodeo, Ciudad colón Provincia San José, 9° 55' 20" N, 84° 15' 55" W " W/Col. A. Solís/Diciembre 1988.

***Ateuchus fetteri* Kohlmann, 1996.** *Revista Biología Tropical*, 44 (3) /45 (1), 177–192.

Holotipo: Macho, MNCR- A 145756.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000–1400m, SW side Volcán Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W /Col. R. Blanco y C. Chávez /Noviembre-Diciembre 1989.

***Ateuchus hendrichsi* Kohlmann, 1996.** *Revista Biología Tropical*, 44 (3) /45 (1), 177–192.

Holotipo: Macho, MNCR- A 237461.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000–1400m, lado suroeste del Volcán Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. Curso Parataxónomos II/Junio 1990.

***Ateuchus howdeni* Kohlmann, 1996.** *Revista Biología Tropical*, 44 (3) /45 (1), 177–192.

Holotipo: Macho, MNCR- A 302176.

COSTA RICA Estación Sirena, Parque Nacional Corcovado, 0 - 100m, Provincia Puntarenas, 8° 28' 48.617" N, 83° 35' 28.641" W/Col. J. Saborío/Diciembre 1990.

***Ateuchus solisi* Kohlmann, 1996.** *Revista Biología Tropical*, 44 (3) / 45 (1), 177–192.

Holotipo: Macho, MNCR- A 863529.

COSTA RICA, Estación Miramar, 500m, Reserva Biológica Hitoy Cerere, Provincia Limón, 9° 38' 00.101" N, -83° 00' 12.336" W/Col. C. Carballo/Setiembre 1992.

***Ateuchus zoebischi* Kohlmann, 1996.** *Revista Biología Tropical*, 44 (3) / 45 (1), 177–192.

Holotipo: Macho, MNCR- A 391282.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000-1400 m, lado SO Volcán Cacao, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. M. Segura/Mayo 1992.

***Scatimus erinnyos* Kohlmann y Solís, 1996.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 8, 99–103.

Holotipo: Macho, MNCR- A 536043.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700 m, 9 km S Sta. Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. C. Moraga/Julio 1992.

***Uroxys bonplandi* Kohlmann, Solís y Alvarado, 2019.** *ZooKeys*, 881, 23–51.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 5148900.

COSTA RICA, Sendero a Pico Volcán Santa María, Sector Santa María, Provincia Guanacaste, 10° 48' 14" N, 85° 19' 41" W/Col. S. Salas/Diciembre 2017.

SCARABAEIDAE

SCARABAEINAE

COPRINI

***Canthidium annagabrielae* Solís y Kohlmann, 2004.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 11, 1–73.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1343524.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocorí, Finca. de E. Rojas, 150m, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Febrero 1993.

***Canthidium darwini* Kohlmann y Solís, 2009.** *Zootaxa* 2219, 31–37.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4068367.

COSTA RICA P.I. La Amistad Caribe. Camp. 2: Río Coén, Transecto 1. 1700-1800, Provincia Limón, 09° 22' 59.000" N, -83° 12' 48.000" W/Col. B. Gamboa y M. Moraga/Febrero.

***Canthidium emoryi* Solís y Kohlmann, 2004.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 11, 1–73.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2467405.

COSTA RICA, Quebrada Segunda, Tapantí, Provincia Cartago, 9° 45' 45.3" N, 83° 47' 17.981" W/Col. R. Delgado/Agosto-Setiembre 1995.

***Canthidium marielae* Solís y Kohlmann, 2004.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 52 (11), 1–73.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1624709.

COSTA RICA, Rancho Quemado, Península de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. A. Marín/Diciembre 1993.

***Canthidium marianelae* Solís y Kohlmann, 2004.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 52 (11), 1–73.

Holotipo: Macho, MNCR- A 745841.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000-1400m, Lado SO Volcán Cacao, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. G. Rodríguez/Mayo 1992.

***Canthidium priscillae* Solís y Kohlmann, 2004.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 52 (11), 1–73.

Holotipo: Macho, MNCR- A 557363.

COSTA RICA, Río San Lorenzo, 1050 m, Tierras Morenas, Refugio Forestal Cordillera Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 36' 37.651" N, 84° 59' 41.876" W/Col. C. Alvarado/Enero 1992.

***Canthidium pseudopuncticolle* Solís y Kohlmann, 2004.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 52 (11), 1–73.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1028553.

COSTA RICA Cerro el Hacha, Provincia Guanacaste, 10° 58' 59.396" N, 85° 32' 27.847" W/Col. A. Solís/Enero 1988.

***Copris tridentatus* Solís y Kohlmann, 2003.** *Zootaxa* 139, 1–14.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1009607.

COSTA RICA, El Rodeo, Ciudad Colón, 1000 m, Provincia San José, 9° 53' 55.1682" N, 84° 14' 31.7610" W/Col. A. Solís/Octubre 1988.

***Dichotomius amicitiae* Kohlmann y Solís, 1997.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 8, 343–382.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 909180.

COSTA RICA, Estación Biológica Las Alturas 1500 m, Coto Brus, Provincia Puntarenas, 8° 56' 58" N, 82° 50' 11.176" W/Col. F. Araya/Marzo-Mayo 1992.

***Dichotomius annae* Kohlmann y Solís, 1997.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 8, 343–382.

Holotipo: Macho, MNCR- A 249480.

COSTA RICA, Rancho Quemado, Península de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. A. Solís/Mayo 1998.

***Dichotomius danieli* Kohlmann y Solís, 1997.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 8, 343–382.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2029748.

COSTA RICA, Est. Pitilla 9 Km S. Santa Cecilia, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. C. Moraga/Agosto 1994.

***Dichotomius favi danieli* Kohlmann y Solís, 1997.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 8, 343–382.

Holotipo: Macho, MNCR- A 931796.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocori, Finca de E. Rojas. 150 m. Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Octubre 1992.

***Dichotomius rodrigo* Kohlmann y Solís, 1997.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 8, 343–382.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1027516.

COSTA RICA, Rancho Quemado, Península de Osa, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. A. Solís/Mayo 1998.

***Dichotomius woodruffi* Solís y Kohlmann, 2022.** *Insecta Mundi*, 0918, 1–12.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1969440.

COSTA RICA, Estación Quebrada Bonita, Provincia Puntarenas, 9° 46' 02.829" N, 84° 36' 29.227" W/Col. R. Guzmán/Agosto 1993.

***Eutrichillum arcus* Solís y Kohlmann, 2003.** *Zootaxa*, 139, 1–14.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1832764.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 9 km S. Santa Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. C. Moraga/Mayo 1994.

***Ontherus sextuberculatus* Génier, 1996.** *Memoirs of the Entomological Society of Canada*, 1128 (170), 1–169.

Holotipo: Macho, MNCR- A 396734.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocori, Finca de E. Rojas, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Diciembre 1990.

SCARABAEIDAE

SCARABAEINAE

DELTOCHILINI

***Canthon humboldti* Solís y Kohlmann, 2002.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 10 (50), 1–68.

Holotipo: Macho, MNCR- A 907237.

COSTA RICA, Rancho Quemado, Golfo Dulce, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. M. Segura/Setiembre 1992.

***Canthon inusitatus* Kohlmann y Solís, 2006.** *Zootaxa*, 1302, 61–68.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148894.

COSTA RICA, Vara Blanca 2000m, Provincia Heredia, 10° 11' 0" N 84° 7' 0" W/Col. D. Brenes/Abril 2002.

***Canthon silvaticus* Solís y Kohlmann, 2002.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 10 (50), 1–68.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1348843.

COSTA RICA, Sector Cerro Cocori, Finca de E. Rojas, 150m, Provincia Limón, 10° 35' 39.386" N, 83° 42' 59.444" W/Col. E. Rojas/Mayo 1993.

***Cryptocanthon osaensis* Cook, 2002.** *The Coleopterists Bulletin*, 56 (1), 3–96.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1301559.

COSTA RICA, Rancho Quemado 200m, Golfo Dulce, Provincia Puntarenas, 8° 40' 44.745" N, 83° 34' 00.171" W/Col. F. Quesada/Agosto1991.

***Cryptocanthon solisi* Cook, 2002.** *The Coleopterists Bulletin*, 56 (1), 3–96.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3338423.

COSTA RICA, Parque Nacional Braulio Carrillo, Transecto entre La Selva y Vara Barva, Provincia Heredia, 84° 5' 3.466" W/Col. A. Solís y T. Foso/Febrero 2001.

***Deltochilum acanthus* Kohlmann y Solís, 2012.** *Zootaxa*, 3193, 28–52.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1185073.

COSTA RICA, Estación Quebrada Bonita, 50 m, Reserva Biológica Carara Provincia Puntarenas, 9° 46' 02.829" N, 84° 36' 29.227" W/Col. J. Saborío/Junio 1993.

SCARABAEIDAE

SCARABAEINAE

ONTHOPHAGINI

***Onthophagus coriaceoumbrosus* Kohlmann y Solís, 2001.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 49 (9), 159–261.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1329291.

COSTA RICA, Estación Quebrada Bonita, 50 m, Reserva Biológica Carára, Provincia Puntarenas, 9° 46' 27.240" N, 84° 36' 29.248" W/Col. R. Guzmán/Enero 1993.

***Onthophagus cryptodicranus* Kohlmann y Solís, 2001.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 49 (9), 159–261.

Holotipo: Macho, MNCR- A 375763.

COSTA RICA, Estación Hitoy Cerere, 100 m, Reserva Biologica Hitoy Cerere, Provincia Limón, 9° 40' 31.360" N, 83° 01' 36.392" W/Col. E. López/Abril 1992.

***Onthophagus genuinus* Kohlmann y Solís 2001.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 49 (9), 159–261.

Holotipo: Macho, MNCR- A 312046.

COSTA RICA, Estación El Ceibo, Parque Nacional Braulio Carrillo, 400 - 600m, Provincia Heredia, 10° 19' 40.96" N, 84° 4' 49.527" W/Col. C. Chávez/Febrero 1990.

***Onthophagus grataehelenae* Kohlmann y Solís 2001.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 49 (9), 159–261.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 204551.

COSTA RICA, Salvaje, Cerros Escazú, 1600-1700m, Provincia San José, 9° 50' 56.016" N, -84° 09' 20.035" W/Col. R. Aguilar/Noviembre 1989.

***Onthophagus humboldti* Kohlmann y Solís 2019.** *ZooKeys*, 881, 23–51.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4134631.

COSTA RICA, Buenos Aires, Parque Nacional La Amistad, Tres Colinas. 2100-2200m, Provincia Puntarenas, 9° 08' 34.621" N, -83° 04' 08.083" W/Col. A. Solís/Febrero 2008.

***Onthophagus inediapterus* Kohlmann y Solís 2001.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 49 (9), 159–261.

Holotipo: Macho MNCR- A 2449769.

COSTA RICA, Sendero. Pittier 1800m, Provincia Puntarenas, 9° 2' 1.687" N, 82° 57' 45.647" W /Col. E. Fletes/Junio 1995.

***Onthophagus limonensis* Kohlmann y Solís 2001.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 49 (9), 159–261.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2440857.

COSTA RICA, Sector Cedrales de la Rita, 3 Km N. del Puente Río Suerte, Ruta Puerto Lindo Provincia Limón, 10° 31' 38.584" N, 83° 43' 32.810" W/Col. E. Rojas/Marzo 1996.

***Onthophagus nemorivagus* Kohlmann y Solís 2001.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 49 (9), 159–261.

Holotipo: Macho, MNCR- A 805111.

COSTA RICA, Estación Pitilla, 700 m, 9 km S Santa Cecilia, Parque Nacional Guanacaste, Provincia Guanacaste, 10° 59' 21" N, 85° 25' 33" W/Col. F. Araya/Mayo 1992.

***Onthophagus notiodes* Solís y Kohlmann, 2003.** *Zootaxa*, 139, 1–14.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1289875.

COSTA RICA, Grano de Oro, 1120 m, Chirripó, Turrialba, Provincia Cartago, 9° 49' 06.085" N, 83° 27' 32.988" W /Col. P. Campos/Febrero 1993.

***Onthophagus nubilus* Kohlmann y Solís 2001.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 49 (9), 159–261.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2398850.

COSTA RICA Río El Gringo, Estación Las Nubes de Santa Elena, Provincia San José, 9° 23' 26.620" N, -83° 35' 31.239" W/Col. A. Mora/Enero 1996.

***Onthophagus singulariformis* Kohlmann y Solís 2001.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 49 (9), 159–261.

Holotipo: Macho, MNCR- A 210406.

COSTA RICA, Estación El Ceibo, Parque Nacional Braulio Carrillo 400-600m, Provincia Heredia, 10° 19' 40.96" N, 84° 4' 49.527" W/Col. C. Chávez/Abril 1990.

***Onthophagus solisi* Howden y Gill, 1993.** *The Canadian Entomologist*, 125 (6), 1091–1114.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148895.

COSTA RICA Estación Cacao, 1000-1400 m, SW side Volcán Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. Curso Parataxónomos I/Junio 1990.

***Onthophagus viridivinosus* Kohlmann y Solís 2001.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 49 (9), 159–261.

Holotipo: Macho, MNCR- A 630499.

COSTA RICA, Cerro Tortuguero, 0-120m, Parque Nacional Tortuguero, Provincia Limón, 10° 35' 5.333" N, 83° 31' 45.139" W/Col. R. Delgado/Octubre 1991.

SCARABAEIDAE

SCARABAEINAE

PHANAENI

***Coprophanaeus (Coprophanaeus) kohlmanni* Arnaud, 2002.** *Besoiro*, 7, 2–9.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1711808

COSTA RICA, San Ramón 620m, Provincia Alajuela, 10° 52' 59.762" N, 85° 24' 48.757" W/Col. K. Taylor/Marzo 1994.

***Onthophagus grataehelenae* Kohlmann y Solís 2001.** *Giornale Italiano di Entomologia*, 49 (9), 159–261.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 204551.

COSTA RICA, Salvaje, Cerros Escazú, 1600-1700m, Provincia San José, 9° 50' 56.016" N, -84° 09' 20.035" W/Col. R. Aguilar/Noviembre 1989.

***Phanaeus changdiazii* Kohlmann y Solís 2001.** *Besoiro*, 6, 9–11.

Holotipo: Macho, MNCR- A 1128118.

COSTA RICA, Estación Quebrada Bonita 50m, Provincia Puntarenas, 9° 46' 27.240" N, 84° 36' 29.248" W /Col. R. Guzmán/Julio 1993.

STAPHYLINIDAE

EUAESTHETINAE

EUAESTHETINI

***Edaphus amigo* Puthz 2007.** *Amazoniana*, 19 (3/4), 97–130.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4173599.

COSTA RICA, Zona Protectora Arenal-Monteverde, Monteverde, Cerro Amigos, Provincia Guanacaste, 10° 19' 25.465" N, -84° 47' 41.523" W/Col. J. Ashe, R. Brooks, R. Leschen/Mayo 1989.

***Edaphus gallinaceus* Puthz, 2007.** *Amazoniana*, 19 (3/4), 97–130.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4173597.

COSTA RICA, San Isidro, Pérez Zeledón, 1600-1700m, Provincia San José, 9° 28' 40.000" N, -83° 41' 25.001" W/Col. J. Peck/Junio 1997.

STAPHYLINIDAE

OSORIINAE

***Tannea alticola* Irmeler, 2007.** *Brenesia*, 68, 69–85.

Holotipo: Macho, MNCR- A 4173600.

COSTA RICA, Cabinas Quetzal 2150m, Los Santos, Panamericana, Provincia San José, 09° 33' 53.000" N, -83° 48' 50.000" W/Col. J. Ashe, R Brooks, Z Falin/Julio 2000.

STAPHYLINIDAE

STENINAE

***Stenus holzerianus* Puthz, 2013.** *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins*, 38 (3/4), 89–100.

Holotipo: Macho, MNCR- A 5148901.

COSTA RICA, Parque Nacional Piedras Blancas, La Gamba, Provincia Puntarenas, 8° 42' 0" N, 83° 12' 0" W/Col. E. Holzer/Junio 2005.

***Stenus irazumontis* Puthz, 2013.** *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins*, 38 (3/4), 89–100.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 5148902.

COSTA RICA, Volcán Irazú, Provincia Cartago, 9° 58' 39.3" N, 83° 51' 8.2" W/Col. M. Schulke/Diciembre 2012.

STAPHYLINIDAE
STAPHYLININAE
DIOCHINI

***Renda bicarinata* Márquez, 2010.** *Zootaxa*, 2686, 1–61.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2614095.

COSTA RICA, Parque Nacional Santa Rosa, Provincia Guanacaste, 10° 50' 11.075" N, 85° 36' 55.768" W/Col. D. Janzen, W. Hallwachs/Julio 1980.

***Renda fulgida* Márquez, 2010.** *Zootaxa*, 2686, 1–61.

Holotipo: Macho, MNCR- A 270361.

COSTA RICA, Estación Maritza, 600 m, lado O Volcán Orosí, Provincia Guanacaste, 10° 57' 45.150" N, 85° 29' 42.878" W/Col. indet/Mes indet 1989.

STAPHYLINIDAE
STAPHYLININAE
STAPHYLININI

***Bolitogyrus pulchrus* Brunke, 2014.** *Zookeys*, 423, 1–113.

Holotipo: Macho, MNCR- A 3522884.

COSTA RICA, Finca los Chacón, 2151m, Savegre, Dota, Provincia San José, 9° 32' 56.179" N, -83° 48' 38.081" W/Col. G. Tenorio/Junio-Julio 2002.

STAPHYLINIDAE
STAPHYLININAE
XANTHOLININI

***Homalolinus difficilis* Márquez, 2003.** *Zoologica Scripta*, 32 (6), 491–523.

Holotipo: Macho, MNCR- A 2321947.

COSTA RICA, Estación Pittier, Provincia Puntarenas, 9° 1' 32.390" N, 82° 57' 45.703" W/Col. A. Picado/Junio 1995.

TENEBRIONIDAE
COELOMETOPINAE
COELOMETOPINI

***Bothynoccephalus thoracicus* Doyen, 1995.** *The Coleopterists Bulletin*, 49 (1), 8–14.

Holotipo: Macho, MNCR- A 36278.

COSTA RICA, Estación Cacao, 1000-1400m, Volcán Cacao, Provincia Guanacaste, 10° 55' 48.300" N, 85° 28' 13.524" W/Col. M. Espinoza/Abril 1988.

***Calydonella lisa* Doyen, 1995.** *The Coleopterists Bulletin*, 49 (1), 8–14.

Holotipo: Hembra, MNCR- A 1007756.

COSTA RICA, San Ramón, Provincia Alajuela 10° 14' 34.8282" N, 84° 33' 18.1938" W/Col. A. Solís/Mayo 1986.

CONCLUSIÓN

Gracias a los estudios generados por varios entomólogos en la rama de coleoptera, se ha incrementado esta colección, generando la descripción de muchas nuevas especies para Costa Rica. A pesar de que la gran mayoría de holotipos están en la colección del MNCR, otros no se han podido recuperar por razones de traslado entre instituciones, muerte de algunos entomólogos a cargo de los holotipos, o bien, respuesta de los autores de los artículos.

AGRADECIMIENTOS. Se agradece a todos los entomólogos y especialistas que han aportado su conocimiento a la biodiversidad de Costa Rica. Así mismo, se agradece la colaboración para recuperar aquellos holotipos que todavía no están en la colección del Museo Nacional de Costa Rica.

LITERATURA CITADA

- Anderson, R. (1999) A New Species of *Lignyodes* Dejean (Subgenus *Chionanthobius* Pierce) from Costa Rica (Curculionidae). *The Coleopterists Bulletin*, 53 (2), 183–185.
- Anderson, R. (2002) The Dryophthoridae of Costa Rica and Panama: Checklist with keys, new synonymy and descriptions of new species of *Cactophagus*, *Mesocordylus*, *Metamasius* and *Rhodobaenus* (Coleoptera; Curculionoidea). *Zootaxa*, 80, 1–94.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa/80.1.1>
- Anderson, R. (2005) New Oxycoryninae from Central and South America. Phylogenetic and biogeographical implications (Coleoptera: Belidae). *Systematic Entomology*, 30, 644–652.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-3113.2005.00304.x>
- Anderson, R. (2008) A review of the Neotropical genus *Eucalandra* Faust, 1899 (Coleoptera; Curculionidae: Dryophthorinae). *Zootaxa*, 1791, 57–67.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.1791.1.3>
- Anderson, R., y Gómez, L (1997) *Systenotelus*, a remarkable new genus of weevil (Coleoptera: Curculionidae) associated with *Carludovica* (Cyclantaceae) in Costa Rica and Panamá. *Revista de Biología Tropical*, 45 (2), 887–904.
- Anderson, R. (2021) *Conotrachelus terryerwini*, a majestic new species of Curculionidae (Molytinae, Conotrachelini) from Costa Rica. *ZooKeys*, 1044, 721–727.
<https://doi.org/10.3897/zookeys.1044.62722>
- Anderson, R., y Lanteri, A. (2000) New genera and species of weevils from the Galapagos Islands, Ecuador and Cocos Island, Costa Rica (Coleoptera; Curculionidae; Entiminae; Entimini). *American Museum Novitates*, 3299, 1–15.
[https://doi.org/10.1206/0003-0082\(2000\)299<0001:NGASOW>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1206/0003-0082(2000)299<0001:NGASOW>2.0.CO;2)
- Arce, R., y Morón, M. (2018) Review of the species of *Macrodactylus* Dejean (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae) from Costa Rica and Panama. *Zootaxa*, 4462 (3), 379–403.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.4772.3.7>

- Arnaud, P. (2002) Description de nouvelles espèces de *Phanaeides* (Col. Scarabaeidae). *Besoiro*, 7, 2–9.
https://www.researchgate.net/publication/318755539_Description_de_nouvelles_especies_de_Phanaeides_Col_Scarabeidae, (Consultado 15 octubre 2024).
- Arrow, J. (1899) On the classification of the coleopterous family Rutelidae. *The Annals and Magazine of Natural History, Including Zoology, Botany and Geology*. London, 4 (7), 363–370.
<https://doi.org/10.1080/00222939908678214>
- Balke, M., Roughley, R., Sondermann, W., Spangler, P. (2002) Diving beetles of the genus *Rhantus* in Costa Rica: Taxonomy and Biogeography, with notes on South American Species (Coleoptera: Dytiscidae). *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, 37 (3), 263–271.
<https://doi.org/10.1076/snfe.37.3.263.8565>
- Barries, W. (2007) *Actenodes solisi* sp.n. aus Costa Rica (Coleoptera: Buprestidae: Actenodini). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen*, 59, 33–36.
- Bell, R., y Bell, J. (2009) Rhysodine beetles (Insecta: Coleoptera: Carabidae): new species, new data III. *Annals of the Carnegie Museum*, 78 (1), 45–77.
<https://doi.org/10.2992/007.078.0104>
- Bellamy, C. (1997) A revision of the Neotropical coroebine genus *Sambomorpha* Obenberger 1924 (Coleoptera: Buprestidae Agrilinae). *Tropical Zoology*, 10, 143–156.
<https://doi.org/10.1080/03946975.1997.10539332>
- Bellamy, C. (2007) Two New Species of *Sambomorpha* Obenberger, 1924 (Coleoptera: Buprestidae) from Costa Rica and Panamá. *The Coleopterists Bulletin*, 61 (3), 471–475.
[http://doi.org/10.1649/0010-065X\(2007\)61\[471:TNSOSO\]2.0.CO;2](http://doi.org/10.1649/0010-065X(2007)61[471:TNSOSO]2.0.CO;2)
- Bellamy, C. y Westcott, R. (1995) A revision of the *Omochyseus* Waterhouse genus-group (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae). *Annals of the Transvaal Museum*, 36 (14), 193–203.
- Boucher, S. (2006) Évolution et phylogénie des coléoptères Passalidae (Scarabaeoidea). Les taxons du groupe famille la tribu néotropical des Proculini et son complexe Veturius. *Annales de la Société Entomologique de France*, 41, 239–603.
<http://doi.org/10.1080/00379271.2005.10697444>
- Brojer. M., Jäch, M. (2011) Update on the hydraenid fauna of Costa Rica, with descriptions of six new species (Coleoptera: Hydraenidae). *Koleopterologische Rundschau*, 81, 69–92.
- Brunke, A., y Solodovnikov, A. (2014) A revision of the Neotropical species of *Bolitogyrus* Chevrolat, a geographically disjunct lineage of Staphylinini (Coleoptera, Staphylinidae). *Zookeys*, 423, 1–113.
<https://doi.org/10.3897/zookeys.423.7536>
- Caterino, M. (1999) *The taxonomy and phylogenetics of the Coenosus Group of Hister Linnaeus* (Coleoptera: Histeridae). University of California Press, Estados Unidos. 119, 75 pp.
Disponible en:
https://books.google.co.cr/books/about/The_Taxonomy_and_Phylogenetics_of_the_Co.html?id=LbcwDwAAQBAJ&hl=en&output=html_text&redir_esc=y (consultado 17 junio 2024).
- Caterino, M. (2004) Taxonomy of the *Hister criticus* group, with description of a new species (Coleoptera: Histeridae). *Zootaxa*, 601, 1–16.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.601.1.1>
- Caterino, M., Tishechkin, A. (2008) A review of *Hippeutister* Reichensperger with new species from California and Costa Rica (Coleoptera: Histeridae: Hetaeriinae). *Zootaxa*, 1895, 39–52.

- <http://doi.org/10.5281/zenodo.184407>
- Caterino, M., Tishechkin, A. (2012) A systematic revision of *Operclipygus* Marseul (Coleoptera, Histeridae, Exosternini). *Zookeys*, 271, 1–401.
<https://doi.org/10.3897/zookeys.271.4062>
- Caterino, M., y Tishechkin, A. (2013) A systematic revision of *Baconia* Lewis (Coleoptera, Histeridae, Exosternini). *Zookeys*, 343, 1–297.
<https://doi.org/10.3897/zookeys.343.5744>
- Chemsak, J., Hovore, F. (2002b) New Mexican and Central American species of Acanthoderini with notes on others, part II (continued). (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Les Cahiers Magellanes*, 16, 1–26.
- Clark, S. (1993) A new genus and two new species of Luperini (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) from Costa Rica. *Insecta Mundi*, 7 (4), 215–218.
<http://doi.org/10.1080/00222933.2021.1890849>
- Cook, J. (2002) A revision of the Neotropical genus *Cryptocanthus* Balthasar (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). *Coleopterists Bulletin*, 56 (1), 3–96.
[http://doi.org/10.1649/0010-065X\(2002\)56\[3:AROTNG\]2.0.CO;2](http://doi.org/10.1649/0010-065X(2002)56[3:AROTNG]2.0.CO;2)
- Curletti, G. (2010a) New species of *Agrilus* from Nicaragua and Costa Rica. *Fragmenta entomologica*, 42 (2), 493–498.
<https://doi.org/10.4081/fe.2010.217>
- Curletti, G. (2010b) New species of the genus *Agrilus* Curtis, 1825, from Nicaragua and Panamá (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae). *Zootaxa*, 2333, 59–68.
<http://doi.org/10.11646/zootaxa.2333.1.4>
- Doyen, J. (1995) A new genus and four new species of Coelometopini from Mesoamerica (Coleoptera: Tenebrionidae). *The Coleopterists Bulletin*, 49 (1), 8–14.
- Duckett, C., Daza, D. (2004) A new species of flea beetle in the genus *Alagoasa* Bechyné (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) from highland Costa Rica. *The Coleopterist Bulletin*, 58 (1), 84–96.
<http://doi.org/10.1649/608>
- Erwin, T. (2000) Arboreal Beetles of Neotropical Forests: *Agra* Fabricius, the Novaurora Complex (Coleoptera: Carabidae: Lebiini: Agrina). *Smithsonian Contributions to Zoology*, 608, 1–33.
- Fikáček, M. (2009) Taxonomic revision of the New World species of the genus *Oosternum* Sharp III. A new species of the *O. aequinoctiale* species group from Costa Rica (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Koleopterologische Rundschau*, 79, 179–187.
- Fikáček, M., Hebauer, F. (2009) Taxonomic revision of the New World species of the genus *Oosternum* Sharp (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) II. The *Oosternum convexum* species group. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 49 (1), 103–117.
- Fikáček, M., y Short, A. (2010) A revision of the Neotropical genus *Sacosternum* Hansen (Hydrophilidae: Sphaeridiinae: Megasternini). *Zootaxa*, 2538, 1–37.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.2538.1.1>
- Filippini, V., Galante, E., Micó, E. (2015a) Description of new species of *Anomala* Samouelle from Costa Rica. *The Coleopterists Bulletin*, 69 (3), 463–476.
<https://doi.org/10.1649/0010-065X-69.3.463>
- Filippini, V., Galante, E., Micó, E. (2015b) Description of six new species of Anomalini from Costa Rica (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). *Zootaxa*, 3948 (1), 24–40.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.3948.1.2>

- Filippini, V., Micó, E., Galante, E. (2013) Redescription of *Anomala eucoma* Bates, 1888 and a description of three new species from Costa Rica (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). *Zootaxa*, 3670 (2), 255–273.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.3670.2.9>
- Filippini, V., Micó, E., Galante, E. (2014a) Description of eight new *Anomala* species from Costa Rica (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 2 (6), 107–122.
- Filippini, V., Micó, E., Galante, E. (2014b) Description of eight new *Anomala* species from Costa Rica (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 2 (6), 107–122.
<https://entomoljournal.com/vol2Issue6/pdf/8.1.pdf>
- Filippini, V., Micó, E., Galante, E. (2015a) *Anomala trapezifera* species-group: a burst of diversity (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.
<http://doi.org/10.1080/00379271.2015.1054646>
- Filippini, V., Micó, E., Galante, E. (2015b) Descriptions of New Species of *Anomala* Samouelle (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) from Costa Rica. *The Coleopterists Bulletin*, 69 (3), 463–476.
<http://doi.org/10.1649/0010-065X-69.3.463>
- Filippini, V., Micó, E., y Galante, E. (2015c) The genus *Callistethus* (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) in the Neotropics: New data and new species from Costa Rica. *Arthropod Systematics and Phylogeny*, 73 (2), 199–238.
<http://doi.org/10.3897/asp.73.e31796>
- Filippini, V., Micó, E., y Galante, E. (2015d) *Anomala trapezifera* species-group: a burst of diversity (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 51 (2), 93–139.
<https://doi.org/10.1080/00379271.2015.1054646>
- Filippini, V., Micó, E., y Galante, E. (2015e) Description of two cryptic species of *Anomala* Samouelle from Costa Rica. *Dugesiana*, 22 (1), 215–220.
- Flowers, R. (2003) A new genus and a new Costa Rican species of *Endocephalites* (Chrysomelidae: Eumolpinae: Eumolpini). *Zootaxa*, 221, 1–11.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.221.1.1>
- Flowers, R. (2004a) A review of the Neotropical genus *Prionodera* Chevrolat (Coleoptera, Chrysomelidae, Eumolpinae with description of a new genus. *Zootaxa*, 6312, 1–54.
<http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.631.1>
- Flowers, R. (2004b) *Cryocolaspis*, a new genus and species of Eumolpinae (Chrysomelidae) from Costa Rica. *The Coleopterist Bulletin*, 58(1), 97–101.
<https://doi.org/10.1649/607>
- Flowers, R. (2004c) New flightless Eumolpinae of the genera *Apterodina* Bechyné and *Brachypterodina* n. gen. (Coleoptera: Chrysomelidae) from the Neotropics, *Zootaxa*, 549, 1–18; 12–13.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.549.1>
- Flowers, R. (2018) A review of the genus *Beltia* Jacoby (Chrysomelidae: Eumolpinae: Eumolpini), with descriptions of fourteen new species from Costa Rica, Panama, and northwestern South America. *Insecta Mundi*, 0672, 1–43.

- Flowers, W. (1997) Revision of the genus *Cayetunya* Bechyné, with descriptions of three new species. *The Coleopterist Bulletin*, 51 (4), 384–399.
- Galileo, H., Martins de Souza, R. (2005a) Novos taxons de Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae) da Região Neotropical. *Iheringia* (Série Zoologia), 95 (3), 269–279.
<https://doi.org/10.1590/S0073-47212005000300007>
- Galileo, M., y Martins de Souza, R. (2005b) Novos taxons de Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) sem carenas nos élitros da Região Neotropical. *Revista Brasileira de Entomologia*, 49 (1), 63–68.
<https://doi.org/10.1590/S0085-56262005000100007>
- Galileo, H., Martins U. (2008) *Eranina* Monné (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) and a new genus of Hemilophini. *Revista Brasileira de Entomologia*, 52 (3), 384–389.
<http://doi.org/10.1590/S0085-56262008000300011>
- García, A., Morón, M., Micó, E. Galante, E. (2009) Two new species of *Phyllophaga* Harris (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae) from Costa Rica. *Zootaxa*, 2062, 37–45.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.2062.1.3>
- Génier, F. (1996) A revision of the Neotropical genus *Ontherus* Erichson (Coleoptera: Scarabaeidae, Scarabaeinae). *Memoirs of the Entomological Society of Canada*, 1128 (170), 1–169.
<http://doi.org/10.4039/entm128170fv>
- Giesbert, E. (1997) Further studies in the Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae, Lepturinae) of Central America. *Occasional Papers of the Consortium Coleopterorum*, 1, 17–42.
- Giesbert, E. (1998) Further studies in the Neotropical Callichromatini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Occasional Papers of the Consortium Coleopterorum* 2, 60–64.
- Hamilton, R. (2010) Central American *Temnocerus* Thunberg, 1815 (Coleoptera: Rhynchitidae). *Insecta Mundi*, 128, 1–42.
- Hamilton, R. (2012) New Species of Central American *Eugnamptus* Schoenherr (Coleoptera: Rhynchitidae). *Journal of the Kansas Entomology Society*, 85 (4) 318–331.
<http://doi.org/10.2307/23356035>
- Hamilton, R., y Novinger, A. (2004) *Eugnamptine* weevils of La Selva, Costa Rica (Coleoptera: Rhynchitidae). *Zootaxa*, 610, 1–43.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.610.1.1>
- Hawks, D. (1999) A review of the *Plusiotis marginata* complex including the description of a new species (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). *Occasional Papers of the Consortium Coleopterorum* 3, 21–29.
- Hespenheide H. (1990) Buprestidae of the subfamilies Agrilinae, and Trachyinae from the Chamela Biological Station, Jalisco. *Folia Entomológica Mexicana* 77, 141–210.
- Hespenheide, H. (2002) A review of North and Central American *Paragrilus* Saunders, 1871 (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae). *Zootaxa*, 43, 1–28.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.43.1>
- Hespenheide, H. (2005) Weevils of the genera *Archocopturus* Heller and *Zygopsella* Champion: sibling species and mimetic homoplasy (Coleoptera: Curculionidae: Conoderinae). *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 107, 671–85.
- Hespenheide, H. (2006) New species and new records of Neotrachys *Obenberger*, 1923, from Central America and the Antilles (Coleoptera: Buprestidae). *The Pan-Pacific Entomologist*, 82 (2), 223–241.
- Hespenheide, H. (2007a) A new genus and species of Buprestidae (Coleoptera) from Costa Rica. *Folia Heyrovskyana*, 15 (1), 1–6.

- Hespenheide, H. (2007b) Two new species of *Lissoderes* Champion, 1906 (Coleoptera: Curculionidae: Conoderinae) with comments on the ecology of the genus. *The Coleopterists Bulletin*, 61 (4), 604–110.
[https://doi.org/10.1649/0010-065X\(2007\)61\[604:TNSOLC\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1649/0010-065X(2007)61[604:TNSOLC]2.0.CO;2)
- Hespenheide, H. (2009) Two new weevils (Coleoptera: Curculionidae: Conoderinae) from Cocos Island, Costa Rica. *The Coleopterists Bulletin*, 63 (3), 333–339.
<http://doi.org/10.1649/1158>
- Hespenheide, H. (2010) New *Agrilus* Curtis (Coleoptera: Buprestidae) from México and Costa Rica mimicking parasitic wasps. *Zootaxa*, 2545 (2545), 39–46.
- Hespenheide, H. (2012) New Mexican and Central American species of *Agrilus* Curtis (Coleoptera: Buprestidae) mimetic of flies. *Zootaxa*, 3181, 1–27; 21–22.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.3181.1.1>
- Hespenheide, H., LaPierre, L. (2002) A review of *Ptous* Champion (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 104, 856–862.
- Hespenheide, H., LaPierre, L. (2006) A Review of *Pseudolechriops* Champion (Coleoptera: Curculionidae: Conoderinae). *Zootaxa*, 1384, 1–39.
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.175062>
- Hilje, L. (2023) Los pioneros de la entomología en Costa Rica. *Revista de Biología Tropical*, 71, 1–41.
- Hovore, F., y Santos-Silva, A. (2007) Novas espécies de *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae). *Papéis Avulsos de Zoologia*, 47 (5), 75–96.
<https://doi.org/10.1590/S0031-10492007000500>
- Howden, H., Gill, B. (1993) Mesoamerican *Onthophagus* Latreille in the *Dicranus* and *Mirabilis* species groups (Coleoptera: Scarabaeidae). *The Canadian Entomologist*, 125 (6), 1091–1114.
<http://dx.doi.org/10.4039/Ent1251091-6>
- Howden, H., Solís, A. (1995) Two New Species of Geotrupinae (Coleoptera: Scarabaeidae) from Costa Rica. *The Coleopterists Bulletin*, 49 (3), 261–266.
- Howden, Gill, (2003) The Mexican and Central American Species of *Astaenomoechus* (Coleoptera, Scarabaeidae, Ceratocanthinae). *Sociobiology*, 42 (2), 201–242.
- Irmmler, U. (2007) The *Tannea* (Coleoptera: Staphylinidae: Osoriinae) species of Costa Rica - new species and records, a key, ecological, and geographical remarks. *Brenesia*, 68, 69–85.
- Ivie, M., Ślipiński, S. (2005) New species and records of Costa Rican Passandridae (Cucujoidea). *The Coleopterists Bulletin*, 59, 459–63.
[http://doi.org/10.1649/0010-065X\(2000\)054\[0284:NSAROP\]2.0.CO;2](http://doi.org/10.1649/0010-065X(2000)054[0284:NSAROP]2.0.CO;2)
- Jameson, M., Paucar, A., Solís, A. (2003) Synopsis of the new world genera of Anomalini (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) and description of a new genus from Costa Rica and Nicaragua. *Annals of the Entomological Society of America*, 96 (4), 415–432.
[http://doi.org/10.1603/0013-8746\(2003\)096\[0415:SOTNWG\]2.0.CO;2](http://doi.org/10.1603/0013-8746(2003)096[0415:SOTNWG]2.0.CO;2)
- Johnson, P. (2000) New species and records of *Platycrepidius* Candèze from Costa Rica and Panamá (Coleoptera: Elateridae). *The Coleopterists Bulletin*, 54 (3), 284–290.
[https://doi.org/10.1649/0010-065X\(2000\)054\[0284:NSAROP\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1649/0010-065X(2000)054[0284:NSAROP]2.0.CO;2)
- Kazantsev, S. (2005) Net-winged beetles of the genus *Calolycus* Gorham, 1881, with notes on *Plateros* Bourgeois, 1882 (Coleoptera: Lycidae). *Russian Entomological Journal*, 14 (3), 203–208.
- Kohlmann, B. (1996) The Costa Rican species of *Ateuchus* (Coleoptera: Scarabaeidae). *Revista Biología Tropical*, 44 (3) / 45 (1), 177–192.

- Kohlmann, B., Solís, A. (1996) Una nueva especie de *Scatimus* (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) de Costa Rica. *Giornale Italiano Di Entomologia*, 8, 99–103.
- Kohlmann, B., Solís, A. (1997) El género *Dichotomius* (Coleoptera: Scarabaeidae) en Costa Rica. *Giornale Italiano di Entomologia*, 8, 343–382.
- Kohlmann, B., Solís, A. (2001a) A new species of *Phanaeus* Macleay (Coleoptera: Scarabaeidae, Scarabaeinae) from Costa Rica and Panama. *Besoiro*, (6), 9–11.
- Kohlmann, B., Solís, A. (2001b) El género *Onthophagus* (Coleoptera: Scarabaeidae) en Costa Rica. *Giornale Italiano di Entomologia*, 49 (9), 159–261.
- Kohlmann, B., Solís, A. (2006) New species of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) from Mexico and Costa Rica. *Zootaxa*, 1302, 61–68.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.1302.1.5>
- Kohlmann, B., Solís, A. (2009) New species of *Ateuchus* and *Canthidium* (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) from Costa Rica. *Zootaxa*, 2219, 31–37.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.190015>
- Kohlmann, B., Solís, A. (2012) New species and revalidations of scarab beetles (Coleoptera: Geotrupidae: Athyreini and Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) from Costa Rica and Panama. *Zootaxa*, 3193, 28–52.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.3193.1.2>
- Kohlmann, B., Solís, A., Alvarado, G. (2019) Description of *Onthophagus humboldti* and *Uroxys bonplandi*, two new scarab beetles from Costa Rica, with notes on tropical mountain brachyptery and endemism. *ZooKeys*, 881, 23–51.
<https://doi.org/10.3897/zookeys.881.38026>
- Komarek, A. (2005) Taxonomic revision of *Anacaena* Thomson, 1859. II Neotropical species (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau*, 75, 253–301.
- Mantilleri, A., Sforzi, A. (2006) Review of the Neotropical species of the genus *Stereodermus* Lacordaire, 1866 (Coleoptera: Brentidae, Stereodermini). *Zootaxa*, 1207, 3–64.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.1207.1.1>
- Márquez, J. (2003) Systematic revision of the genera *Homalolinus* and *Ehomalolinus* (Coleoptera, Staphylinidae, Xantholinini). *Zoologica Scripta*, 32 (6), 491–523.
<http://doi.org/10.1046/j.1463-6409.2003.00128.x>
- Márquez, J. (2010) Revision of the genus *Renda* Blackwelder, 1952 (Coleoptera: Staphylinidae: Xantholinini). *Zootaxa*, 2686, 1–61.
<http://doi.org/10.11646/zootaxa.2686.1.1>
- Martins, U., y Galileo M. (2004) Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), principalmente da Costa Rica. *Revista Brasileira de Zoologia*, 48 (4) 467–472.
<https://doi.org/10.1590/S0085-56262004000400007>
- Martins, U., y Galileo, M. (2008a) Neotropical Clytini II (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Revista Brasileira de Entomologia*, 52 (2), 272–276.
<http://doi.org/10.1590/S0085-56262008000200006>
- Martins, U., y Galileo, M. (2008b) New species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Costa Rica and Ecuador. *Papéis Avulsos de Zoologia*, 49 (10), 109–114.
- Martins, U., y Galileo M. (2008c) Novos taxons e novo registro em Hemilophini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Revista Brasileira de Zoologia*, 25 (3), 547–554.
<https://doi.org/10.1590/S0101-81752008000300022>

- Martins, U., y Galileo, M. (2009). New species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Costa Rica and Ecuador. *Papéis Avulsos de Zoologia* 49 (10):109-113.
- McCarty, J. (2006) A review of the Mexican species of *Antodice* Thomson of México & Central América (Coleoptera, Cerambycidae). *Les Cahiers Magellanes*, 53, 23.
- Moravec, J., Brzoska, D. (2013) Taxonomic and nomenclatorial revision within the Neotropical genera of a subtribe Odontochilina W. Horn in a new sense – 5. A new species of the genus *Pentacomia* from Costa Rica (Coleoptera: Cicindelidae). *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae*, 98 (1), 75–84.
<http://doi.org/10.11646/zootaxa.4097.3.2>
- Moret, P., Cassale, A. (1998) Description et phylogénie de quatre espèces nouvelles de *Dyscolus* du Costa Rica (Coleoptera, Carabidae, Platynini). *Revue Francaise d'Entomologie*, 20 (1/2), 61–72.
- Morón, M. (1992) Adiciones al género *Plusiotis* Burmeister, 1844. *Giornale Italiano Di Entomologia* 6 (30), 59–78.
- Morón, M. A. (2001) Revision of the rugipennis group of *Phyllophaga* (sensu stricto) Harris. *Annals of the Entomological Society of America*. Columbus 94 (6), 771–808
- Morón, M., Solís, A. (1994) El género *Phyllophaga* en Costa Rica, Primeros registros de los subgéneros *Chirodines* Bates y *Listrichelus* Blanchard (Coleoptera: Melolonthidae, Melolonthinae). *Giornale Italiano di Entomologia*, 7, 181–185.
- Morón, M., Solís, A. (2001) Seven species of *Phyllophaga* (S.STR.) Harris from Costa Rica (Coleoptera: Melolonthidae: Melolonthinae). *The Coleopterists Bulletin*, 55 (1), 11–29.
[http://doi.org/10.1649/0010-065X\(2001\)055\[0011:SNSOPS\]2.0.CO;2](http://doi.org/10.1649/0010-065X(2001)055[0011:SNSOPS]2.0.CO;2)
- Morón, M. (2003) Revision of the *Phyllophaga* s.s. schizorhina species group (Coleoptera: Melolonthidae: Melolonthinae). *The Canadian Entomologist*, 135 (2), 213–302.
- Néstor-Arriola, J., Toledo-Hernández, V., Solís, A., González, G., Větrovec, J. (2021) The *Brachiacantha* Dejean, 1837 (Coleoptera, Coccinellidae) of Central America. *ZooKeys*, 1024, 157–196.
<http://doi.org/10.3897/zookeys.1024.56927>
- Opitz, W. (2004) Classification, Natural History, and Evolution of the Epiphloeinae Coleoptera: Cleridae). part ii. The genera *Chaetophloeus* Opitz and *Plocamocera* Spinola. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 280, 1–82.
[http://doi.org/10.1206/0003-0090\(2004\)280%3C0001:CNHAE0%3E2.0.CO;2](http://doi.org/10.1206/0003-0090(2004)280%3C0001:CNHAE0%3E2.0.CO;2)
- Opitz, W. (2005) Classification, natural history, and evolution of the genus *Aphelocerus* Kirsch (Coleoptera: Cleridae: Clerinae). *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 293, 1–128.
- Opitz, W. (2006) Classification, natural history, and evolution of the Epiphloeinae (Coleoptera: Cleridae). Part III. The genera *Parvochaetus*, n. gen., *Amboakis*, n. gen., and *Ellipotoma* Spinola. *Insecta Mundi*, 20 (3-4), 97–163.
- Opitz, W. (2008) Classification, Natural History, and Evolution of Epiphloeinae (Coleoptera: Cleridae). Part VI. *Annales Zoologici*, 58 (1), 1–34.
- Opitz, W. (2011) Clasificación, historia natural y evolución de los Epiphloeinae (Coleoptera: Cleridae). Parte X. El género *Madoniella* Pic, 1935. *Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey*, 33, 133–248
- Opitz, W. (2013) Descriptions of new species of the New World genus *Perilypus* Spinola (Coleoptera: Cleridae: Clerinae). *Insecta Mundi*, 0305, 1–28.

- Opitz, W. (2014) Clasificación, historia natural y evolución de los Epiphloeinae (Coleoptera: Cleridae). Parte XI. Taxonomía genérica, filogenia intergenérica y catálogo de la subfamilia. *Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno)*, 99 (2), 5–94.
- Paulsen, M. (2013) A new genus for the Neotropical species of *Aesalus* Fabricius, with descriptions of eight new species (Coleoptera: Lucanidae: Aesalinae). *Insecta Mundi*, 0325, 1–25.
- Peck, S., Cook, J. (2003) Neotropical species of *Dietta* (Coleoptera: Leiodidae: Leiodinae: Estadiini). *The Canadian Entomologist*, 135, 775–810.
<http://doi.org/10.4039/N02-111>
- Peck, S., Cook, J. (2005) The genus *Eucatops* of Costa Rica (Coleoptera: Leiodidae, Cholevinae, Eucatopini). *The Canadian Entomologist*, 137 (3), 283–303.
<http://doi.org/10.4039/N05-010>
- Prena, J. (2001) A revision of the Neotropical weevil genus *Pantoteles* Schönherr (Coleoptera, Curculionidae, Baridinae). *Transactions of the American Entomological Society* 127 (3), 305–358.
- Prena, J. (2003a) The Middle American species of *Ambates* Schoenherr: (Coleoptera: Curculionidae: Baridinae). *Beiträge zur Entomologie. Contributions to Entomology*, 53 (1), 167–198.
- Prena, J. (2003b) The *Pardisomus* species from Costa Rica, with descriptions of four new species and one larva (Coleoptera: Curculionidae: Baridinae). *Beiträge zur Entomologie. Contributions to Entomology*, 53 (1), 199–216.
- Prena, J. (2005) The Middle American species of *Embates* Chevrolat (Coleoptera: Curculionidae: Baridinae). *Zootaxa*, 1100, 1–151.
- Prena, J. (2006a) A preliminary study of *Cylindridia* Casey, with descriptions of new species from Middle America (Coleoptera: Curculionidae: Baridinae). *Beiträge zur Entomologie*, 56–1.
- Prena, J. (2006b) Descriptions of *Palliolatrix* gen.n. and seven new species from Middle America (Coleoptera: Curculionidae: Baridinae). *Zootaxa*, 1319, 15–28.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.1319.1>.
- Prena, J. (2009) *Floromadane*, a new genus of baridine weevils associated with Rubiaceae in Costa Rica and Panama (Coleoptera: Curculionidae: Baridinae). *Beiträge zur Entomologie*, 59 (1), 239–246.
- Prena, J. (2010) The Middle American species of *Peridinetus* Schönherr (Coleoptera: Curculionidae: Baridinae). *Zootaxa*, 2507, 1–36.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.2507.1.1>
- Prena, J., Nishida, K. (2005) *Thanius biennis*, a new gall-inducing weevil with a two-year life cycle from Costa Rica (Coleoptera: Curculionidae: Baridinae). *Beiträge zur Entomologie*, 55 (1), 141–150.
- Prena, J., Whitehead, D. (2012) A taxonomic revision of the Neotropical weevil genus *Cleogonus* Schönherr (Curculionidae, Molytinae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 59 (1), 55–79.
- Puthz, V. (2007) New Neotropical *Edaphus*-species (Coleoptera: Staphylinidae). *Amazoniana*, 19 (3/4), 97–130.
- Puthz, V. (2013) Six new neotropical species of the genus *Stenus* Latreille, 1797 (Coleoptera: Staphylinidae). *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins*, 38 (3/4), 89–100.
- Ratcliffe, B. (2003) The Dynastine scarab beetles of Costa Rica and Panama (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae). *Bulletin of the University of Nebraska State Museum*, 16, 1–506.
- Ratcliffe, B., Solís, A. (2013) The Southernmost *Orizabus* Fairmaire (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae: Pentodontini): Description of a New Species from Costa Rica. *The Coleopterists Bulletin*, 67 (1), 1–6.

- <http://doi.org/10.2307/41819800>
- Rifkind, J. (2002) New Central American and Mexican *Enoclerus* (Coleoptera: Cleridae). *Contributions in Science*, 487, 1–16.
<http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3397.1>.
- Salgado, J. (2010) Nuevos datos y nuevas especies del género *Dissochaetus* Reitter, 1884 de la región Neotropical. Reorganización en grupos de las especies de *Dissochaetus* (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 47, 149–163.
- Salgado, J. (2011) Nuevas especies y nuevos datos de Anemadini y Ptomaphagini de Costa Rica (Coleoptera, Leiodidae, Cholevinae). *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 35 (3–4), 421–442.
- Santos-Silva, A., Hovore, F. (2008) Novas espécies de Disteniinae americanas (Coleoptera, Cerambycidae). *Les Cahiers Magellanes*, 81, 1–16.
- Shepard, W., Barr, C. (2014) *Neoeubria inbionis* Shepard & Barr, a new genus and new species of Neotropical water penny beetle (Coleoptera: Psephenidae: Eubriinae), with a key to the adult Eubriinae of the Neotropic Zone. *Zootaxa*, 3811 (4), 553–568.
<http://doi.org/10.11646/zootaxa.3811.4.7>
- Short, A. (2004a) A new genus and species of Sphaeridiinae from Costa Rica (Coleoptera: Hydrophilidae). *The Coleopterists Bulletin*, 58 (4), 534–537.
<http://doi.org/10.1649/375>
- Short, A. (2004b) Review of the Central American species of Hydrobiomporpha Blackburn (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau*, 74, 363–366.
- Short, A. (2005a) A review of the subtribe Acidocerina of Central America with special reference to Costa Rica (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau*, 75, 191–226.
- Short, A. (2005b) Two new species of *Enochrus* Thomson, subgenus *Hugoscottia* Knisch, from Costa Rica and Mexico. *Zootaxa*, 865, 1–7.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.865.1.1>
- Short, A., Perkins, P. (2004) Revision of *Oocyclus* Sharp of Mexico and Central America (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa*, 783, 1–45.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.783.1>.
- Skelley, P., Howden, H. (2003) A new species of *Lomanoxia* Martínez from Costa Rica (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae). *Insecta Mundi*, 17 (3–4), 185–190.
- Smith, A. (2003) A new species of *Phalangogonia* Burmeister (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae: Anoplognathini) from Costa Rica. *Zootaxa*, 316, 1–4.
<http://doi.org/10.11646/zootaxa.316.1.1>
- Solís, A., Kohlmann, B. (2002) El género *Canthon* (Coleoptera: Scarabaeidae) en Costa Rica. *Giornale Italiano di Entomologia*, 10 (50), 1–68.
- Solís, A., Kohlmann, B. (2003) New species of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) from Costa Rica and Panamá. *Zootaxa*, 139, 1–14.
<http://doi.org/10.11646/zootaxa.139.1.1>
- Solís, A., Kohlmann, B. (2004) El género *Canthidium* (Coleoptera: Scarabaeidae) en Costa Rica. *Giornale Italiano di Entomologia*, 52 (11), 1–73.
- Solís, A., Kohlmann, B. (2022) *Dichotomius woodruffi*, a new *Dichotomius* species of the agenor group from Costa Rica and Nicaragua (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). *Insecta Mundi*, 0918, 1–12.
- Solís, A., Morón M. (1994) Nuevas especies de Rutelini (Coleoptera: Melolonthidae: Rutelinae) del sureste Costa Rica. *Folia Entomológica Mexicana*, 92, 31–41.

- Solís, A., y Morón, M. (1998) Neotropical genus *Platyrutela* Bates (Coleoptera: Melolonthidae). *Annals of the Entomological Society of America*, 91 (3), 269–278.
<https://doi.org/10.1649/0010-065X-72.2.368>
- Soula, M. (1998) Rutelini 2, Revision des Anticheirina 1. *Les Coléoptères Du Monde*, 26 (1), 1–116
- Soula, M. (2002) Révision des Anticheirina 2. *Les Coléoptères Du Monde*, 26 (2), 117–296.
- Staines, C. (1996) The genus *Cephaloleia* (Coleoptera: Chrysomelidae) in Central America and the West Indies. *Revista de Biología Tropical*, 3 (3), 87.
- Staines, C. (1998) A new species of *Cephaloleia* Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae: Hispinae) from Costa Rica. *Proceedings of the Washington Entomological Society*, 100 (4), 672–673.
- Staines, C. (2002) Nomenclatural notes and new species of Sceloenoplini (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). *Zootaxa*, 89, 1–32.
<http://doi.org/10.11646/zootaxa.89.1.1>
- Stebnicka, Z., Skelley, P. (2005) Review of some New World Aphodiine genera and descriptions of new species. *Acta Zoologica Cracoviensia*, 48B (1–2), 23–42.
<http://doi.org/10.3409/173491505783995671>
- Strother, M., Staines, C. (2008) A revision of the New World genus *Fidia* Baly 1863 (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae: Adoxini). *Zootaxa*, 1798, 1–100.
- Trezzi, G. (1995) Una nuova specie di *Paratrechus* Jeannel del Costa Rica (Coleoptera: Carabidae: Trechinae). *Giornale Italiano di Entomologia*, 7 (41), 351–353.
- Wells, S. (2007) Review of the Neotropical click beetle genus *Semiotus* Eschscholtz (Coleoptera: Elateridae). *Contributions in Science*, 514, 1–114.
<https://doi.org/10.3389/frsc.2022.954089>