Check for updates

CARTA AL EDITOR

La revascularización y el salvamento de las extremidades inferiores en pacientes diabéticos

Revascularization and limb salvage in diabetic patients

Galo Yang-Narváez, Alejandra J. Escobar-Moreno, Paulina D. Santoyo-Mundo, Juan A. Maza-Avendaño y Diego A. Hernández-Escobar*

Facultad de Medicina Humana C-II Dr. Manuel Velasco Suárez, Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Sr. Editor:

Expresamos nuestro interés en el artículo titulado «Impacto de la revascularización y factores en el salvamento de la extremidad en pacientes con pie diabético»[1]. Este trabajo es de gran relevancia desde el punto de vista clínico y social, pues el pie diabético es una de las complicaciones más comunes de la diabetes *mellitus,* y sin importar los avances en el tratamiento sigue comportando un índice alto de amputaciones mayores y generando un alto costo para los sistemas de salud.

El estudio destaca la importancia de la revascularización como herramienta terapéutica para mejorar la perfusión tisular y favorecer el salvamento de la extremidad del paciente, aun cuando los resultados son limitados[1]. Consideramos que esta información aporta significativamente al conocimiento clínico sobre el manejo de las complicaciones del pie diabético, y además estamos en total acuerdo en que la referencia temprana a cirugía vascular y la implementación de criterios de evaluación específicos reducen la probabilidad de amputación[1].

Sugerimos que podría enriquecer el estudio considerar algunas recomendaciones sobre el manejo integral del pie diabético, incluyendo la revascularización y el control estricto de la glucosa. Según Hernández et al.[2], un control adecuado de la glucosa y el tratamiento de las úlceras, sumado a la revascularización, mejoran significativamente las tasas de cicatrización y reducen la cifra de amputaciones. Por su parte, Gonzáles et al.[3] mencionan que, en México, las tasas de amputación han incrementado un 30%, principalmente en aquellos pacientes con enfermedad arterial periférica y diabetes descontrolada.

Hoy en día la población mexicana tiene una tasa mayor de susceptibilidad y el número de datos arrojados de las complicaciones relacionadas con el pie diabético es más alto, lo que resalta la necesidad de concienciar a la población sobre la prevención de dicho problema, evitando aumentar el número de hospitalizaciones y de amputaciones.

Concluimos que la revascularización constituye una alternativa efectiva y mínimamente invasiva para el tratamiento de las lesiones en los miembros inferiores en pacientes diabéticos, y asimismo se sugiere un abordaje terapéutico complementario, combinando el manejo integral y el seguimiento adecuado, observando una mejoría notable del pronóstico clínico de los pacientes.

Agradecimientos

Los autores agradece al Dr. A.G. Yang-Soto por su apoyo, asesoría y contribución a este manuscrito.

Financiamiento

No hubo financiamiento.

***Correspondencia:**
Galo Yang-Narváez
E-mail: galonarvaez71@gmail.com

Fecha de recepción: 18-10-2025
Fecha de aceptación: 05-11-2025
DOI: 10.24875/GMM.25000441

Gac Med Mex. 2026;162:470-471
Disponible en PubMed
www.gacetamedicademexico.com

0016-3813/© 2025 Academia Nacional de Medicina de México, A.C. Publicado por Permanyer. Este es un artículo *open access* bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Consideraciones éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad, consentimiento informado y aprobación ética. El estudio no involucra datos personales, historias clínicas ni muestras biológicas humanas, por lo que no requiere aprobación ética. No se aplican las guías SAGER.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial. Los autores declaran que no utilizaron ningún tipo de inteligencia artificial generativa para la redacción de este manuscrito.

Referencias

1. Hinojosa CA, Boyer-Duck E, Anaya-Ayala JE, Núñez- Salgado AE, Laparra- Escareno H, Lizola R. Impacto de la revascularización y factores asociados en el salvamento de la extremidad en pacientes con pie diabético. Gac Med Mex. 2018;154: 190-7.
2. Hernández JM, López MT, Sánchez E. Impacto del control glucémico en la evolución del pie diabético en México. Estudio de cohortes. Rev Mex Endocrinol Metab. 2020;vol: pp.
3. Gonzáles R, Díaz AP, Torres C. Análisis de la prevalencia de amputaciones por pie diabético en hospitales de México: un enfoque nacional. Rev Mex Angiol. 2021;vol: pp.