



Mortalidad materna por COVID-19 en México

Maternal mortality from COVID-19 in Mexico.

Francisco Ibargüengoitia Ochoa, Josefina Lira Plascencia, Cintia Sepúlveda

Resumen

OBJETIVO: Conocer la mortalidad materna por COVID-19 en México.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis descriptivo de casos de mortalidad obtenidos de los Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas 2020 de la Secretaría de Salud.

RESULTADOS: Los primeros casos de muerte materna por COVID-19 en México se registraron en la semana epidemiológica 15 (6 a 12 de abril de 2020) con 2 casos. Revisión hasta la semana epidemiológica 29 (13 a 19 de julio de 2020) con 85 casos que representa el 18.5% de las muertes, acumulando 499 casos a esa fecha y el primer lugar de causa de mortalidad desde la semana 28. La tasa de letalidad de COVID-19 en el embarazo es de 1.2%.

CONCLUSIONES: La infección por COVID-19 desplazó a las causas directas de mortalidad como principal causa de muerte en el estado grávido-puerperal en México y su incidencia se está incrementando.

PALABRAS CLAVE: Mortalidad materna; COVID-19.

Abstract

OBJECTIVE: Know maternal mortality from COVID-19 infection in Mexico.

MATERIAL AND METHOD: Review of mortality cases obtaining information from weekly reports for epidemiological surveillance of maternal deaths 2020.

RESULTS: The first cases of maternal death from COVID-19 infection in Mexico were registered in epidemiological week 15 (April 6-12) with 2 cases. Review until epidemiological week 29 (July 13-19) with 81 cases representing 18.5% of deaths, accumulating 499 cases as of this date, being the first place as a cause of mortality since week 28. The fatality rate of COVID-19 in pregnancy is 1.2%.

KEYWORDS: Maternal mortality; COVID-19.

Colegio Mexicano de Especialistas en
Ginecología y Obstetricia, AC.

Recibido: Junio 2020

Aceptado: Agosto 2021

Correspondencia

Josefina Lira Plascencia
drajosefinalira@yahoo.com.mx

Este artículo debe citarse como:

Ibargüengoitia-Ochoa F, Lira-Plascencia J, Sepúlveda C. Mortalidad materna por COVID-19 en México (Resumen). Ginecol Obstet Mex. 2021; 89 (9): 748.

MACROZIT[®] G

azitromicina

1 sola
toma¹

Tratamiento de una
sola dosis en ETS*.

*causadas por *Chlamydia trachomatis*
y *Neisseria gonorrhoeae*¹



Indicado para el tratamiento de la pareja.²

Caja con 4 tabletas.
500 mg.



Dosis única de 1 g.¹

EL
ANTIBIÓTICO
CON EFECTO
POST
ANTIBIÓTICO³

REFERENCIAS: 1. Información para prescribir Macrozit[®] Tabletas 2. Ángeles R. et al. Contribución al estudio de la prevalencia de la infección por clamidia en parejas con infertilidad. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. [S.l.]. v. 45, n. 3, p. 167-171, mayo 2015 3. AHFS. Drug Information [Internet]. 2019. Available from: <https://www.medicinescomplete.com/#/content/ahfs/a300005>.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@liomont.com.mx o en la página de internet: www.liomont.com.mx

Aviso de publicidad No.: 203300202C3559

Reg. No.: 015M2001 SSA IV (Tabletas).

LIOMONT
ÉTICA FARMACÉUTICA DESDE 1938