

## AVANCES EN LA PSIQUIATRÍA

### Autoevaluación

Sección a cargo de Gerhard Heinze

1. Para Kendler ¿cuáles rasgos de la personalidad influyen en la presentación de los eventos estresores y en la forma en que se perciben y manejan éstos?:

- a) Los de personalidad heredables (temperamento).
- b) Los de personalidad dependiente.
- c) Los de personalidad histriónica.
- d) Los de personalidad limítrofe.
- e) Los de personalidad antisocial.

Heinze G, Vargas B, Cortés J. Síntomas psiquiátricos y rasgos de personalidad en dos grupos opuestos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

2. El modelo de los cinco factores o «Big Five» propone cinco dimensiones fundamentales para describir y evaluar la personalidad EXCEPTO:

- a) La extroversión.
- b) La amabilidad.
- c) La responsabilidad.
- d) El neuroticismo.
- e) La introyeción.

Heinze G, Vargas B, Cortés J. Síntomas psiquiátricos y rasgos de personalidad en dos grupos opuestos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

3. La Encuesta Nacional de Adicciones realizada en el 2002 señala que por cada 4 hombres que han consumido drogas hay:

- a) una mujer que las ha consumido.
- b) dos mujeres que las han consumido.
- c) tres mujeres que las han consumido.
- d) cuatro mujeres que las han consumido.
- e) cinco mujeres que las han consumido.

Castillo IP, Gutiérrez A. Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

4. Estudios preliminares han sugerido que algunos factores del ambiente familiar podrían influir en el consumo de tabaco en adolescentes como:

- a) Alto nivel educativo.
- b) Consumo de tabaco en familiares.

- c) Mayor nivel económico.
- d) Consumo de cocaína entre amigos.
- e) Familia con un solo parent.

Nuño-Gutiérrez BL, Álvarez-Nemegyel J, Velázquez-Castañeda A, Tapia-Curiel A. Comparación del ambiente familiar y el tipo de consumo de tabaco en adolescentes mexicanos de nivel medio superior. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

5. Los trastornos generalizados del desarrollo hacen referencia a un conjunto de alteraciones neuropsicológicas graves, generalizadas y heterogéneas cuyas manifestaciones afectan a tres componentes importantes del desarrollo como:

- a) Habilidades en la construcción de frases.
- b) Control del esfínter vesical.
- c) Control del esfínter anal.
- d) Habilidades en el lenguaje y en la comunicación.
- e) Habilidad de reconocerse a sí mismo.

López S, Rivas R, Taboada E. Detección de los riesgos maternos perinatales en los trastornos generalizados del desarrollo. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

6. ¿Los genes de cuál cromosoma están directamente implicados en el desarrollo del autismo?:

- a) El 3.
- b) El 7.
- c) El 11.
- d) El 15.
- e) El 22.

López S, Rivas R, Taboada E. Detección de los riesgos maternos perinatales en los trastornos generalizados del desarrollo. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

7. En el caso de los varones, la identificación con el rol de «proveedor económico» históricamente ha configurado una subjetividad masculina centrada en el poder asociado con la economía y la:

- a) Emotividad.
- b) Responsabilidad.
- c) Racionalidad.
- d) Educación.
- e) Madurez.

Fleiz C, Ito M, Medina-Mora M, Ramos L. Los malestares masculinos: Narraciones de un grupo de varones adultos de la Ciudad de México. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

8. La pérdida de la salud por sufrir alguna enfermedad crónica o una lesión son experiencias que producen malestar en los varones por su preocupación respecto al cuerpo y a la:

- a) Sexualidad.
- b) Pareja.
- c) Edad.
- d) Funcionalidad.
- e) Economía.

Fleiz C, Ito M, Medina-Mora M, Ramos L. Los malestares masculinos: Narraciones de un grupo de varones adultos de la Ciudad de México. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

9. El paradigma de las redes sociales abarca un conjunto de teorías, métodos y técnicas usadas para comprender las relaciones sociales y cómo éstas pueden influir en el comportamiento individual y:

- a) De la sociedad.
- b) De la familia.
- c) Del trabajo.
- d) De la pareja.
- e) Del grupo.

Galván J, Serna G, Hernández A. Aproximación de las redes sociales: una vía alterna para el estudio de la conducta del uso de drogas y su tratamiento. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

10. Algunos autores consideran que la violación de los derechos de los informantes de las investigaciones sociales pueden evitarse aplicando los principios universales de la ética de:

- a) La investigación científica.
- b) Las relaciones sociales.
- c) La aplicación del anonimato.
- d) La investigación.
- e) El enfoque de derechos.

Gutiérrez R, Vega L, Rodríguez E. Problemas y dilemas éticos en la investigación de la explotación sexual comercial de niñas y niños. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

11. De acuerdo con la tercera encuesta sobre consumo de drogas en población de enseñanza media y media superior de la Ciudad de México, el consumo de tabaco «alguna vez» a afectado a más del:

- a) 30% de los estudiantes.
- b) 40% de los estudiantes.
- c) 50% de los estudiantes.
- d) 60% de los estudiantes.
- e) 70% de los estudiantes.

Moreno A, Medina- Mora M. Tabaquismo y depresión. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

12. Ha probado tener excelentes resultados en el tratamiento de la sintomatología depresiva, ya que reduce la incidencia y la severidad de los síntomas al mismo tiempo que regulariza el sueño de los pacientes:

- a) El bupropión.
- b) La terapia de reemplazo de nicotina.
- c) La moclobemida.
- d) La nortriptilina.
- e) La fluoxetina.

Moreno A, Medina- Mora M. Tabaquismo y depresión. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

13. Produce una disminución adicional de flujo en las regiones parietotemporales y cerebelosas:

- a) Los ISRS.
- b) Los antidepresivos tricíclicos.
- c) Los antipsicóticos.
- d) Las benzodiacepinas.
- e) La terapia electroconvulsiva (TEC).

Gutiérrez-García A, Contreras C. El suicidio y algunos de sus correlatos neurobiológicos. Segunda parte. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.

*(Respuestas en la página 390)*