

## AVANCES EN LA PSIQUIATRÍA

### Autoevaluación

Sección a cargo de Gerhard Heinze

1. ¿Cuál es la tasa de prevalencia anual de la depresión en México?

- a) 7.5%.
- b) 8.9%.
- c) 30%.
- d) 4.8%.
- e) 12.8%.

Wagner F, González-Forteza C, Sánchez-García S et al. Enfocando la depresión como problema de salud pública en México. Salud Mental, 35(1) enero-febrero 2012.

2. ¿Para México según la Encuesta Mundial de Salud cuantos días productivos pierden las personas por la depresión?

- a) 27 días.
- b) 45 días.
- c) 39 días.
- d) 90 días.
- e) 7 días.

Wagner F, González-Forteza C, Sánchez-García S et al. Enfocando la depresión como problema de salud pública en México. Salud Mental, 35(1) enero-febrero 2012.

3. Es una escala útil y práctica para el tamizaje de la depresión:

- a) Hamilton D.
- b) Hamilton A.
- c) CES-D.
- d) WHODAS.
- e) SAGE.

González-Forteza C, Wagner F, Jiménez A. Escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) en México: análisis bibliométrico. Salud Mental, 35(1) enero-febrero 2012.

4. Es una metodología que podría ser útil para el manejo de datos incompletos en escalas:

- a) Análisis de supervivencia.
- b) Desviación estándar.
- c) Metodología de RAMOS.
- d) Media.
- e) Moda.

Bojorquez-Chapela I, Trejo B, Salgado de Snyder N. Aplicación del análisis estadístico de datos censurados para el manejo de respuestas incompletas en la escala CES-D. Salud Mental, 35(1) enero-febrero 2012.

5. Son los trastornos mentales más frecuentes en los adolescentes:

- a) Esquizofrenia y trastorno bipolar.
- b) Retraso mental y depresión.
- c) Fobia específica y social.
- d) Trastorno esquizoafectivo y TOC.
- e) Trastornos sexuales.

Andrade P, Betancourt D, Vallejo A et al. Prácticas parentales y sintomatología depresiva en adolescentes. Salud Mental, 35(1) enero-febrero 2012.

6. Las mujeres tienen teóricamente un mayor riesgo a sufrir depresión debido a:

- a) Los sucesos vitales estresantes se presentan con mayor frecuencia en ellas.
- b) El rol de la mujer en la sociedad contemporánea.
- c) El grado de estudios de la mujer.
- d) El papel de la política en la mujer.
- e) Les gusta hacer encuestas.

Veytia M, González N, Andrade P, Oudhof H. Depresión en adolescentes: el papel de los sucesos vitales estresantes. Salud Mental, 35(1) enero-febrero 2012.

7. Es uno de los principales factores que limita el desarrollo académico entre los estudiantes:

- a) La cantidad de fluor en el agua.
- b) La depresión.
- c) Las psicólogas ambiciosas.
- d) El humor de los profesores.
- e) La esquizofrenia.

González-González A, Juárez F, Solís C, González-Forteza C et al. Depresión y consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de bachillerato y licenciatura. Salud Mental, 35(1) enero-febrero 2012.

8. En México los síntomas depresivos durante el embarazo se observan en:

- a) El 90% de las mujeres.
- b) Del 22 al 37%
- c) Más del 50%
- d) Menos del 2%
- e) Ninguna de las anteriores.

Lara MA, Navarrete L. Detección de depresión en mujeres embarazadas mexicanas con las CES-D. Salud Mental, 35(1) enero-febrero 2012.

9. Los trastornos mentales durante el embarazo son factores de riesgo para:

- a) Conductas saludables.
- b) Mayor consumo de bebidas carbonatadas.
- c) Malos hábitos en la alimentación, mala adherencia a tratamientos, consumo de sustancias, partos prematuros y bajo peso al nacer.
- d) Accidentes en tren.
- e) Encuentro con fieras salvajes.

Lara MA, Navarrete L. Detección de depresión en mujeres embarazadas mexicanas con las CES-D. Salud Mental, 35(1) enero-febrero 2012.

10 Según datos del IMSS ¿cuál es la prevalencia de la depresión en población geriátrica?:

- a) 85%
- b) 1 al 2%
- c) 10%
- d) 39 al 42%
- e) 50%

Sánchez-García S, Juárez-Cedillo T, Gallegos-Carrillo K et al. Frecuencia de los síntomas depresivos entre adultos mayores de la Ciudad de México. Salud Mental, 35(1) enero-febrero 2012.

*(Respuestas en la página 27)*