



## Hongos Micorrízicos Arbusculares de un Sistema Agroforestal Semiárido Promueven el Crecimiento y Nutrición de la Lechuga Arbuscular Mycorrhizal Fungi from a Semiarid Agroforestry System Promote Growth and Nutrition of Lettuce

Arturo Jiménez-Martínez<sup>1</sup> , Noé Manuel Montaño<sup>2</sup> ,  
Susana Adriana Montaño-Arias<sup>2</sup> y Eduardo Chimal-Sánchez<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup> Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Posdoctorante de la SECIHTI comisionado al Departamento de Biología; (A.J.M.), <sup>2</sup> Departamento de Biología (Área de Botánica). Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Col. Leyes de Reforma 1a Sección, 09310 Iztapalapa, Ciudad de México, México; (N.M.M.), (S.A.M.A.), (E.C.S.).

<sup>3</sup> Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Unidad de Investigación en Ecología Vegetal. Av. Guelatao 66, Col. Ejército de Oriente, 09230 Iztapalapa, Ciudad de México, México; (E.C.S.).

\* Autor para correspondencia: nmma@xanum.uam.mx

### RESUMEN

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) favorecen el desarrollo de las plantas silvestres y cultivadas en los sistemas agroforestales. En este estudio se evaluó la efectividad de tres inóculos de hongos micorrízicos arbusculares de HMA procedentes de tres condiciones de uso del suelo: islas de vegetación y áreas abiertas del sistema agroforestal "milpa-chichipera" y matorral xerófilo en el valle semiárido de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla-Oaxaca, México, sobre el crecimiento y la nutrición de la lechuga (*Lactuca sativa L.*). Se preparó y esterilizó un sustrato con base en una mezcla de suelo y arena sílica. Se establecieron tres tratamientos de inoculación con 50 g de suelo con los HMA provenientes de las tres condiciones de uso del suelo y un control sin inocular, con cinco repeticiones. Las plantas se mantuvieron en un invernadero durante tres meses. Al finalizar este periodo, se cosechó la parte aérea y se evaluó el peso fresco y seco, el área foliar y el contenido de agua, N y P en planta y clorofila en hojas. Los tres inóculos de HMA favorecieron el crecimiento y nutrición de la lechuga comparado con el control. Sin embargo, las plantas inoculadas con HMA de las islas de vegetación y de las áreas abiertas del sistema agroforestal, tuvieron mejor respuesta que aquellas inoculadas con HMA del matorral xerófilo. Asimismo, los tres inóculos aumentaron la clorofila en las hojas; aunque esto fue mayor en los tratamientos con HMA de las islas de vegetación del sistema agroforestal y del matorral xerófilo. El contenido de P y N fue mayor en las plantas inoculadas con los HMA del sistema agroforestal. Los dos inóculos de HMA del sistema agroforestal fueron más efectivos para el cultivo de lechuga que el inóculo del matorral xerófilo; no obstante, los tres inóculos podrían ser potenciales biofertilizantes micorrízicos en este ecosistema semiárido.



#### Cita recomendada:

Jiménez-Martínez, A., Montaño, N. M., Montaño-Arias, S. A., & Chimal-Sánchez, E. (2025). Hongos Micorrízicos Arbusculares de un Sistema Agroforestal Semiárido Promueven el Crecimiento y Nutrición de la Lechuga. *Terra Latinoamericana*, 43, 1-12. e2088. <https://doi.org/10.28940/terra.v43i.2088>

Recibido: 2 de septiembre de 2024.

Aceptado: 27 de noviembre de 2024.

Artículo. Volumen 43.

Abri de 2025.

Editor de Sección:

Dr. Roberto Gregorio Chiquito Contreras

Editor Técnico:

Dr. Benjamín Zamudio González

**Palabras clave:** efectividad micorrízica, *Glomeromycota*, *Lactuca sativa*, sistemas agroforestales.

### SUMMARY

Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) promote the development of wild and cultivated plants and are, therefore, critical in agroforestry systems. In our study, we evaluated the effectiveness of three inocula of arbuscular mycorrhizal fungi of AMF from three different land uses: vegetation islands and open areas of agroforestry system "milpa-chichipera", and xeric scrub on the growth and nutrition of lettuce plants (*Lactuca sativa L.*) at semiarid Tehuacan-Cuicatlan Valley, Puebla-Oaxaca, Mexico.

A sterilized substrate was prepared based on a 50/50 (v/v) mixture of soil and silica sand. Three inoculation treatments were established with 50 g of soil inoculum which included AMF from the three land uses and a control without inoculation, with five replicates. The plants were grown for three months, and at the end of the experimental period, the aerial part was harvested to evaluate fresh and dry weight, leaf area and contents of water, leaf chlorophyll, N and P in plant. All inocula favored the growth and nutrition of lettuce compared to the control. However, inoculated plants with AMF from vegetation islands and open areas of the agroforestry system had a better response than those inoculated with AMF from xeric scrub. Likewise, the three inocula increased the chlorophyll of the leaves in the plants; however, these were higher in inoculated plants with AMF from the vegetation islands of the agroforestry system and xeric scrub. Additionally, tissue P and N contents were higher in inoculated plants with AMF from agroforestry system. The inocula from agroforestry system were more effective for lettuce crop than the inoculum from xeric scrub; however, all three inocula could be potential mycorrhizal biofertilizers in this semiarid ecosystem.

**Index words:** mycorrhizal effectiveness, *Glomeromycota*, *Lactuca sativa*, agroforestry systems.

## INTRODUCCIÓN

Los sistemas agroforestales (SAF) son reservorios de biodiversidad, en la que están incluidos los hongos micorrízicos arbusculares (HMA -*Glomeromycota*-) (Udawatta, Rankoth y Jose, 2019; Fahad et al., 2022). Estos hongos forman la asociación micorrízica arbuscular con más del 80% de las plantas terrestres, incluyendo las de interés forestal y agrícola (Smith y Read, 2010). Se ha reportado que, el micelio de estos hongos establece redes de intercambio de nutrientes entre las plantas cultivadas y perennes dentro de los SAF (Marney y Borden, 2019; Gutiérrez-Nuñez y Gavito, 2024). Sin embargo, son escasas las investigaciones que consideran a los HMA de SAF como un recurso biológico nativo con potencial para favorecer el desarrollo de los cultivos en ecosistemas secos (Joshi, Deepa, Joshi y Sharma, 2023). En los ecosistemas semiáridos, donde existe un elevado estrés ambiental y los SAF han sido escasamente explorados comparados con los ecosistemas húmedos, los HMA asociados a estos SAF semiáridos podrían ser cruciales para la sobrevivencia de las plantas cultivadas en vistas de mantener la salud del suelo, producción de alimento y alcanzar la soberanía agroalimentaria (Fahad et al., 2022; Joshi et al., 2023).

Hace una década, se señaló la importancia de elaborar biofertilizantes a partir de microorganismos nativos (Coutiño-Puchuli, Peña e Infante, 2023). Dichos inoculantes deben ser de alta calidad, lo que significa que deben estar constituidos por más de una especie, tener abundantes propágulos (esporas, raíces colonizadas y micelio externo) con capacidad de colonizar a la planta hospedera y ser efectivos para el desarrollo de su hospedero a través del tiempo. Asimismo, el inóculo resultante debe estar libre de agentes fitopatógenos y, finalmente, mantenerse viable a largo plazo (González-Chávez, 2002; Rouphael et al., 2015).

Los SAF ofrecen nichos únicos con diferentes condiciones y recursos que promueven las interacciones bióticas y abióticas, las cuales se afectan por el manejo agrícola (Fahad et al., 2022). Por lo que conocer el papel funcional de los HMA como inoculantes en ecosistemas semiáridos, bajo contextos particulares de manejo del suelo, es prioritario para garantizar no sólo la concentración de propágulos y la conservación de los HMA, sino también para promover el desarrollo de los diferentes cultivos de interés agrícola (Montaño et al., 2012).

En San Luis Atolotitlán, en el Valle semiárido de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla-Oaxaca, México, el matorral xerófilo con cactáceas columnares es uno de los tipos de vegetación nativa más importante que ha sido transformado, desde tiempos prehispánicos, en áreas para el cultivo mediante un manejo agroforestal sustentable tradicional que permite la conservación de la diversidad vegetal (Rendón-Sandoval et al., 2024). En este ecosistema semiárido, la "milpa-chichipera" es un tipo de manejo agroforestal tradicional integrado por islas de vegetación nativa rodeadas por áreas abiertas destinadas al cultivo de maíz y en las que predominan *Myrtillocactus chichipe* (Rol.-Goss.) P.V. Heath (=*Polaskia chichipe* (Rol.-Goss.) Backeb.) (Cactaceae), un cactus columnar endémico y otras especies vegetales nativas que mantienen los pobladores, razón por la que a este SAF se le denominó "milpa-chichipera" (Moreno-Calles, Casas, García y Torres, 2012). Este SAF tradicional, además de favorecer el mantenimiento de la biodiversidad de flora y fauna (Moreno-Calles et al., 2010), como otros SAF tradicionales en la región (Rendón-Sandoval et al., 2024), contiene plantas altamente micotróficas que promueven la presencia y diversidad de los HMA (Camargo-Ricalde, Dhillion y Jiménez, 2003; Chimal-Sánchez, Montaño, Camargo,

García y Hernández, 2022), los cuales podrían ser críticos en el crecimiento y nutrición de las plantas en estas condiciones de aridez y de baja fertilidad del suelo (García-Licona et al., 2017) y, por lo tanto, podrían conformar biofertilizantes nativos potenciales para la agricultura en esta región semiárida de México.

En el mundo, una de las hortalizas reconocidas por su alto valor nutricional, comercial y de consumo es la lechuga (*Lactuca sativa L.* -Asteraceae-) (Medina-Lozano, Bertolín y Díaz, 2021). En México, esta hortaliza es producida principalmente en Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Puebla, durante los períodos febrero-abril y julio-agosto y el país exporta el 49% de la producción anual (SIAP, 2018; Shatilov, Razin y Ivanova, 2019). El cultivo de lechuga se lleva a cabo en todas las épocas del año (SIAP, 2018), por lo que está expuesto a variaciones estacionales de la lluvia y es altamente dependiente del riego, lo que aumenta su susceptibilidad al estrés hídrico y reduce sus posibilidades de cultivarse en regiones semiáridas (Pertierra y Quispe, 2020). Algunos estudios indican consorcios particulares de HMA asociados a la lechuga (Acoltzi-Conde, Chimal, Tovar y Díaz, 2024), con un efecto favorable que posiblemente varía en magnitud con la composición fúngica (Tapia-Goné et al., 2010; Ley-Rivas, Aliaga, Morón y Furrazola, 2011; Ley-Rivas, Ricardo, Sánchez, Furrazola y Gómez, 2016; Cela et al., 2022). Ante este escenario, es necesario considerar a los HMA de los SAF como posibles biofertilizantes micorrízicos nativos que otorgarían beneficios para asegurar la supervivencia y producción de esta hortaliza en suelos con estrés hídrico y nutrimental como en los ecosistemas semiáridos.

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue evaluar la efectividad de tres inóculos de HMA procedentes de tres condiciones de uso del suelo: islas de vegetación y áreas abiertas del sistema agroforestal "milpa-chichipera" y matorral xerófilo en el Valle semiárido de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla-Oaxaca, México, sobre el crecimiento y la nutrición de la lechuga. La hipótesis fue que los tres inóculos micorrízicos favorecerían el crecimiento y nutrición de las plantas de lechuga, pero su efectividad variaría en función de su procedencia según la condición de uso del suelo.

## MATERIALES Y MÉTODOS

### Área de Estudio

Los inóculos de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) se recolectaron en la localidad de San Luis Atolotitlán, ubicada dentro del Valle semiárido de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla-Oaxaca, México, en las coordenadas 17° 32'-18° 53' N y 96° 55'- 97° 44' O. El clima es semiárido, con una temperatura y precipitación medias anuales de 21 °C y 434 mm, respectivamente, con una marcada estacionalidad de la lluvia (Valiente-Banuet, 1991<sup>1</sup>). La vegetación predominante es matorral xerófilo con alta densidad de cactáceas columnares (Valiente-Banuet et al., 2009). El suelo dominante en el área de colecta es Leptosol (IUSS, 2015).

### Colecta de Suelo y Hongos Micorrízicos Arbusculares

En el área de estudio se ubicaron tres condiciones de uso del suelo: i) áreas abiertas al cultivo de maíz combinado con frijol y calabaza (milpa) rodeadas por ii) islas de vegetación ambos dentro del sistema agroforestal (SAF) "milpa-chichipera" denominado así por Moreno-Calles et al. (2012), y iii) matorral xerófilo nativo. En cada condición se establecieron cinco parcelas de 20×50 m (1000 m<sup>2</sup>) separadas por al menos un kilómetro. En cada parcela se establecieron tres transectos en los que se colectaron 15 submuestras de suelo que fueron mezcladas para conformar una muestra compuesta a partir de la cual se aislaron e identificaron los HMA con base en los rasgos morfológicos de las esporas y en las descripciones originales de las especies de HMA. El suelo se colectó de los primeros 15 cm de profundidad, debido a que en esta primera capa de suelo se concentra la mayor biomasa de raíces, microorganismos y abundancia de esporas de HMA (Pavón y Briones, 2000; Rodríguez-Zaragoza et al., 2008; Chimal-Sánchez et al., 2022). El suelo, con los HMA y fragmentos de raíces, procedente de cada condición fue utilizado como inóculo natural. La caracterización taxonómica de los HMA de cada inóculo permitió identificar 30 morfoespecies de HMA en el suelo de las islas de vegetación, 26 en el suelo de las áreas abiertas y 25 en el suelo del matorral xerófilo (Cuadro 1).

<sup>1</sup> Valiente-Banuet, L. (1991). *Patrones de precipitación en el Valle semiárido de Tehuacán, Puebla, México*. Tesis para obtener el grado de Biólogo, Facultad de Ciencias, UNAM, México.

**Cuadro 1. Morfoespecies de hongos micorrízicos arbusculares en tres condiciones de uso del suelo: áreas abiertas e islas de vegetación del sistema agroforestal “milpa-chichipera” y matorral xerófilo en el Valle semiárido de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla-Oaxaca, México.**  
**Table 1. Morphospecies of arbuscular mycorrhizal fungi in different land uses: open areas and vegetation islands from agroforestry system “milpa-chichipera”, and xeric shrub at semiarid Valley of Tehuacan-Cuicatlan, Puebla-Oaxaca, Mexico.**

Morfoespecies de hongos micorrízicos arbusculares	Sistema agroforestal “milpa-chichipera”		Matorral xerófilo
	Áreas abiertas	Islas de vegetación	
<i>Acaulospora aff. colliculosa</i> Kaonongbua, J.B. Morton & Bever	X	X	X
<i>Acaulospora</i> sp.1	X	X	X
<i>Acaulospora excavata</i> Ingleby & C.Walker	X	X	X
<i>Acaulospora laevis</i> Gerd. & Trappe		X	X
<i>Acaulospora mellea</i> Spain & N.C.Schenck	X	X	X
<i>Acaulospora morrowiae</i> Spain & N.C. Schenck	X	X	X
<i>Acaulospora reducta</i> Oehl, B.T. Goto & C.M.R. Pereira			X
<i>Acaulospora rehmii</i> Sieverd. & S. Toro		X	X
<i>Acaulospora scrobiculata</i> Trappe		X	X
<i>Acaulospora spinosissima</i> Oehl, Palenz., I. C. Sánchez, Tchabi, Hount. & G. A. Silva		X	
<i>Acaulospora</i> sp. 2	X		
<i>Acauslopsora</i> sp. 3	X		
<i>Acaulospora</i> sp. 4			X
<i>Acaulospora</i> sp. 5	X		
<i>Acaulospora</i> sp. 6	X		
<i>Acaulospora</i> sp. 7			X
<i>Ambispora reticulata</i> Oehl & Sieverd., E.			X
<i>Ambispora appendicula</i> (Spain, Sieverd. & N.C. Schenck) C. Walker			X
<i>Ambispora</i> sp. 1.			X
<i>Diversispora</i> sp. 1	X		
<i>Diversispora spurca</i> (C.M. Pfeiff., C. Walker & Bloss) C. Walker & Schübler	X	X	X
<i>Diversispora trimurales</i> C. Walker & Schübler	X		
<i>Diversispora</i> sp.3			X
<i>Sieverdingia tortuosa</i> (N.C. Schenck & G.S. Sm.) Blaszk., Niezgoda & B.T. Goto.			X
<i>Corymbiglomus globiferum</i> (Koske & C. Walker) Błaszk. & Chwat.			
<i>Corymbiglomus</i> sp. 1	X		
<i>Entrophospora claroidea</i> (N.C. Schenck & G.S. Sm.) Blaszk., Niezgoda, B.T. Goto & Magurno.	X	X	X
<i>Entrophospora etunicata</i> (W.N. Becker & Gerd.) Błaszk., Niezgoda, B.T. Goto & Magurno.	X		X
<i>Entrophospora infrequens</i> (I.R. Hall) R.N. Ames & R.W. Schneid	X	X	X
<i>Entrophospora</i> sp. 1			X
<i>Entrophospora</i> sp. 2	X	X	
<i>Gigaspora candida</i> Bhattacharjee, Mukerji, J.P. Tewari & Skoropad	X	X	X
<i>Racocetra gregaria</i> (N.C.Schenck & T.H.Nicolson) Oehl, F.A. Souza & Sieverd.	X		
<i>Centraspora pellucida</i> (T.H. Nicolson & N.C. Schenck) Oehl, F.A. Souza & Sieverd.	X	X	X
<i>Paraglomus boliviianum</i> (Sieverd. & Oehl) Oehl & G.A. Silva.			X
<i>Glomus macrocarpum</i> Tul. & C. Tul.	X	X	
<i>Glomus spinuliferum</i> Sieverd. & Oehl			X
<i>Glomus</i> sp. 1	X		
<i>Rhizophagus fasciculatum</i> (Thaxt.) C. Walker & A. Schübler		X	X
<i>Funneliformis geosporum</i> (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker & A. Schübler	X	X	X
<i>Funneliformis mosseae</i> (T.H.Nicolson & Gerd.) C.Walker & A. Schübler	X	X	X
<i>Septoglomus mexicanum</i> E. Chimal-Sánchez, C. Senés-Guerrero, N.M. Montaño, L. Varela, et al.	X	X	X
<i>Septoglomus constrictum</i> (Trappe) Sieverd., G.A.Silva & Oehl			X
<i>Paraglomus occultum</i> C.Walker) J.B.Morton & D.Redecker	X	X	

## Establecimiento del Experimento

Las semillas de lechuga (*Lactuca sativa L.*) se sembraron en macetas de polipropileno con capacidad de 1 kg, las cuales se lavaron y desinfectaron previamente con una solución hipoclorito de sodio al 10% por 5 minutos. Cada maceta se llenó hasta la mitad con el sustrato, que consistió en una mezcla de suelo con arena sílica 50/50 (v/v) que fue homogenizada y esterilizada en autoclave a 120 °C y 15 lb de presión durante 1h, en dos ocasiones. Dicho sustrato tuvo una textura franco-arenosa (arena 75%, limo 12%, arcilla 13%) determinada por la pipeta americana; pH activo = 7.2 con potenciómetro de electrodo (suelo:agua 1:2 p/v); conductividad eléctrica= 3.2 dS m<sup>-1</sup> con conductímetro (suelo:agua 1:2 p/v); CEC= 10.03 cmol(+) kg<sup>-1</sup> con acetato de amonio pH= 7 y pasta de saturación; concentración de Na<sup>+</sup>= 0.12, K<sup>+</sup>= 0.58, Ca<sup>++</sup>= 3.48 y Mg<sup>++</sup>= 15.84 (cmol(+) kg<sup>-1</sup>) por pasta de saturación; CaCO<sub>3</sub>= 0.11 eq por titulación ácida; N<sub>total</sub>= 0.21% por el método de micro-Kjeldahl con H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; PO<sub>4</sub><sup>3-</sup> = 59.7 mg kg<sup>-1</sup> con el método Olsen; COS= 3.3% con Walkley-Black por digestión húmeda con K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> y H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; MOS= 6.4% a partir del valor de COS y densidad aparente = 1.3 g cm<sup>-3</sup> por terrón parafinado; todos determinados con base en Van Reeuwijk (2003).

Los tratamientos con inóculo de HMA consistieron en 50 g del suelo colectado que contenían en promedio de 80 esporas de HMA y cuya procedencia correspondió a alguna de las tres condiciones de uso del suelo: islas de vegetación y áreas abiertas en el SAF "milpa-chichipera", y matorral xerófilo; además de un tratamiento control (sin inocular). Las macetas con inóculo se completaron en volumen con el mismo sustrato y se sembraron las semillas de lechuga previamente desinfectadas con hipoclorito de sodio al 3% por 2 minutos. Una planta de cada maceta correspondió a la unidad experimental. Las plantas se mantuvieron en condiciones de invernadero (37 °C y humedad relativa de la Ciudad de México, abril-mayo) y se regaron con agua destilada, cada tres o cuatro días, durante tres meses.

## Evaluación del Crecimiento y Nutrición En Las Plantas


Al final el periodo experimental, la parte aérea de las plantas se cosechó en cada tratamiento y se evaluó el peso fresco y seco con una balanza analítica OHAUS®. Las plantas se secaron en un horno ECOSHEI® a 65 °C durante 72 h hasta peso constante. El área foliar se midió en el programa IMAGEJ y la clorofila en hojas con un medidor SPAD marca ECO-TYS®. Además, se calculó el contenido de agua en la planta, a través de la resta del peso fresco menos el seco de la masa de las plantas y se determinó la concentración de nitrógeno (N) y fósforo (P) en el tejido vegetal por digestión húmeda microKjeldahl y titulación con ácido sulfúrico en el caso del N (Isaac y Johnson, 1976; Jones y Case, 1990) y en el caso del P, se siguió el método de Murphy y Riley (1962). El contenido de N y P en la planta se estimó multiplicando la concentración de cada bioelemento por la biomasa seca de las plantas al tiempo de la cosecha. Únicamente se evaluó la parte aérea de las plantas de lechuga, dado que la subterránea se incorporó como parte de los inoculantes micorrízicos que fueron entregados a los campesinos de la región semiárida de San Luis Atolotitlán en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

## Diseño Experimental y Análisis de Datos

El diseño experimental fue completamente al azar con cinco réplicas (n= 5) por tratamiento. Los datos se analizaron con un ANOVA de una vía seguido de pruebas de medias de Tukey ( $P < 0.05$ ) para evaluar el efecto de los tratamientos. Los datos se ajustaron a los supuestos de normalidad y homocedasticidad cuando fue necesario, pero se presentan en su escala original de medición. Los análisis se realizaron en el programa SAS® versión 9.4 (SAS Institute, 2014).

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los tratamientos de inoculación con hongos micorrízicos arbusculares (HMA) estimularon el crecimiento de las plantas de lechuga, reflejando mayor biomasa fresca y seca, y contenido de agua en la planta (Figura 1a, b, c), así como un incremento del área foliar e índice de clorofila en hojas en comparación con el tratamiento control (Figura 2a, b). El crecimiento vegetal favorecido por la inoculación con HMA ha sido reportado en muchas otras plantas de ecosistemas semiáridos (Camargo-Ricalde, Montaño, Reyes, Jiménez y Dhillon, 2010; Robles-Martínez, Robles, Rivera, Ortega y Pliego, 2013; Montaño-Arias et al., 2023) y hortalizas, incluida la lechuga (Cuenca, Cáceres, Oirdobro, Hasmy y Urdaneta, 2007; Tapia-Goné et al., 2010; Wee, Li, Kim y Sohn, 2010; Roushael et al., 2015; Ley-Rivas et al., 2016; Shi et al., 2016; Carballar-Hernández, Hernández, Montaño, Ferrera y Alarcón, 2018).




**Figura 1. Efectividad de inóculos de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) provenientes de tres diferentes usos de suelo: áreas abiertas e islas de vegetación del sistema agroforestal "milpa-chichipera" y matorral xerófilo en el Valle semiárido de Tehuacán-Cuicatlán, México sobre: A) Peso fresco, B) Peso seco y C) Contenido de agua de plantas de lechuga (*Lactuca sativa* L.). Control = sin inocular HMA.**

**Figure 1. Effectiveness of arbuscular mycorrhizal fungal (AMF) inocula from three different land uses: open areas and vegetation islands of agroforestry system "milpa-chichipera" and xeric scrub at semiarid Tehuacan-Cuicatlan Valley on: A) Fresh weight, B) Dry weight, and C) Water content in lettuce plants (*Lactuca sativa* L.). Control = without AMF inoculum.**

Asimismo, la inoculación con HMA promovió la acumulación de N y P en el tejido de las plantas de lechuga, por lo que el contenido de estos bioelementos, en general, fue mayor en las plantas inoculadas con HMA provenientes de las tres condiciones de uso del suelo que en las plantas sin inocular (Figura 3a, b), con excepción del N que no difirió entre las plantas control y las inoculadas con HMA del matorral xerófilo (Figura 3b). Este resultado también coincide con el efecto positivo de la inoculación con HMA reportado en otras plantas y hortalizas como la lechuga (Azcón, Ambrosano y Charest, 2003; Cuenca et al., 2007; Rousphael et al., 2015; Ley-Rivas et al., 2016; Carballar-Hernández et al., 2018; Cela et al., 2022). Los HMA, al formar la micorriza arbuscular, contribuyen a


través de su micelio a una mayor captura de agua y nutrientes del suelo por parte de las raíces (Clark y Zeto, 2000; Miransari, 2011), lo que favorece el desarrollo y la actividad fotosintética de las plantas hospederas al abastecerlas de éstos y posiblemente otros recursos, lo que podría promover la síntesis de clorofila y azúcares en las plantas (Smith y Read, 2010). En las plantas de lechuga, la simbiosis con los HMA de ambientes semiáridos podría coadyubar a subsanar las deficiencias de agua y disponibilidad de N y P en el suelo, como se ha demostrado en otros escenarios para esta hortaliza (Azcón et al., 2003; Vicente-Sánchez et al., 2014).

Los inóculos de HMA pertenecientes al SAF "milpa-chichipera", tanto los provenientes de las islas de vegetación como los de áreas abiertas, fueron más efectivos en comparación con el inóculo proveniente del matorral xerófilo, así las plantas de lechuga de estos tratamientos registraron mayor crecimiento, almacenamiento de agua (Figura 1a, b), actividad fotosintética (Figura 2a, b) y contenido nutrimental de N y P en su tejido (Figura 3a, b). No obstante, el contenido de clorofila en las hojas fue mayor y tuvo valores similares entre plantas inoculadas con HMA provenientes del matorral xerófilo e islas de vegetación del SAF "milpa-chichipera" (Figura 2b); mientras que, las plantas inoculadas con los HMA de áreas abiertas del SAF "milpa-chichipera", tuvieron valores intermedios, pero superiores a las plantas control (Figura 2b).



**Figura 2. Efectividad de inóculos de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) provenientes de tres diferentes usos de suelo: áreas abiertas e islas de vegetación del sistema agroforestal "milpa-chichipera" y matorral xerófilo en el Valle semiárido de Tehuacán-Cuicatlán, México sobre: A) Área foliar y B) Índice de clorofila de plantas de lechuga (*Lactuca sativa L.*). Control = sin inocular HMA.**

**Figure 2. Effectiveness of arbuscular mycorrhizal fungal (AMF) inocula from three different land uses: open areas and vegetation islands of agroforestry system "milpa-chichipera" and xeric scrub at semiarid Tehuacan-Cuicatlan Valley on: A) Leaf area, and B) Chlorophyll index in lettuce plants (*Lactuca sativa L.*). Control = without AMF inoculum.**



**Figura 3. Contenido de fósforo (A) y nitrógeno (B) de la parte aérea de plantas de lechuga (*Lactuca sativa L.*) de diferentes inóculos de hongos micorrízicos arbusculares provenientes de tres diferentes condiciones de uso del suelo: áreas abiertas e islas de vegetación del sistema agroforestal "milpa-chichipera" y matorral xerófilo en el Valle semiárido de Tehuacán-Cuicatlán, México. Control = sin inocular HMA.**

**Figure 3. Phosphorus (A) and nitrogen (B) content in aboveground biomass of lettuce plants (*Lactuca sativa L.*) inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi coming from three different land uses: open areas and vegetation islands of agroforestry system "milpa-chichipera" and xeric scrub at semiarid Tehuacan-Cuicatlan Valley, Mexico. Control = without AMF inoculum.**

Los resultados sugieren que, en este SAF tradicional, los HMA, al interactuar con las plantas nativas preservadas en las islas de vegetación y con la milpa, son más efectivos para el desarrollo de la lechuga que los HMA que están en el matorral xerófilo. Es posible que los HMA en el suelo de este SAF estén sometidos a constantes fluctuaciones ambientales que los HMA del matorral xerófilo; por ejemplo, mayores cambios en humedad, temperatura y disponibilidad de nutrientes en el suelo, así como a diferentes hospederos a lo largo del año, por lo que la plasticidad funcional de estos hongos podría estar dirigida a contrarrestar el estrés (Branco, Schauster, Liao y Ruytinck, 2022). Esta exposición constante a condiciones ambientales estresantes, además de determinar el ensamblaje de especies de HMA en este SAF respecto del registrado en el matorral xerófilo, también podría contribuir a moldear la efectividad de los HMA para colonizar a sus hospederos y aportarles beneficios, dado que estarían más adaptados al estrés ambiental que aquellos HMA menos expuestos a variaciones en condiciones y recursos (Branco *et al.*, 2022), como podría ocurrir en el suelo del matorral xerófilo, donde la humedad y nutrientes son mayores que en el suelo de islas de vegetación y áreas abiertas del SAF "milpa-chichipera" (datos no publicados). Como consecuencia, el matorral xerófilo contiene un inóculo micorrízico arbuscular con similar riqueza de morfoespecies de HMA que el SAF, pero con HMA menos eficientes que los inóculos micorrízicos asociados a las islas de vegetación y áreas abiertas del SAF "milpa-chichipera", sugiriendo que el manejo tradicional podría estar seleccionando de alguna manera a largo plazo la efectividad de los HMA.

La diferencia en la composición de morfoespecies de HMA asociada a cada inóculo también podría explicar los resultados obtenidos en este estudio, ya que, diferentes especies de HMA tienen capacidades distintas para soportar condiciones adversas, lo que hace que el estrés ambiental afecte a las especies de manera diferente y tenga el potencial de generar cambios en la diversidad de hongos micorrízicos (Branco et al., 2022). Una mayor similitud en composición de HMA a nivel de género y morfoespecies fue registrada entre los suelos de las islas de vegetación y áreas abiertas del SAF milpa-chichipera y el suelo del matorral xerófilo (Cuadro 1), en donde morfoespecies de géneros como *Acaulospora*, *Ambispora*, *Diversispora*, *Racocetra* y *Septogiomus*, que sólo están presentes en uno o dos de los inóculos, podrían estar explicando la diferencia en la efectividad de los inóculos micorrízicos evaluados. La respuesta de la lechuga puede ser atribuida a las diferencias en la composición de HMA, debido a que se ha demostrado que las hortalizas como la lechuga albergan consorcios micorrízicos particulares en su rizosfera (Acotzi-Conde et al., 2024). Asimismo, Wee et al. (2010), al evaluar efectividad de *Glomus* sp. en el desarrollo la lechuga, reportaron que este hongo incrementa el área foliar, peso fresco y contenido de P en las plantas inoculadas con respecto al control; aunque no la cantidad de clorofila, con valores que difieren marcadamente de los reportados en estudios que evalúan el efecto de otros HMA (Ley-Rivas et al., 2011; Ley-Rivas et al., 2016), lo cual sugiere que el desarrollo de la lechuga varía con la composición de especies del inóculo micorrízico.

El mayor contenido de clorofila en las hojas registrado en las plantas inoculadas con los HMA del matorral xerófilo y de las islas de vegetación con respecto a las inoculadas con los HMA del área abierta (Figura 2b), también pudiera deberse a las diferencias en la composición de HMA entre estos inóculos, ya que los HMA están sometidos a mayores entradas de nitrógeno al suelo a través de leguminosas nativas del matorral xerófilo y también presentes en las islas de vegetación del SAF (Moreno-Calles et al., 2012). Shi et al. (2016) reportaron que, tanto la actividad fotosintética como la concentración de clorofila y N de la planta hospedera, están correlacionadas y dependen de los HMA, donde *A. scrobiculata*, *F. mosseae* y *R. intraradices* favorecen su concentración en tejido vegetal comparado con plantas sin inocular. Asimismo, como ocurrió en el presente estudio, la efectividad de los HMA también se ha reflejado en la acumulación de clorofila, e incluso carotenoides y tocoferol en las hojas de la lechuga, lo que podría potenciar la ingesta de compuestos con propiedades antioxidantes durante el consumo de lechuga en la dieta (Baslam, Esteban, García y Goicoechea, 2013).

Las plantas de lechuga que crecieron con los inóculos del SAF más similares en composición de HMA tuvieron mejor nutrición y mayor actividad fotosintética, lo que se reflejó en más crecimiento en términos de biomasa (Figura 4). Cuenca et al. (2007) indicaron que algunos HMA tienen una alta compatibilidad micorrízica que favorece el crecimiento de la lechuga. Asimismo, la efectividad individual y en consorcio de los HMA aumenta la biomasa aérea y subterránea, así como el diámetro del tallo de la lechuga (Ley-Rivas et al., 2016). Esto sugiere que la efectividad de los HMA en el SAF "milpa-chichipera" pudiera deberse a su acción como consorcios micorrízicos nativos con una particular composición de especies (Trejo et al., 2011), como se ha demostrado tanto en plantas cultivadas de chile (Carballar-Hernández et al., 2018) y frijol (Paredes-Jácome et al., 2022), como en plantas de ambientes semiáridos como el Agave (Quiñones-Aguilar, Montoya, Rincón, Lobit y López, 2016) y varias especies de *Mimosa* spp. (Camargo-Ricalde et al., 2010; Montaño-Arias et al., 2023), donde los consorcios de HMA nativos incrementan la cantidad de hojas, altura y biomasa fresca y seca de las plantas hospederas.



**Figura 4. Plantas de lechuga (*Lactuca sativa* L.) creciendo con y sin inóculo de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) provenientes de áreas abiertas e islas de vegetación del sistema agroforestal (SAF) "milpa-chichipera" y matorral xerófilo del Valle semiárido de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla-Oaxaca, México.**  
**Figure 4. Lettuce plants (*Lactuca sativa* L.) growing with and without inoculum of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) from open areas and vegetation islands of the agroforestry system (AFS) "milpa-chichipera" and xeric scrub, of the semiarid Valley of Tehuacan-Cuicatlan, Puebla-Oaxaca, Mexico.**

En este sentido, se ha registrado que, en otros SAF, los consorcios de HMA nativos estimulan el crecimiento vegetal en comparación con plantas no inoculadas y que, mientras más especies conformen el consorcio, mayor es la supervivencia de las plantas (Trejo *et al.*, 2011). En este trabajo los dos inóculos provenientes del SAF "milpa-chichipera" (islas de vegetación y áreas abiertas) tuvieron mayor riqueza y similar composición de morfoespecies de HMA, lo que los hace fuentes de inóculos efectivos que favorecen el crecimiento de las hojas y de la planta, así como la nutrición y acumulación de agua en la parte aérea de las plantas de lechuga (Figuras 1, 2), características vinculadas a la calidad de esta hortaliza (Medina-Lozano *et al.*, 2021). Asimismo, la efectividad de los inoculantes micorrízicos nativos en consorcios, no sólo favorecen la respuesta positiva de sus hospederos, en comparación con los inoculantes de HMA constituidos por una sola especie, sino que, en conjunto, también contribuyen a disminuir la aplicación de fertilizantes químicos hasta en un 50%, debido a que también son eficientes en la absorción de N y P, lo que aumenta el rendimiento de los cultivos, como en este caso con la lechuga (Miransari, 2011; Thioub, Ewusi, Sarkodie y Adjei-Gyapong, 2019; Aguégué *et al.*, 2021). No obstante, la efectividad no sólo depende de los HMA, la planta hospedera y la fertilidad química del suelo, sino también está regulada por las características del suelo o el sustrato (Tapia-Goné *et al.*, 2010; Jiménez-Martínez, González-Chávez, Gutiérrez-Castorena, Lara-Hernandez y García-Cué, 2014), por lo que la efectividad de los inóculos micorrízicos evaluados en este estudio podría variar *in situ* en función de las características físicas del suelo y, entonces, se requiere probar su efectividad en condiciones de campo.

En el contexto del SAF "milpa-chichipera", los HMA podrían estar interconectando, a través de sus redes miciliares, a los cultivos (la milpa) que crecen en las áreas abiertas con las plantas nativas en las islas de vegetación, favoreciendo el crecimiento y nutrición de los cultivos (Marney y Borden, 2019; Gutiérrez-Núñez y Gavito, 2024), lo cual también podría ocurrir al cultivar hortalizas como la lechuga por lo que es una hipótesis por demostrar.

## **CONCLUSIONES**

Los inóculos de HMA del matorral xerófilo y SAF tradicional "milpa-chichipera" tienen impacto positivo en el crecimiento y contenido de N y P de las plantas de lechuga, por lo que son potenciales fuentes de biofertilizantes nativos multi-específicos que posiblemente conforman consorcios que favorecen la producción de esta hortaliza. Los inóculos micorrízicos arbusculares de las áreas abiertas y de las islas de vegetación del SAF "milpa-chichipera" fueron los más efectivos en la producción de lechuga, lo que revela que estos hongos podrían estar mejor adaptados a condiciones de mayor estrés ambiental que los HMA del matorral xerófilo, por lo que son más eficientes en los cultivos de este SAF tradicional. Este estudio sugiere que el SAF "milpa-chichipera" es un reservorio de inóculos de HMA potencialmente útiles en la agricultura dentro del Valle semiárido de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla-Oaxaca, México, cuya efectividad deberá probarse en otras plantas cultivadas como el maíz o el frijol, o bien en algunas de interés para los pobladores como son el propio chichipe y los agaves, esto tanto en condiciones de invernadero como de campo, en donde se involucre a los agricultores para que generen a futuro sus propios biofertilizantes micorrízicos nativos.

## **DECLARACIÓN DE ÉTICA**

No aplicable.

## **CONSENTIMIENTO PARA PUBLICACIÓN**

No aplicable.

## **DISPONIBILIDAD DE DATOS**

Los datos generados y analizados están disponibles con el autor de correspondencia previa solicitud.

## **CONFLICTO DE INTERESES**

Los autores declaran que no existen conflictos de interés.

## **FINANCIACIÓN**

No aplicable.

## CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Escritura del artículo: A.J.M., N.M.M., S.A.M.A. y E.C.S. Metodología: A.J.M. y N.M.M. Análisis de datos: A.J.M. y N.M.M. Identificación de inóculos micorrízicos: E.C.S.

## AGRADECIMIENTOS

Arturo Jiménez Martínez agradece a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (antes CONACyT) por otorgar una beca para su estancia Posdoctoral en la UAM-Iztapalapa dentro del Programa Estancias Posdoctorales por México 2022(1). Así como al personal del Laboratorio de Génesis y Clasificación de Suelos y Química de Suelos del Colegio de Postgraduados campus Montecillos por los análisis de suelo y planta, respectivamente.

## LITERATURA CITADA

- Acoltzi-Conde, M. C., Chimal-Sánchez, E., Tovar-Soto, A., & Díaz-Reyes, J. (2024). Arbuscular mycorrhizal fungi consortia in six vegetable crops in the Tepeaca Valley, Puebla, Mexico. *Terra Latinoamericana*, 42, 1-11. <https://doi.org/10.28940/terra.v42i0.1783>
- Aguuégu, M. R., Ahoyo, N. R., Agbodjato, N. A., Noumavo, P. A., Assogba, S., Salami, H., Salako, V. K., ..., & Baba-Moussa L. (2021). Efficacy of native strains of arbuscular mycorrhizal fungi on maize productivity on ferrallitic soil in Benin. *Agricultural Research*, 4, 1-15. <https://doi.org/10.1007/s40003-021-00602-7>
- Azcón, R., Ambrosano, E., & Charest, C. (2003). Nutrient acquisition in mycorrhizal lettuce plants under different phosphorus and nitrogen concentration. *Plant Science*, 165(5), 1137-1145. [https://doi.org/10.1016/S0168-9452\(03\)00322-4](https://doi.org/10.1016/S0168-9452(03)00322-4)
- Baslam, M., Esteban, R., García-Plazaola, J. I., & Goicoechea, N. (2013). Effectiveness of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) for inducing the accumulation of major carotenoids, chlorophylls and tocopherol in green and red leaf lettuces. *Applied Microbiology Biotechnology*, 97, 3119-3128. <https://doi.org/10.1007/s00253-012-4526-x>
- Branco, S., Schauster, A., Liao, H.-L., & Ruytinx, J. (2022). Mechanisms of stress tolerance and their effects on the ecology and evolution of mycorrhizal fungi. *New Phytologist*, 235(6), 2158-2175. <https://doi.org/10.1111/nph.18308>
- Camargo-Ricalde, S. L., Dhillion, S. S., & Jiménez-González, C. (2003). Mycorrhizal perennials of the "matorral xerófilo" and the "selva baja caducifolia" communities in the semiarid Tehuacán-Cuicatlán Valley, Mexico. *Mycorrhiza*, 13, 77-83. <https://doi.org/10.1007/s00572-002-0203-8>
- Camargo-Ricalde, S. L., Montaño, N. M., Reyes-Jaramillo, I., Jiménez-González, C., & Dhillion, S. S. (2010). Effect of mycorrhizae on seedlings of six endemic *Mimosa* L. species (Leguminosae-Mimosoideae) from the semi-arid Tehuacán-Cuicatlán Valley. Mexico. *Trees*, 24, 67-78. <https://doi.org/10.1007/s00468-009-0379-z>
- Carballar-Hernández, S., Hernández-Cuevas, L. V., Montaño, N. M., Ferrera-Cerrato, R., & Alarcon, A. (2018). The species composition of native arbuscular mycorrhizal fungal consortia influences the growth and nutrition of poblano pepper plants (*Capsicum annuum* L.). *Applied Soil Ecology*, 30, 50-58. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2018.05.022>
- Cela, F., Avio, L., Giordani, T., Vangelisti, A., Cavallini, A., Turrini, A., ... & Incrocci, L. (2022). Arbuscular mycorrhizal fungi increase nutritional quality of soilless grown lettuce while overcoming low phosphorus supply. *Foods*, 11(22), 3612. <https://doi.org/10.3390/foods11223612>
- Chimal-Sánchez, E., Montaño, N. M., Camargo-Ricalde, S. L., García-Sánchez, R., & Hernández-Cuevas, L. V. (2022). Endemic *Mimosa* species, forming resource islands or not, and rainfall seasonality jointly influence arbuscular mycorrhizal fungi communities in a semiarid ecosystem of Mexico. *Trees*, 36, 609-625. <https://doi.org/10.1007/s00468-021-02234-4>
- Clark, R. Á., & Zeto, S. K. (2000). Mineral acquisition by arbuscular mycorrhizal plants. *Journal of Plant Nutrition*, 23(7), 867-902. <https://doi.org/10.1080/01904160009382068>
- Coutiño-Puchuli, A. E., Peña-Borrego, M. D., & Infante-Jiménez Z. T. (2023). Estudio bibliométrico sobre biofertilizantes en México durante el período 2015-2020. *Terra Latinoamericana*, 41, 1-14. <https://doi.org/10.28940/terra.v41i0.1449>
- Cuenca, G., Cáceres, A., Oirdobro, G., Hasmy, Z., & Urdaneta, C. (2007). Las micorizas arbusculares como alternativa para una agricultura sustentable en áreas tropicales. *Interciencia*, 32(1), 23-29. <https://doi.org/10.17151/luaz.2016.42.14>.
- Fahad, S., Chavan, S. B., Chichaghare, A. R., Uthappa, A. R., Kumar, M., Kakade, V., ... & Poczai, P. (2022). Agroforestry systems for soil health improvement and maintenance. *Sustainability*, 14(22), 14877. <https://doi.org/10.3390/su142214877>
- García-Licona, J. B., Maldonado-Torres, R., Moreno-Calles, A. I., Alvaréz-Sánchez, M. E., García-Chávez, J., & Fernández, A. C. (2017). Ethnoagroforestry management and soil fertility in the semiarid Tehuacán Valley, México. *Ethnobiology and Conservation*, 6, 1-16. <https://doi.org/10.15451/ec2017-06-6.5-1-16>
- González-Chávez, M. C. (2002). Producción y control de calidad de inoculantes de hongos micorrízicos arbusculares. En: J. Pérez-Moreno, J. Alvarado-López, & R. Ferrera-Cerrato (Eds.). *Producción y Control de Calidad de Inoculantes Agrícolas y Forestales* (pp. 36-46). Texcoco, Estado de México, México: Colegio de Postgraduados-Instituto de Investigaciones Forestales- Agrícolas y Pecuarias- Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo.
- Gutiérrez-Núñez, M. S., & Gavito, M. E. (2024). Timing of connection to mycorrhizal networks matters: Nutrition, N fixation, and transfer of fixed N in maize-bean intercropping. *Applied Soil Ecology*, 195, 105274. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105274>
- Isaac, R. A., & Johnson, W. C. (1976). Determination of total nitrogen in plant tissue, using a block digestor. *Journal of the Association of Official Analytical Chemists*, 59(1), 98-100. <https://doi.org/10.1093/jaoac/59.1.98>
- IUSS (International Union of Soil Sciences). (2015). Base referencial mundial del recurso suelo. *Sistema internacional de clasificación de suelos para la nomenclatura de suelos y la creación de leyendas de mapas de suelos. Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos 106*. Roma, Italy: FAO.
- Jiménez-Martínez, A., González-Chávez, M. C. A., Gutiérrez-Castorena, M. C., Lara-Hernández, M. E., & García-Cué, J. L. (2014). Producción de inóculo micorrízico de *Gigaspora gigantea* en mezclas de sustratos con diferente tamaño de partícula. *Agrociencia*, 48(3), 239-254.
- Jones, J. B., & Case, V. W. (1990). Sampling, handling, and analyzing plant tissue samples. *Soil Testing and Plant Analysis*, 3, 389-427. <https://doi.org/10.2136/sssabookser3.3ed.c15>
- Joshi, T., Deepa, P. R., Joshi, M., & Sharma, P. K. (2023). Matters of the desert: A perspective on achieving food and nutrition security through plants of the (semi) arid regions. *Journal of Agriculture and Food Research*, 14, 100725. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100725>

- Ley-Rivas, J. F., Aliaga, R. L., Moron, G. C., & Furrazola E. (2011). Efecto del biofertilizante MICOFERT en la producción de dos variedades de lechuga en Perú. *Acta Botánica Cubana*, 213, 36-39.
- Ley-Rivas, J. F., Ricardo, N. E., Sánchez, J. A., Furrazola, E., & Gómez, O. (2016). Efectividad en el cultivo de lechuga de cuatro cepas de hongos micorrígenos arbusculares. *Acta Botánica Cubana*, 215(3), 345-351.
- Marney, E. I., & Borden, K. A. (2019). Nutrient acquisition strategies in agroforestry systems. *Plant and Soil*, 444, 1-19. <https://doi.org/10.1007/s11104-019-04232-5>
- Medina-Lozano, I., Bertolín, J. R., & Díaz, A. (2021). Nutritional value of commercial and traditional lettuce (*Lactuca sativa L.*) and wild relatives: Vitamin C and anthocyanin content. *Food Chemistry*, 359, 129864. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129864>
- Miransari, M. (2011). Arbuscular mycorrhizal fungi and nitrogen uptake. *Archives of Microbiology*, 193(2), 77-81. <https://doi.org/10.1007/s00203-010-0657-6>
- Montaño, N. M., Alarcón, A., Camargo-Ricalde, S. L., Hernández-Cuevas, L. V., Álvarez-Sánchez, J., González-Chávez, M. D. C. A., ... & Ferrera-Cerrato, R. (2012). Research on arbuscular mycorrhizae in Mexico: an historical synthesis and future prospects. *Symbiosis*, 57, 111-126. <https://doi.org/10.1007/s13199-012-0184-0>
- Montaño-Arias, S. A., Montaño, N. M., Camargo-Ricalde, S. L., Grether, R., Montaño-Arias, G., & Chimal-Sánchez, E. (2023). Crecimiento y asignación de biomasa de ocho especies de *Mimosa* (Leguminosae) y su relación con la nodulación y micorrización arbuscular. *Botanical Sciences*, 101(4), 978-994. <https://doi.org/10.17129/botsci.3295>
- Moreno-Calles, A., Casas, A., Blancas, J., Torres, I., Masera, O., Caballero, J., ... & Rangel-Landa, S. (2010). Agroforestry systems and biodiversity conservation in arid zones: the case of the Tehuacán Valley, Central México. *Agroforestry Systems*, 80, 315-331. <https://doi.org/10.1007/s10457-010-9349-0>
- Moreno-Calles, A. I., Casas, A., García-Frapolli, E., & Torres-García, I. (2012). Traditional agroforestry systems of multi-crop "milpa" and "chichipera" cactus forest in the arid Tehuacán Valley, Mexico: their management and role in people's subsistence. *Agroforestry Systems*, 84, 207-226. <https://doi.org/10.1007/s10457-011-9460-x>
- Murphy, J., & Riley, J. P. (1962). A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. *Analytica Chimica Acta*, 27, 31-36. [https://doi.org/10.1016/S0003-2670\(00\)88444-5](https://doi.org/10.1016/S0003-2670(00)88444-5)
- Paredes-Jácome, J. R., Hernández-Montiel, L. G., Robledo-Torres, V., González-Fuentes, J. A., Chiquito-Contreras, R. G., & Mendoza-Villarreal, R. (2022). Arbuscular mycorrhizal fungus and organics substrates affect bean plant morphology and minerals. *Terra Latinoamericana*, 40, 1-10. <https://doi.org/10.28940/terra.v40i0.1012>
- Pavón, N. P., & Briones, O. (2000). Root distribution, standing crop biomass and belowground productivity in a semidesert in Mexico. *Plant Ecology*, 146, 131-136. <https://doi.org/10.1023/A:1009808211048>
- Pertierra, R., & Quispe, J. (2020). Economic analysis of hydroponic lettuce under floating root system in semi-arid climate. *La Granja: Revista de Ciencias de la Vida*, 31(1), 121-133. <https://doi.org/10.17163/lgr.n31.2020.09>
- Quiñones-Aguilar, E. E., Montoya-Martínez, A. C., Rincón-Enríquez, G., Lobit, P., & López-Pérez, L. (2016). Effectiveness of native arbuscular mycorrhizal consortia on the growth of *Agave inaequidens*. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, 16(4), 1052-1064. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-95162016005000077>
- Rendón-Sandoval, F. J., Moreno-Calles, A. I., Vallejo, M., Mora, F., Sinco-Ramos, P. G., Campos-Salas, N., ... & Casas, A. (2024). Agrosilviculturas tradicionales que mantienen la diversidad vegetal nativa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán: un panorama regional. *Botanical Sciences*, 102(3), 898-922. <https://doi.org/10.17129/botsci.3479>
- Robles-Martínez, M. D. L., Robles, C., Rivera-Becerril, F., Ortega-Larrocea, M. D. P., & Pliego-Marín, L. (2013). Inoculación con consorcios nativos de hongos de micorriza arbuscular en *Agave angustifolia* Haw. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 4(6), 1231-1240. <https://doi.org/10.29312/remexca.v0i6.1286>
- Rodríguez-Zaragoza, S., González-Ruiz, T., González-Lozano, E., Lozada-Rojas, A., Mayzlish-Gati, E., & Steinberger, Y. (2008). Vertical distribution of microbial communities under the canopy of two legume bushes in the Tehuacán Desert, Mexico. *European Journal of Soil Biology*, 44, 373-380. <https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2008.05.003>
- Rouphael, Y., Franken, P., Schneider, C., Schwarz, D., Giovannetti, M., Agnolucci, M., ... & Colla, G. (2015). Arbuscular mycorrhizal fungi act as biostimulants in horticultural crops. *Scientia Horticulturae*, 196, 91-108. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.002>
- SAS Institute (2014). *Statistical Analysis System SAS/STAT User's Guide. version 9.4*. Cary, NC, USA: SAS Institute Inc.
- Shatilov, M. V., Razin, A. F., & Ivanova, M. I. (2019). Analysis of the world lettuce market. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 395, e012053. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/395/1/012053>
- Shi, S. M., Chen, K., Gao, Y., Liu, B., Yang, X. H., Huang, X. Z., ..., & He, X. H. (2016). Arbuscular mycorrhizal fungus species dependency governs better plant physiological characteristics and leaf quality of mulberry (*Morus alba L.*) seedlings. *Frontiers in Microbiology*, 7, e1030. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.01030>
- SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). (2018). Atlas Agroalimentario. Consultado el 06 de noviembre, 2023, desde [http://panorama.siap.gob.mx/\\_publicaciones\\_siap/pag/2018/](http://panorama.siap.gob.mx/_publicaciones_siap/pag/2018/)
- Smith, S. E., & Read, D. J. (2010). *Mycorrhizal symbiosis*. London, United Kingdom: Academic press.
- Tapia-Goné, J. J., Ferrera-Cerrato, R., Varela-Fregoso, L., Rodríguez-Ortiz, J. C., Soria-Colunga, J. C., Tiscareño-Iracheta, J. C., ..., & Villar-Morales, C. (2010). Infectividad y efectividad de hongos micorrízicos arbusculares nativos de suelos salinos en el cultivo de lechuga (*Lactuca sativa*). *Revista Mexicana de Micología*, 31, 69-74.
- Thioub, M., Ewusi-Mensah, N., Sarkodie-Addo, J., & Adjei-Gyapong, T. (2019). Arbuscular mycorrhizal fungi inoculation enhances phosphorus use efficiency and soybean productivity on a Haplic Acrisol. *Soil and Tillage Research*, 192, 174-186. <https://doi.org/10.1016/j.still.2019.05.001>
- Trejo, D., Ferrera-Cerrato, R., García, R., Varela, L., Lara, L., & Alarcón, A. (2011). Efectividad de siete consorcios nativos de hongos micorrízicos arbusculares en plantas de café en condiciones de invernadero y campo. *Revista Chilena de Historia Natural*, 84(1), 23-31. <http://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2011000100002>
- Udawatta, R. P., Rankoth, L. M., & Jose S. (2019) Agroforestry and biodiversity. *Sustainability*, 11, 2879. <https://doi.org/10.3390/su11102879>
- Valiente-Banuet, A., Solis, L., Dávila, P., Arismendi, M. C., Silva-Pereyra, C., & ..., Casas, A. (2009) *Guía de la vegetación del Valle de Tehuacán-Cuicatlán*. México: UNAM-CONABIO-ENAH-Fundación para la Reserva de la Biosfera Cuicatlán.
- Van Reeuwijk, L. P. (2003). *Procedimientos para análisis de suelos*. M. C. Gutiérrez-Castorena, C. A. Tavares, & C. A. Ortiz-Solorio (Trads.). Montecillo, Estado de México, México: Colegio de Postgraduados.
- Vicente-Sánchez, J., Nicolás, E., Pedrero, F., Alarcón, J. J., Maestre-Valero, J. F., & Fernández, F. (2014). Arbuscular mycorrhizal symbiosis alleviates detrimental effects of saline reclaimed water in lettuce plants. *Mycorrhiza*, 24, 339-348. <https://doi.org/10.1007/s00572-013-0542-7>
- Wee, C. D., Li, J. X., Kim, H. L., & Sohn, B. K. (2010). The effectiveness of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) inoculation on the growth of lettuce. *Korean Journal Soil Science and Fertilizer*, 43(4), 498-505.